



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 06906905 6








Journe

11





520 - June



710 Linn



J o u r n a l  
für  
Chemie und Physik  
in Verbindung

mit

*J. J. Bernhardt, J. Berzelius, G. Bischof, J. W. Döber-  
ner, J. N. Fuchs, C. J. Th. v. Grotthufe, J. P. Heinrich,  
C. W. F. Kstner, W. A. Lampadius, H. F. Link,  
J. L. G. Meinecke, H. C. Oerstedt, C. H. Pfaff; R.  
L. Ruhland, T. J. Seebeck, H. Steffens, F. Stro-  
meyer, A. Vogel.*

herausgegeben

vom

*Dr. J. S. C. Schweigger.*



XXV. Band.

Nürnberg,

in der Schrag'schen Buchhandlung.

1819.

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

---

# Inhaltsanzeige des fünf und zwanzigsten Bandes.

---

## Erstes Heft.

	Seite
Kurser Bericht über Hildebrandts Leben von seinem Schüler Bischof. . . . .	1
Hypothesen zur Erklärung einiger räthselhafter Naturphänomene vom Hofrath Muncke in Heidelberg. .	17
Ueber einen Pyrophor, welcher bei der Sublimation des Salmiaks erzeugt wird. Vom Dr. Hänle in Lehr.	29
Analyse des Mejonits vom Prof. Leopold Gmelin in Heidelberg. . . . .	36
Neue Nachrichten über die Erscheinungen, welche jetzt die nördlichen Meere darbieten. (Aus den Annal de Chim. et d. Phys. Tom, VIII. Jul. 1818. pag. 328f.)	40
Abhandlung über das Cyanogen und die Hydrocyan-säure, von Vauquelin. (Uebers. aus den Annal. d. Chimie et d. Phys. Tom. IX. Oct. 1818. von S. Haas, Mitglieder der physikal. Gesellschaft von Studirenden in Erlangen.) . . . . .	50
Analyse eines antiken Nagels, der in einer Grabstätte bei Dillich, im kurhessischen Amte Borken, gefunden worden ist; vom Hofr. Wurzer in Marburg.	88
Ueber die Bereitung des ätzenden Quecksilbersublimats, von I. B. Trautwein. . . . .	92

	Seite
Ueber Polarität und doppelte Strahlenbrechung der Krystalle; vom Prof. Bernhardt.	99
Verfahren um Schwefelwasserstoffgas im Großen zu bereiten. Von Gay-Lussac. (Uebersetzt aus den Annalen de Chimie et de Physique T. VII, März 1818. S. 314 von G. A. Herrich; Mitglieder der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen).	111
Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Professor Heinrich in Regensburg. Januar 1819.	

### Zweites Heft.

Chemische Untersuchung zweier Tyroler Mineralien, des Andalusits von der Liesenzer Alpe und des Bucholzits, eines neuen (früher mit dem Faserquarz verwechselten) Minerals. Vom Apotheker Dr. Rudolph Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen.	115
Abhandlung über die Elektrizität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitglieder der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).	135
Nachschrift des Herausgebers.	158
Auszug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterrich; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen in Bezug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr. W. L. Költreuter, Pforzheim, 1818. — Vom Dr. Hoffmann.	174



## Inhaltsanzeige.

	Seite
Neue Verfahrensart den Zucker zu raffiniren, von Hrn. Howard, (Uebers. aus den Annal. de Chimie et de Physique von V. Linck, Mitglieds der physikal. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.) . . . . .	186
Zusätze des Herausgebers. . . . .	187
Ueber die bei Ausdehnung der Gase entstehende Kälte von Gay-Lussac. (Uebers. aus den Annales de Chimie et de Physique von J. P. Haiden, Mitglieds der physikal. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen. Durchgesehen von H.) . . . . .	192
Nachschreiben des Herausgebers . . . . .	197
Naturwissenschaftliche Verhandlungen der Göttinger Societät der Wissenschaften. Im Jahr 1817 und 1818, . . . . .	201
Auszug aus dem meteorologischen Tagebuche vom Professor Heinrich in Regensburg, Febr. 1819.	

---

## D r i t t e s   H e f t

Ueber vortheilhafte Benutzung des brenzlichen Thieröls auf Berlinerblau, vom Dr. G. F. Hänle - - - -	245
Nachtrag zu dem Aufsätze über Polarität und doppelte Strahlenbrechung der Krystalle; vom Professor Bernhardt. - - - -	251
Ueber die isothermischen Linien, vom Alexander von Humboldt, Uebersetzt vom Dr. Fabri. - -	25

## VI Inhaltsanzeige.

	Seite
Ueber die Entwicklung der Salze aus den gediegenen Verbindungen, vom Prof. Meinecke in Halle. - -	269
Ueber eine Anomalie bei der chemischen Verwandtschaft von Richard Phillips Esq. (Aus dem Journ. of Science and the Arts No 1., 1816. p. 80. Uebers. von H. Eisenbach, Mitglieder der physikalischen Gesellschaft von Studierenden, in Erlangen, und revidirt v. H.) - - -	290
Ueber die während der Coagulation des Blutes entwickelte Wärme. Von L. Davy, M. D. (Uebers. von H. Eisenbach, - - -)	299
Untersuchungen über die Gesetze der Wärme von Dulong und Petit, Auszug aus dem Französischen vom Prof. Meinecke. - - -	304
Versuch über die Ausdehnung der Gläser und Metalle in der Wärme; angestellt von La Place und Lavoisier im Jahre 1782. (Aus dem Französ. übersetzt von L. L. G. Meinecke.) - -	355
<b>Notizen,</b>	
1) Ueber Entfärbung des in der Nordhäuser Schwefelsäure aufgelösten Indigs durch Hydrogen. Vom Dr. Pleischl in Prag. - - -	363
2) Ueber neue vegetabilische Alkalien, - - -	365
3) Eine neue Schwefelsäure, welche mit Baryt ein leicht auflösliches Salz giebt, - - -	366
4) Neue Verbindung zwischen Oxygen und Hydrogen, - - -	367

# Inhaltsanzeige.

vii

**Isothermische Linien und Vertheilung der Wärme auf der  
Erdkugel vom Alex. von Humboldt, zu 268** Seit

**Auszug aus dem meteorologischen Tagebuche vom Pro-  
fessor Heinrich in Regensburg, März 1819.**

## Viertes Heft.

### Ueber Pflanzenalkalien.

- I. Ueber das Delphinin, ein neues Pflanzenalkali. Vom  
Dr. Rudolph Brandes, in Salsfeßen (Lippe-  
Detmold). - - - - - 369
- II. Ueber ein neues Pflanzenalkali (Alkaloid). Vom  
Dr. W. Meißner, - - - - - 379
- III. Ueber das Morphinum und die Mckonsäure von F.  
C. Geyer, Provisor einer Apotheke in Bremen. 382
- IV. Ueber ein neues Alkali von Pelletier und Ca-  
ventou. (Uebers. aus den Annales de Chimie et  
de Physique 1818. Tom. 8, p. 323 vom Dr. G.  
Osann.) - - - - - 405
- Nachschreiben des Uebersetzers, - - - - - 406
- V. Ueber das Strychnin. Aus einem Briefe des Herrn  
Professor Steinmann in Prag an den Herausge-  
ber, - - - - - 410
- VI. Auszug eines Schreibens vom Hrn. Hofr. Wurzer. 411
- Chemische Untersuchung des Karpholiths vom Jos. Stein-**

	Seite
mann, Professor der allgem. und speciellen technischen Chemie am technischen Institute zu Prag.	415
Chemische Untersuchung eines feurigen Meazolithes (Werner's Faserzeolith), von Hanenstein in Böhmen, Vom Dr. Joseph von Freysmuth, Professor der Chemie und Pharmacie an der Universität zu Prag.	425
Ist der geschmolzene salzsaure Baryt ein Chlorid oder ein salzsaures Salz? Vom Dr. Pleischl in Prag.	438
Versuche und Beobachtungen über die Reizbarkeit der Pflanzen, insbesondere des Lattichs, von Chivachino Carradoni. Im Auszuge aus dem Italienischen vom Professor Meinecke.	456
Untersuchungen über das Verfahren, die Gallerte und andere stickstoffhaltige organische Elemente in ihre letzten Bestandtheile zu zerlegen, von Michelotti. Aus den Memoires de l'Academie de Turin 1811. II. 3, im Auszuge übersetzt vom Prof. Meinecke.	468
Bemerkungen des Uebersetzers.	475
Ueber den Steinheilitt, und eine neue darin entdeckte Substanz, von I. Gadolin. Aus dem Lateinischen vom Prof. Meinecke.	478
Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Professor Heinrich in Regensburg. April 1819.	

Kurzer Bericht  
über  
Hildebrandts Leben  
von  
seinem Schüler Bischof \*).

Georg Friedrich Hildebrandt wurde geboren zu Hannover am 5. Junius 1764. Sein Vater war Johann Georg Hildebrandt, königl. Großbritt. Leibchirurgus. Seine beiden Aeltern verlör er schon in den ersten Jahren seines Lebens. Indefs seine Stiefmutter pflegte sorgfältig seine schwächliche Gesundheit, und für seine geistige Entwicklung sorgte ein junger würdiger Arzt, der damalige Hofmedicus *Mensching* in Hannover, welcher ihn in mehreren nützlichen Gegenständen unterrichtete. In seinem zwölften Jahre bezog er das Gymnasium zu Hannover, und in seinem sechzehnten die Universität zu Göttingen, wo er sich, weni-

\*) mit Benützung von *Hildebrandts* Leben und letzte Krankheit von seinem Schwiegersohne *Hobnbaum*. Erlangen 1816.

*Journ. f. Chem.*, 2, *Phys.*, 24, *Ed.* 1: *Kopf*.

ger aus eigener Neigung als von seiner Stiefmutter bestimmt, und dem damaligen Hofrath von Zimmermann aufgemuntert, der Arzneykunde widmete.

Hauptsächlich legte er sich aber auf das Studium der Anatomie, Physiologie und Chemie, mit dem Wunsche, in einem dieser Fächer einst akademischer Lehrer zu werden. In seinem neunzehnten Jahr erlangte er die medicinische Doctorwürde. Kurz nachher, als er eben im Begriffe war, auf Reisen zu gehen, befiel ihn ein heftiges hitziges Fieber, das sich mit einer Metastase auf das ganze Adersystem seines linken Beines endigte, woraus ein Uebel entstand, das ihn während seiner ganzen Lebenszeit nie mehr völlig verließ.

Im Jahr 1785 habilitirte er sich als Privatlehrer in Göttingen; allein schon nach einem halben Jahre wurde er zum Professor der Anatomie an das anatomisch-chirurgische Institut nach Braunschweig berufen, und nachher auch zum Assessor des Ober-Sanitäts-Collegiums daselbst ernannt. Obgleich er keine Ursache hatte, mit seinen damaligen Verhältnissen unzufrieden zu seyn: so hatten doch die mit einer Professur der Anatomie verknüpften Beschwerden, so wie das beständige Stehen und Gehea, welches der Beruf eines practischen Arztes in einer großen Stadt mit sich bringt, einen nachtheiligen Einfluss auf seine, ohnehin sehr schwächliche Gesundheit, und besonders auf sein krankes Bein.

Im Jahr 1795 wurde er, nachdem er schon einige Jahre lang auch in Braunschweig Chemie gelehrt hatte, zum Professor der Arzneykunde, mit dem Auftrage hauptsächlich Chemie zu lehren, auf die damals preussische Universität Erlangen berufen, und im dar-

auf folgenden Jahre abermals als Professor der Chemie nach Braunschweig; allein sowohl die Bitten seiner Schüler als auch die des akademischen Senats, bestimmten ihn, diesen Ruf abzulehnen. In dem nämlichen Jahre wurde ihm auch der Charakter eines königl. preussischen Hofraths zu Theil. Im Jahr 1796 erhielt er die Bestellung zum Professor der Philosophie und namentlich der Chemie, und im Jahre 1799 übernahm er, nach Abgang des Hofraths Mayer nach Göttingen, auch die Lehrstelle der Physik. Im J. 1804 wurde er von der königl. preussischen Regierung zum geheimen Hofrath ernannt, nachdem er im vorhergehenden Jahre einen Ruf nach Heidelberg abgelehnt hatte. Einen abermaligen Ruf im J. 1812 eben dahin schlug er gleichfalls aus. Bis zu seinem Tode hielt er seine Vorträge über eben genannte Fächer, so wie auch über Physiologie und einige andere medicinische Disciplinen, obgleich im beständigen Kampfe mit körperlichen Leiden, mit ungemeiner Gewissenhaftigkeit ununterbrochen fort.

Schon die mancherlei Wissenschaften, welche der Verewigte, während seiner 31jährigen Laufbahn als akademischer Lehrer gelehrt hatte, lassen auf eine vielseitige und ausgebreitete Gelehrsamkeit schliessen, noch mehr aber beukunden diefs seine zahlreichen Schriften. Er besafs gründliche und tiefe Kenntnisse in der Anatomie, Physiologie, Chemie und Physik, so wie überhaupt in der ganzen Arzneykunde. In allen diesen Fächern hinterliess er uns gründliche und wohlgeordnete Lehrbücher, worunter noch jetzt einige sich befinden, die zur Grundlage bei akademischen Vorlesungen in den Händen solcher dienen, welche die Wissenschaft zu ihren Meistern zählt. Seing zahl-

reichen, in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Abhandlungen, tragen das Gepräge einer unbefangenen Wahrheitsliebe, eines tief eindringenden Scharfblickes und einer seltenen Deutlichkeit und Bestimmtheit im Ausdrücke.

Als akademischer Lehrer wirkte er des Guten sehr viel. Seine Vorträge waren frei, und zeichneten sich durch Klarheit, Falslichkeit und nicht minder durch Bestimmtheit im Ausdrücke aus. Sie waren ernst, doch wußte er auch den trockensten Materien ein gefälliges und ansprechendes Gewand zu geben. Er verstand die Kunst, das Wichtige von dem minder Wichtigen genau zu sondern, und jenes mit besonderem Nachdrucke hervorzuheben; ohne jedoch in den Fehler so mancher zu verfallen, in gewissen Lieblingsmaterien mit zu großer Ausführlichkeit, auf Kosten einer gleichmäßigen Anordnung des Wissenswürdigen zu verweilen. Er versäumte es nie, die vorgetragenen Lehren durch erläuternde Versuche anschaulich zu machen, und auch hier traf er eine so zweckmäßige Auswahl, daß die Folge seiner Experimente eine genaue Uebersicht von der Wissenschaft gab. Mit ungemeiner Sorgfalt und Genauigkeit stellte er Versuche an, keine Schwierigkeit konnte ihn in der Verfolgung derselben abhalten, und selbst die angestrengtesten Arbeiten unternahm er oft auf Kosten seiner so schwächlichen Gesundheit mit unermüdeter Beharrlichkeit. Die Wissenschaft würde gewiß durch ihn manche Bereicherung mehr gewonnen haben, wenn er nicht seine Kräfte so sehr zersplittern, so viele Zeit auf seine ärztliche Praxis hätte wenden müssen. Diese Hindernisse, welche sich seinen eigenen Forschungen entgegen stellten, waren es aber auch, welche ihm



so manche missthüßige und trübe Stunde betreten.

Obgleich er stets einen gewissen Widerwillen gegen die ausübende Arzneykünde hegte, wie er auch mehrmals in öffentlichen Erklärungen sich diesen Beruf verbat: so konnte er doch oft den dringenden Bitten um seinen ärztlichen Rath und Hülfe nicht widerstehen. Und wenn er sich einmal des Leidenden annahm: so durfte man überzeugt seyn, daß er dies mit der strengsten Gewissenhaftigkeit that, und mit der ihm eigenen herzlichen, dem Kranken so wohlthätigen Theilnahme. Nur wenn er zu sehr bestürzt und durch zu häufige Krankenbesuche sogar an der Erfüllung seines Berufs, der ihm über alles ging, verhindert wurde, konnte es wohl manchmal zu einer augenblicklichen heftigen Aufwallung seines Gemüths kommen; allein eben so schnell trat wieder seine natürliche Gutherzigkeit und seine bis zur Aufopferung gehende Menschenliebe ein, die sich dann nur um so größer zeigte, um jene erste leidenschaftliche Aufwallung vergessen zu machen.

Hildebrandt starb den 25. März 1816, 51 Jahre 9 Monate und 13 Tage alt. Er war groß von Person; hatte eine ausdrucksvolle und sehr einnehmende Gesichtsbildung. Im Umgang war er ernst; doch konnte er im Familien- und freundschaftlichen Kreise sehr viel zur Erheiterung der Gesellschaft durch manche ganz ruhig hingespochene witzige Bemerkung beitragen. Er war überaus theilnehmend und tröstend, und eigenes Unglück konnte ihn kaum mehr betrüben als fremdes. Wahrheit und Recht regelte seine ganze Handlungsweise, wobei er Festigkeit und Geradheit zum vorzüglichsten Ziele seines Bestrebens machte.

dafs der Ausdruck seines Worts immer als Spiegel seiner Seele gelten konnte. Dabei war er theilnehmend und hälffreich, selbst grosse Opfer nicht scheuend. Das aufkeimende Talent unterstützte er auf alle mögliche Weise, und erhielt dadurch dem Vaterlande so manchen brauchbaren jungen Mann, und so viele verdanken ihm allein, was sie geworden sind. Niemand konnte mehr fremdes Verdienst ehren, niemand bescheidener seyn als er. Geliebt und geschätzt von allen, die ihn kannten, wirkte er durch sein Beispiel viel, und das Gute, was er gestiftet, wird noch lange das Herrliche und Treffliche seines Urhebers verkünden. Laut drückte sich dieses in den Gefühlen einer ganzen Stadt, in welcher er lebte, bei seinem Tode aus.

Hier ist die Stelle, wo der Verf. dieser Lebensbeschreibung den Grund anzugeben hat, warum er es unternahm, das Leben und den Charakter dieses trefflichen Mannes zu beschreiben. Er hatte Gelegenheit, ihn in allen Lebensverhältnissen näher kennen zu lernen: als sein Schüler, der mehrere Jahre seine Vorlesungen anhörte; als Leidender in einer heftigen Krankheit, von der er während seiner Studienjahre einmal befallen wurde, und in welcher Beziehung er ihm die Rettung seines Lebens schuldig zu seyn glaubt; als täglicher Gehülfe endlich bei seinen chemischen Arbeiten und gleichsam Hausgenosse in den letzten Jahren seines Lebens.

Es ist noch übrig, von dem Verewigten als Schriftsteller zu sprechen. *Hildebrandt* trat zuerst im Jahre 1783. als solcher auf. In dem ersten Decennium seiner literarischen Laufbahn beschränkte sich seine Thätigkeit blofs auf Schriften medicinischen In-

halts; vom Jahre 1793 an aber erschienen von ihm meistens Schriften über chemische Gegenstände. Doch dafs er auch das Studium der Mathematik nicht vernachlässigte, davon zeugt seine Gröfßenlehre, welche zunächst nach seiner Inauguraldissertation erschien.

Wir wollen hier das Verzeichniß seiner sämtlichen Schriften in chronologischer Ordnung auführen.

### I. Schriften vorzüglich medicinischen Inhalts.

- 1) Dissertatio inauguralis de pulmonibus. Gotingiae, 1783. 4.
- 2) Handbuch der reinen Gröfßenlehre. 2 Theile ebend. 1785. 8.
- 3) De motu iridis quaedam disserit, et praelectiones habendas indicat. Brunsvici 1786. 8.
- 4) Versuch einer philosophischen Pharmakologie; ebendas. 1787. 8.
- 5) Bemerkungen über den Blasenstein in Pichters chirurg. Bibliothek. 1787. B. VIII. St. 4.
- 6) Bemerkungen und Beobachtungen über die Pocken in der Epidemie des Jahrs 1787. Braunschweig 1788. 8.
- 7) Ueber das Wassertrinken in den gelehrten Beiträgen zu den Braunsch. Anzeigen 1787. St. 49. 51. 53 — 61.
- 8) Ueber den Genuß des Obstes; ebend. St. 77 — 79.
- 9) Ueber die Versümmniß der guten Erziehung in der ersten Periode des Lebens; ebend. 1788. St. 2. u. 3.
- 10) Beitrag zur Geschichte des thierischen Magnetismus; im Braunschweig. Magazin 1788. St. 22 — 24.
- 11) Anatomische Bemerkungen in Blumenbachs medicin. Bibl. 1788. Bd. III. St. 1.

## Kurzer Bericht

- 12) Einige Erfahrungen und Beobachtungen über den Schlaf, physiologisch erklärt; im Braunschweig. Journal 1788. St. 6.
- 13) Ueber die Oeconomie in Privathaushaltungen, insbesondere des Mittelstandes und der geringern Stände; im Braunschweig. Magazin 1789. St. 10.
- 14) Lehrbuch der Anatomie des Menschen 1ter Band Braunschweig 1789 — 2ter Band ebend. 1790. — 3ter Band ebend. 1791. — 4ter und letzter Band ebend. 1792. gr. 8. Zweite verbesserte Aufl. ebend. 1798 — 1800. 4 Theile in gr. 8. Dritte verbesserte und vermehrte Aufl. in 4 Th. 1805 — 1806.
- 15) Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und den Gedärmen; ein Buch, auch für solche, welche nicht Aerzte sind. 3 Bände ebend. 1799. 8.
- 16) Die Anzeige der Heilkräfte und der Krankheiten, in welchen jedes Gewächs angewandt wird, in Ebermanns Herbario vivo, eto. Braunschw. 1790 und 1791. Fol.
- 17) Ueber die Ergießungen des Saamens in Schlaf; ebend. 1792. 8.
- 18) Einige Worte über Hrn. Tannestrickers hier angestellte Experimente; in dem Braunschweig. Magazin 1792. St. 21.
- 19) Progr. Commentationis de alcali minerali sanguinis humani Particulata J. Erlangae 1793. 8.
- 20) Diss. Dulcis mercurii laudes, ibid. 1795. 8.
- 21) Erinnerung an die große Heilsamkeit des kalten Bades; im Braunschw. Magazin 1793. St. 24.
- 22) Primae lineae Pathologiae generalis. Erlangae 1795. 8. Von ihm selbst übersetzt. Erlangen 1797. 8.
- 23) Ueber die blinden Hämorrhoiden. ebend. 1795. 8.

- 24) Ueber die Arzneykunde. Erlangen 1795. 8.
- 25) Ueber die Hypochondrie; in Hufelands Journal für die pract. Arzneykunde 1795. B. I. St. 1. 1795. St. 4.
- 26) Geschichte eines merkwürdigen Fiebers, mit der Leichenöffnung; 1796. ebend. B. II. St. 4.
- 27) Lehrbuch der Physiologie des menschlichen Körpers, ebend. 1796. 8. Zweite verb. Aufl. 1799. Dritte vermehrte und verbesserte Aufl. 1803.
- 28) Einige Beobachtungen über den grauen Starr; in Loders Journal der Chirurgie. 1797. B. I. St. 2 und 3.
- 29) Taschenbuch für die Gesundheit auf das Jahr 1801. ebend. (1800) 12. Zweite Aufl. ebend. 1801. 12. Dritte vermehrte Aufl. ebend. 1803. Vierte mit Zusätzen vermehrte Aufl. 1807.
- 30) Ueber den Zweck des Pankreas in den Abhandl. der Physikal. Med. Societät zu Erlangen. B. I. 1809.
- 31) Ueber Stärke und Schwäche im menschlichen Organismus; ebend. B. II. 1812.

## II. Schriften vorzüglich chemischen Inhalts.

- 1) Anzeige seiner Wintervorlesungen, nebst einer Abhandlung vom lebendigen Halk, ebend. 1786. 8.
- 2) Ueber die Scheidung des geschwefelten Quecksilbers, auf dem nassen Wege, und insbesondere von einer völligen Auflösung des Zinnobers. Crell's chem. Annalen Jahrg. 1792. Bd. II. S. 54.
- 3) Ueber die Natur des gebrannten Kalkes, ebend. S. 113.
- 4) Verfolg der Abhandlung über die Scheidung des

- Quecksilbers auf dem nassen Wege. Crell's chem. Annalen Jahrg. 1792. Bd. II. S. 196
- 5) Verschiedene Bemerkungen über die Auflösung des Quecksilbers in der Salpetersäure. Ebend. 291.
  - 6) Ueber die Bereitung des rothen Quecksilberkalks durch Salpetersäure. Ebend. 398.
  - 7) Bemerkungen über die Verflüchtigung des Quecksilbers. Ebend. 489.
  - 8) Ueber die Auflösung des Quecksilbers in gewöhnlicher tropfbarflüssiger Kochsalzsäure. Ebend. Jahrgang 1793. Bd. I. S. 12.
  - 9) Ausscheidung des flüchtigen Laugensalzes aus dem Salmiake durch rothen Quecksilberkalk. Ebend. S. 141.
  - 10) Ueber die Fällung des Goldes durch Quecksilber, und eine Methode, das Gold von unedlen Metallen zu scheiden. Ebend. 195.
  - 11) Ueber die Mitverflüchtigung der Metalle durch Quecksilber, und die Verfälschung des Quecksilbers. Ebend. 296.
  - 12) Chemische und mineralogische Geschichte des Quecksilbers. Braunschweig 1795. 4.
  - 13) Vergleichende Uebersicht des phlogistischen und des antiphlogistischen Systems. Crell's Ann. 1795. S. 536.
  - 14) Etwas über die Entbindung der Feuerluft aus Metallkalken. Ebend. Jahrg. 1793. Bd. II. S. 24 und ebend. 1794. B. I. S. 310.
  - 15) Etwas über das antiphlogistische System der Chemie. Ebend. S. 99.
  - 16) Verschiedene chemische Bemerkungen. 1) Schwarzer Goldkalk. 2) Phosphorsäure durch Verbrennung des Phosphors bereitet. 3) Flüchtige Schwe-

- felsäure, als festes Salz. Crell's chem. Annalen, Jahrg. 1794. Bd. I. S. 18.
- 17) Ueber die Verquickung des Quecksilbers mit Kupfer und die Sublimation des Kupfertalks mit Salpetersäure. Ebend. S. 112.
- 18) Ueber den flammenden Salpeter. Ebend. S. 291.
- 19) Ueber die Scheidung des Silbers vom Kupfer, durch Bereitung des Hornsilbers. Ebend. S. 486.
- 20) Angabe einer leichten und einfachen Methode, das Silber vom Kupfer zu scheiden. Ebendas. Jahrg. 1794. Bd. II. S. 9.
- 21) Untersuchung der Wirkung des Dampfes, der Salpetersäure und des Weingeistes auf einander. Ebend. Jahrg. 1795. Bd. I. S. 11.
- 22) Darstellung des Schwefels in der Schwefelnaphtha. Ebend. S. 195.
- 23) Versuche über die Zusammensetzung des flüchtigen Alkali's. Ebend. S. 503.
- 24) Zerlegung eines blauen Siegelackes. Ebend. S. 533.
- 25) Ueber die Bestimmung des Begriffs von Salzen. Ebend. Jahrg. 1795. Bd. II. S. 6.
- 26) Note über das Stickgas. Ebend. S. 515.
- 27) Anfangsgründe der Chemie; zum Grundrisse akademischer Vorlesungen; nach dem neuen Systeme abgefaßt. 1ter Band. Erlangen 1794. 2ter und 3ter Band. Ebend. 1794. gr. 8.
- 28) Chemische Betrachtung der Lohgärbererey; insbesondere der von Hrn. Armand Seguin in Frankreich neu erfundenen Methode, das Leder in wenigen Tagen zu gerben. Erlangen 1795. 8.
- 29) Vermischte chemische Bemerkungen. Crell's chem. Ann. 1796. Bd. I. S. 255.

- 30) Versuche über das Leuchten des Phosphors im Salpeterstoffgas aus Salpeter. Crell's chem. Ann. 1796. Bd. I. S. 411. Fortsetzung S. 488.
- 31) Vermischte chemische Bemerkungen aus einem Briefe. Ebend. 1796. Bd. II. S. 636.
- 32) Commentatio chemica de metallorum nobilium puritate arte paranda. Erlangae 1796. 8.
- 33) Ueber die Scheidung des Eisens von der Thonerde. Crell's chem. Ann. 1797. Bd. I. S. 207.
- 34) Ueber die Scheidung des Eisens von der Thonerde, und die Bereitung einer reinen Blutlauge. Ebend. 1798. Bd. I. S. 19.
- 35) Ueber eine scheinbare Verwandlung des Silbers in Gold. Scherer's allgem. Journal der Chemie 1798. B. I. S. 298.
- 36) Beiträge zur chemischen Geschichte des Goldes. Erster Beitrag. Ebend. 1798. B. I. S. 650. Zweiter Beitrag. Ebend. 1799. B. III. S. 175. Dritter Beitrag. Ebend. 1800. B. V. S. 597.
- 37) Ueber den Unterschied der kalischen Salze in der Erzeugung des Alauns. Ebend. 1799. B. II. S. 419.
- 38) Chemische Versuche und Gedanken über das Blut, die Ernährung und die thierische Wärme. Crell's chem. Ann. 1799. Bd. I. S. 18. Fortsetzung ebend. S. 145. Schluß, ebend. S. 201.
- 39) Ueber die Erzeugung des Glaubersalzes aus Gyps und Kochsalz. Ebend. 1799. B. I. S. 555.
- 40) Erfahrung von der Wirkung in die Ferne (Actio in distans) bei der Herstellung der Metalle. Ebend. 1799. B. II. S. 10.
- 41) Encyclopädie der gesammten Chemie (1. Th. Theorie) 1tes bis 7tes Heft. Erlangen 1799 — 1802.



- (2. Th. Praxis) 8tes bis 16tes Heft. 1803 — 1810.  
Zweite verm. und verbess. Aufl. 1tes und 2tes  
Heft 1809 und 1810, 3tes Heft 1812, 4tes und  
5tes Heft 1812 — 1814. Erstes Supplementheft  
zur Encyclopädie 1815.
- 43) Vorrede und Anmerkungen zu K. W. Böckmann's  
physikalisch-chemischen Versuchen über das Ver-  
halten des Phosphors in den verschiedenen Gas-  
arten u. s. w. Erlangen 1800. gr. 8.
- 44) Ueber die Auflöslichkeit des Kupfers in Ammoniak.  
Crell's chem. Ann. 1801. Bd. I. S. 257.
- 44) Vorrede zu C. H. T. Schreger's kurzen Beschrei-  
bung der chemischen Geräthschaften u. s. w. Fürth  
1802. 8.
- 45) Physikalische Untersuchung des Mineralwassers im  
Alexanderbade bei Sickersreuth in Franken mit  
Bemerkungen über die Heilkräfte kalter kohlen-  
saurer Wasser. Erlangen 1805. 8.
- 46) Ueber die Modification der Materie in Gehlen's  
neuem allgem. Journal der Chemie. 1805. Bd. V.  
S. 605.
- 47) Beschreibung eines Filtre inalterable aus der Fa-  
brik der Bürger Smith, Cuchet und Monfort in  
Paris 1805, in Gilbert's Annalen der Physik. Bd.  
XXI. S. 179.
- 48) Auszug aus einem Briefe des Professors Hilde-  
brandt an den Prof. Gilbert, seine Apparate zur  
Zersetzung des Wassers durch galvanische Elec-  
tricität betreffend. 1805. ebend. S. 257.
- 49) Anfangsgründe der dynamischen Naturlehre, abge-  
faßt u. s. w. Mit 4 Kupfertafeln. Erlangen 1807.  
Fortsetzung und Schluß. Ebend. 1807. gr. 8.

- 50) Erklärung der Abbildungen zur Encyclopädie der Chemie. Mit Kupfern. Erlangen 1807. gr. 8.
- 51) Vermischte chemische Aufsätze in Gehlen's Journal für Physik, Chemie und Mineralogie 1807. Bd. IV. S. 131.
- 52) Ueber die Natur des durch Verpuffen des Salpeters mit Kohle erhaltenen Gas. Ebend. B. V. S. 326. Ebend. 1809. B. VIII. S. 714. Nachtrag in diesem Journal 1811. B. I. S. 391.
- 53) Beschreibung eines Manometers, durch dessen Anwendung man die Veränderungen erkennen kann, welche in der Elasticität und Mischung einer dem Volumen nach bestimmten Quantität von Luft erfolgen. Von C. L. Berthollet. Mit einer Anmerkung über die Anwendung desselben, von dem Uebersetzer Fr. Hildebrandt. Ebend. 1808. S. 358.
- 54) Versuche über die Verbindung des Phosphors mit den Metallen und ihren Oxyden auf dem nassen Wege; nebst der Untersuchung eines Gas, welches durch eine besondere Zersetzung des Alkohols erzeugt wird. Von Theodor von Grotthufs. Uebersetzt mit Anmerkungen vom Prof. Hildebrandt. Ebend. 1808. Bd. V. S. 599.
- 55) Ueber die Unabhängigkeit der Erregung des Galvanismus von dem Unterschiede der Oxydabilität in den einander berührenden Erregern. Ebend. 1808. Bd. VI. S. 56.
- 56) Versuche über das Verhalten des todten Fleisches in verschiedenen Gasarten. Ebend. 1808 B. VII. S. 283.
- 57) Erster Nachtrag zu den Versuchen über das Verhalten des todten Fleisches in verschiedenen Gasarten. Ebend. 1809. Bd. VIII. S. 180.

- 58) Zweiter Nachtrag. In diesem Journal 1811. B. I. S. 358.
- 59) Versuche über das blausaure Kupfer. Ebend. 1808. Bd. VII. S. 667.
- 60) Volta's Säule aus drei Metallen aus einem Schreiben an den Prof. Gilbert vom Prof. Hildebrandt. 1808. Gilbert's Annalen der Physik. Bd. XXX. S. 67.
- 61) Von der Torricellischen Leere über Wasser. Gehlen's Journal etc. 1810. Bd. IX. S. 541.
- 62) Ueber Phosphorkalk und Phosphorkali. Ebend. 1810. Bd. IX. S. 766.
- 63) Von der Torricellischen Leere über fettem Oel. Dieses Journal, Jahrg. 1811. B. I. S. 41.
- 64) Versuche über die Unterscheidung des Lichtes beider Electricitäten in verdünnter Luft. Ebendas. Jahrg. 1811. S. 257.
- 65) Ueber doppelte Mischungen und Scheidungen. Ebend. Jahrg. 1811. B. III. S. 274.
- 66) Ueber das bei der Verpuffung des Salpeters mit Kohle erhaltene Gas. Nachtrag zu Jahrg. 1812. Bd. V. S. 6.
- 67) Kleiner Beitrag zur Geschichte des Goldes. Jahrg. 1812. Bd. VI. S. 369.
- 68) Versuche über die Talkerde in den Menschenknochen. Ebend. Jahrg. 1813. Bd. VIII. S. 1.
- 69) Ueber den gelben Niederschlag, welcher bei der Auflösung des Kupfers in Salpetersäure sich absetzt. Ebend. Jahrg. 1814. Bd. XI. S. 169.
- 70) Ueber die verschiedene Wirksamkeit verschiedener Metalle in der Erzeugung des electricischen Spitzenlichtes. Ebend. Jahrg. 1814. S. 457.
- 71) Rüge einer Verstümmelung der Abhandlung vom

## 16 Kurzer Bericht über Hildebrandts Leben.

- Prof. Hildebrandt über Talkerde in den Menschenknochen in den Ann. de Chimie. Jahrg. 1814. in diesem Journal. Bd. XII. S. 227.
- 72) Zweifel gegen Davy's Theorie von der Chlorine oder dem Halogen, auf Thatsachen gegründet vortragen vom Prof. Fr. Hildebrandt. Ebend. Jahrgang 1815. Bd. XIII. S. 72.
- 73) Ueber den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und die Anwendung des Salpetergases denselben zu finden. Ebend. Jahrg. 1815. Bd. XIV. S. 265.
- 74) Mehrere Uebersetzungen von ihm d. Journ. Jahrg. 1811. Bd. III. S. 323. Bd. IV. S. 189. S. 193. Jahrg. 1812. Bd. V. S. 164. 166. Jahrg. 1815. Bd. VIII. S. 65. Jahrg. 1814. Bd. XII. S. 227.

Gewissheit nicht erwartet werden kann. Vorher war  
 Ich drei noch immer ungelöste Fragen, über die  
 nehmlichen, Meteorischen und die einig die verhalten  
 Grenzfläche, und will versuchen, sie zu lösen.  
 physikalischen Principien erklärt werden können. Das  
 Anfang mache die letztere, bei weitem die letztere,  
 aber für mich schon. Ich werde mich bemühen, wie  
 ich so oben das Glück gehabt habe, die physikalische  
 Erklärung des großen Erregers und der letzteren

**Hypothesen**

**Erklärung einiger räthselhafter**

**Naturphänomene,**

von

**Hofrath Muncke**

in Heidelberg.

Während ich in dem vergangenen Sommer mit der  
 Aufsicht über den Ausbau der akademischen Institute  
 beschäftigt war, blieb mir für literarische Arbeiten  
 gar keine Zeit übrig, und auch jetzt bin ich neben  
 der Ausarbeitung eines Compendiums der Physik noch  
 mit so vielen unvermeidlichen anderweltigen Besor-  
 gungen überhäuft, daß ich mich an keine größere Ab-  
 handlung wagen darf. Unterdessen habe ich mitan-  
 der über verschiedene wichtige Probleme nachgedacht,  
 und erlaube mir über einige, welche bis jetzt noch  
 nicht mit Gewisheit ausgemacht sind, den Physikern  
 eine hypothetische Erklärung zur weiteren Prüfung  
 mitzutheilen, in der Ueberzeugung, daß selbst die  
 kühnste Hypothese da zulässig ist, wo überzeugende

*John. F. Chem. u. Phys. 25, Bd. 1, Hoff.*

Gewißheit nicht erwartet werden kann. Vorerst wähle ich drei noch immer streitige Fragen, über Sonnenflecken, Meteorsteine und die einzeln zerstreuten Granitblöcke, und will versuchen, wie weit sie aus physikalischen Principien erklärt werden können. Den Anfang mache die letztere, bei weitem die leichteste, aber für mich schon deswegen sehr interessante, weil ich so eben das Glück gehabt habe, die persönliche Bekanntschaft des großen Geologen und berühmten Reisenden Herrn *Leopold v. Buch* bei seiner Durchreise durch Heidelberg zu machen, wodurch die Aufmerksamkeit auf diesen mir längst interessantesten Gegenstand bei mir aufs Neue rege wurde.

Man hat es bekanntlich schon lange unbegreiflich gefunden, auf welche Weise die zum Theil ungeheuer großen Granitblöcke, welche in den verschiedensten Ländern der Erde, namentlich an den afrikanischen Küsten, in den Schweizergebirgen, und an den Küsten der Ostsee zerstreut liegen, an diese ihre jetzige Lagerstätte gekommen sind. Zwei Hypothesen, als die bedeutendsten unter den übrigen, streiten sich um den Vorrang; Nach der einen, welche vorzüglich durch *Dolomieu* vertheidigt ist, sollen sie durch Wasserfluthen fortgeschwemmt seyn; nach der andern, welche gegenwärtig in dem vorerwähnten *H. v. Buch* einen überlegenen Vertheidiger gefunden hat, sollen sie durch Wurfkräfte auf die Plätze, wo wir sie jetzt finden, geschleudert seyn. Beides scheint mir gegen die ausgemachtsten physikalischen Grundsätze zu streiten. Nehmen wir die Wasserfluthen auch noch so reissend an, und zugestanden, daß fortgeschwemmtes Holz oder ansitzendes Eis die Weglösung erleichtert habe: so bleibt doch immer unbegreiflich, durch welche Mit-

als sie den statischen Gesetzen zuwider; über Thäler und Bergspitzen weggeführt seyn könnten. Gehen wir zur Hypothese von der Wurfbewegung über, so würde diese das Phänomen leicht erklären, wenn kein Widerstand der Luft wäre. Allein, wenn gleich das Gesetz des Widerstandes der Luft noch nicht mit größter Schärfe aufgefunden ist, so geht doch aus den Rechnungen und Versuchen aller Geometer, die sich hiermit beschäftigt haben, so viel hervor, daß durch die ungeheuerste Wurfkraft selbst eine eiserne Kugel, geschweige denn ein Granitblock, nur eine deutsche Meile, viel weniger also bis an 20 oder gar 50 Meilen geschleudert werden kann, wovüber ich bloß auf *Huttons course of Mathematic's* III. 278 verweise. Vorzüglich würde diese Unmöglichkeit in die Augen fallen, wenn die Behauptung der Geognosten, namentlich des Hrn. *Hausmann*, gegründet ist, daß die in der Ebene um Lüneburg und am Ufer der Ostsee liegenden Blöcke von derselben Art sind, als die Granite der schwedischen Küste.

Vermuthlich ist die richtige Erklärung dieses Vorkommens der einzeln liegenden Granitmassen bloß dadurch verhindert, daß man früher fast ohne Ausnahme den Granit als einzigen festen Kern oder mindestens als feste Rinde der Erde anzusehen pflegte, mithin die einzelnen Granitberge für Hervorragungen oder Spitzen dieses Kerns halten mußte. Einzelne Stücke konnten daher bloß von diesen Spitzen abgerissen, und entweder fortgerollt, oder weggeschwemmt oder durch Wurfkraft fortgeschleudert seyn. Seitdem es erwiesen ist, daß der Granit neben andern Gesteinsarten älterer Formationen gelagert ist, und wenn wir vollends annehmen, daß er sogar in einzelnen

Kuppen auf anderen Gebirgsarten; hamentlich auf Gneus aufliegt (S. *Parrot*; *Phys.* III, 368), kann die Erklärung des Phänomens keine Schwierigkeit mehr haben. Ueberall, wo wir Granitberge antreffen, finden wir grössere und kleinere Blöcke dieser Steinart umher liegen. Dürfen wir nach dem Schlusse *a majori ad minus* annehmen, daß es früher auch kleinere Granitgebirge gab; und diese aus solchen Blöcken bestanden, so ist leicht denkbar, daß die Zwischenräume allmählig verwitterten, und weggespült wurden; die grösseren Massen aber an diesen Stellen liegen blieben, und von dort aus theils durch Wasserfluthen, theils durch Herabrollen und sonstige Ursachen zerstreut wurden. In wenig Worten ausgedrückt heisst also die Erklärung: die einzeln liegenden Granitblöcke sind die Reste vormaliger kleinerer, allmählig zerstörter Granitberge. Täuscht mich mein Gedächtniß durch die Erinnerung an eine frühere Beobachtung nicht, so zeigt die Teufelsmaner unweit Blankenburg in Niedersachsen noch jetzt den Fuß eines solchen zerstörten und zerfallenen Gebirges.

Der zweite Gegenstand, bei welchem ich der gewöhnlichen Erklärung nicht beipflichten kann, betrifft die Ursache, wodurch die Meteorsteine sich erhitzen sollen. Gern trete ich Hrn. *Chladni* und den meisten französischen, so wie überhaupt der grösseren Zahl der Physiker bei, welche diesen räthselhaften Körpern einen kosmischen Ursprung zuschreiben; denn sie für tellurisch oder atmosphärisch zu halten, kann ich mich unmöglich überwinden. Mögen immerhin Dämpfe von stark erhitzten Metallen aufsteigen; sie fallen sicher mit andern Stoffen verbunden wieder herab, und ich kann mir nicht einbilden, daß sie sich durch eine ge-



wisse *qualitas occulta*, die man gern Electricität nennen möchte, zu Massen, Tausende von Centnern schwer, zu vereinigen im Stande sind. Wirklich steht auch der Annahme ihres kosmischen Ursprungs kein bedeutendes Hinderniß entgegen. Bloß die Frage scheint große Schwierigkeiten zu haben, woher sie die ihnen eigene große Hitze erhalten. Einige nehmen auch hier zur Electricität ihre Zuflucht; allein ich kann nicht absehen, woher dieselbe eigentlich kommen soll. Andere, worunter der erste berühmte Vertheidiger ihres kosmischen Ursprungs, Hr. *Chladni*, vorzüglich gehört, leiten die Hitze derselben aus einer Reibung an den Lufttheilchen ab. Wenn nun gleich diese Hypothese die Autorität mehr als eines großen Geometers für sich hat: so streitet sie dafür desto auffallender gegen die bekanntesten Naturgesetze. Schon im Allgemeinen ist gar nicht erwiesen, daß die stärkste Reibung expansibeler Flüssigkeiten, oder vielmehr die heftigste Bewegung fester Körper in denselben die Temperatur der letzteren zu erhöhen vermag. Wäre nur von einer geringen, etwa einige Grade der hunderttheiligen Scale betragenden Wärme-Erzeugung die Rede, so könnte man die enorme Geschwindigkeit bei ihrer Bewegung in Anschlag bringen, um dadurch das Unzurückende dieser Erklärung weniger fühlbar zu machen, obgleich diese Geschwindigkeit schnell abnehmen, und auch in höheren Regionen nicht mehr stattfinden würde, wenn die verschwindende Dichtigkeit der Atmosphäre daselbst irgend eine meßbare Gegenwirkung äußerte. Wollen wir aber den Grad der Hitze aus dem Lichtglanze beurtheilen, den dieselben schon in jenen Regionen verbreiten: so muß dieselbe die des weißglühenden Eisens um ein Vielfa-

ebes übertreffen. Am auffallendsten aber wird die Unhaltbarkeit dieser Erklärung, wenn man erwägt, daß dieser Lichtglanz gerade da schon am stärksten ist, wo sie mutmaßlich erst in die Atmosphäre unserer Erde treten, demnächst allmählig abnimmt, und zuletzt bis zur dunkeln Hitze verschwindet. Berücksichtigt man diesen Umstand genauer, so leitet er leicht auf die richtige Erklärung des Phänomens.

Daß es im Raume unsers Sonnensystems Körper giebt, welche viel weniger dicht sind, als unsere Erde, ist außer Streit. Diese geringere Dichtigkeit ist entweder eine Folge der individuellen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, oder einer größeren Temperatur. Im ersteren Falle müßten entweder die nämlichen Stoffe, welche unsern Erdball bilden, anders gemischt seyn, um ein geringeres mittleres spec. Gewicht herauszubringen, (eine Hypothese, welche allenfalls für die Planeten und ihre Trabanten ausreicht, aber nur mit Einschränkung statuirt werden darf), oder aber man könnte neue, auf unserm Erdballe nicht vorhandene Stoffe als constituirende Bestandtheile derselben annehmen, wobei dann keine weitere Bestimmung und Bezeichnung derselben möglich wäre. Die letztere Hypothese würde allgemein gelten, und selbst die geringe Dichtigkeit der Sonne und der Cometen wo nicht erklären, doch wenigstens jeder weiteren Forschung entziehen. Bloß die Meteorsteine würden fortwährend jeder Erklärung ein unübersteigliches Hinderniß entgegensetzen, indem ihre Bestandtheile mit denjenigen identisch sind, welche wir auf unserer Erde antreffen, und ihre Erhitzung eine Wirkung ohne Ursache bleibt. Die zweite Hypothese, wonach die größere Leichtigkeit mehrerer Himmelskörper als Folge

einer höhern Temperatur anzusehen ist, schließt die Anwendung der ersteren auf mehrere Planeten und Trabanten nicht aus, müßte aber auf die Sonne und die Cometen allein oder in Verbindung mit jener angewandt werden. Ehe ich indess diese Anwendung nachweise, sey es mir erlaubt, auf einen physikalischen Lehrsatz aufmerksam zu machen, welchen ich zwar nicht neu nennen mag, aber ich erinnere mich nicht denselben irgendwo mit ausdrücklichen Worten aufgestellt gelesen zu haben. Dafs ich diesen Gegenständen vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet habe, davon liegt die Ursache in den Untersuchungen, welche ich über die Wärmetheorie in meiner Abhandlung über das Schießpulver anstellen mußte. Schon habe ich aus der dort aufgestellten Hypothese einige Erklärungen räthselhafter Phänomene abgeleitet, und ich hoffe ihre fernere Anwendung noch weiter in der Folge nachweisen zu können.

Wenn ein erhitzter Körper seinen Ueberschufs von Wärme abgibt: so geschieht dieses nach dem allgemeinen, von *Newton* aufgestellten Gesetze, wobei das constante Erkaltungs-Verhältniß durch die spezifische wärmeleitende Kraft des umgebenden Medii gegeben wird. Am geringsten ist die Wärmeabnahme im sogenannten leeren Raume, wobei es ganz außer den Grenzen der Möglichkeit liegt, einen Körper im *Vaquo* frei schwebend erkalten zu lassen. Schließen wir nach einer sehr zulässigen Analogie, so müssen wir annehmen, dafs ein Körper, sobald er so weit von jeder andern Materie getrennt ist, dafs der Wärmestoff (nach Analogie der Electricität) den Raum nicht zu durchdringen vermag, seine Temperatur gar nicht ändert; oder mit andern Worten: *Jeder erhitzte*

Körper, wie hoch seine Temperatur auch seyn mag, wird im absolut leeren Raume frei schwebend seine Temperatur nie verlieren. Diesen Lehrsatz zugegeben, gegen welchen ich mir kein Argument denken kann, wird es ein Leichtes seyn, mehrere bis jetzt räthselhafte Phänomene zu erklären. Vor allen Dingen haben wir die Cometen für solche Weltkörper zu halten, welche bis auf einen sehr hohen Grad der Temperatur erhitzt sind, so daß sie nicht bloß wegen ihrer ungemeinen Leichtigkeit die Planeten nur wenig stören, sondern daß auch ein Theil derselben durch die Thätigkeit des Wärmestoffes zu einer glühenden, d. h. selbst leuchtenden Atmosphäre expandirt wird. Nach der in meiner Schrift über das Schießpulver aufgestellten und mehreren Erfahrungen angepaßten Theorie wird der Wärmestoff erst dann vorzüglich thätig, wenn er mit irgend einer andern Potenz, als Electricität, Licht u. s. w. in Conflict kommt, abgesehen von den allgemeinen Gesetzen der Attraction, wodurch seine Erscheinungen vorzüglich modificirt werden. Insbesondere ist das Licht diejenige Potenz, welche den latenten Wärmestoff hervorruft, und es muß daher jeder Comet bei seiner gröfseren Annäherung zur Sonne leuchtender und sein Schweif ausgedehnter werden. Ihnen ähnlich sind diejenigen Massen, welche als Meteorsteine der verschiedensten Art herabfallen. Woher sie kommen, d. h. woher sie ursprünglich entstanden und wie sie gebildet sind, braucht hier nicht beantwortet, ja nicht einmal untersucht zu werden, und wird vielleicht nie, vielleicht bald genügend entschieden, entweder durch Vermehrung der Beobachtungen oder durch eine glückliche Hypothese. Je weiter sie von der Sonne entfernt sind, desto weniger wird die

Menge (wenn wir auch nur bildlich so sagen dürfen) ihres Wärmestoffes in Thätigkeit gesetzt; mehr aber geschieht dieses, so wie sie der Sonne näher kommen. Nähern sie sich in ihren regellosen Bahnen der Attractionsphäre eines Planeten oder Trabanten bis auf eine meßbare Weite, werden sie von ihm mit beschleunigter, wegen Abwesenheit aller Hindernisse der Bewegung zuletzt unglaublich wachsender Geschwindigkeit angezogen, und treten sie in die Grenze seiner Atmosphäre ein, so wird durch den Conflict der Attraction, theils ihrer eigenen Masse, theils der Elemente des Planeten, dem sie sich nähern, die Thätigkeit ihres Wärmestoffes auf das Maximum gesteigert werden. Dieser Moment ist derjenige, worin ihr Verbrennen stattfindet, aber die Wärme kann ihnen nicht entzogen werden, weil kein in ihrer Wirkungssphäre befindlicher Körper sie aufnimmt. Je tiefer sie sich aber in die Atmosphäre des Weltkörpers einsenken, desto schneller verlieren sie dieselbe, zuletzt so gewaltsam, dafs sie, gleich wie die erkaltenden expansibelen Flüssigkeiten detonirender Substanzen mit einem starken Getöse zusammenfallen, und beträchtlich erkaltet in einem Zustande mäfsiger Hitze die Oberfläche der Erde berühren, wobei sie wegen der nachfolgenden schnellen Abkühlung meistens in mehrere Stücke zerspringen. Diese Erklärung stimmt mit der Erscheinung überein, und hat kein Naturgesetz wider sich. Schliesslich will ich noch eine Kleinigkeit hinzuzufügen mir erlauben, bei deren Beurtheilung ich die Ueberschrift dieser Abhandlung zu berücksichtigen bitten mufs. Ein grosser Geometer hat die Frage aufgeworfen, ob die Meteorsteine wohl aus dem Monde kämen. Der Calcul verneint diese Frage nicht, aber

geometrische und physikalische Grundsätze sind dagegen. Ich möchte wohl zu fragen mir erlauben, ob es der Mühe werth sey, die Hypothese ernstlich zu prüfen; wenn jemand ihren Ursprung aus der Sonne ableiten wollte.

Das schwierigste Problem, auf allen Fall viel räthselhafter als beide vorher untersuchten, ist die Erklärung der Sonnenflecken. Zwar haben wir zwei Erklärungen derselben, welche selbst bei den größten Astronomen zu einigem Ansehen gelangt sind; andere dagegen haben mit Recht Bedenken getragen, ihnen beizutreten, und ohne meinem Urtheile hierüber auch nur das mindeste entscheidende Gewicht beilegen zu wollen, muß ich doch gestehen, daß ich nicht begreife, wie man dieselben mit anerkannten physikalischen Axiomen in Uebereinstimmung bringen will. Nach beiden ist der dunkle Sonnenkörper mit einer Lichtatmosphäre von solcher Elasticität umgeben, daß die Lichttheilchen in Gemätsheit derselben mit der bekannten ungeheuern Geschwindigkeit von circa 40000 Meilen in einer Secunde fortbewegt werden. Wie fein und flüchtig, jedem Widerstande ausweichend, diese Photosphäre sey, ist kaum mit Zahlen auszudrücken, und aus dem Verhalten des ätherischen Lichtstoffes im Kreise unserer Beobachtungen auf keine Weise mit Sicherheit auszumitteln. Dennoch aber soll derselbe um den Sonnenkörper eine gewisse begrenzte Lage bilden, und hiervon täglich so viel ausgesendet werden, als die Planetenbewohner zu ihrer, im Verhältniß zu dem großen Centalkörper des ganzen Systems als untergeordnet anzusehenden, Existenz gerade bedürfen. Durch diese Photosphäre aber ragen die Spitzen des dunkeln Sonnenkörpers mitunter hervor,

wobei ich nicht genau anzugeben vermag, ob hierbei die Höhe der leuchtenden Sonnenatmosphäre an einigen Orten geringer werden, oder die Spitzen der Sonnenberge zunehmen sollen. Nach einer andern Hypothese soll dieselbe sich an einigen Orten trennen, und einen Blick auf den dunkeln Sonnenkörper gestatten. Dafs wir aber hierdurch den angenommenen Begriff der Elasticität, Feinheit und Flüssigkeit derselben völlig wieder aufheben, leidet keinen Zweifel, und ich mag dieses nicht durch die Parallele anschaulich machen, dafs man sich die Atmosphäre der Erde mit Oefnungen und Lücken denken sollte, durch welche von einem entfernten Planeten aus der Erdkörper gesehen werden könne.

Oft wiederholte Beobachtungen der Sonnenflecken im Sommer 1817 und 18 theils mit einem vierfüßigen Achromaten von Wellington, dessen Blendglas ein sehr klares weißes Bild der Sonne giebt, und welcher zu der ungemein schönen Sammlung physikalischer Instrumente des hier privatisirenden H. Bertheaud gehört, theils mit einem fünftehalbfüßigen Frauenhofer, haben mich auf eine Hypothese gebracht, welche vielleicht weniger mit anerkannten Naturgesetzen streitet. So oft und so deutlich auch die Sonnenflecken beschrieben und gezeichnet sind, so ist doch meines Wissens nirgend die Bemerkung beigefügt, welche ich allezeit bestätigt gefunden habe, dafs mindestens jeder grössere Sonnenfleck nach seinem Verschwinden eine Art Narbe, welche als ein hellerer Streifen erscheint, zurückläßt. Vorzüglich genau kann man dieses wahrnehmen, wenn die Stelle an den Rand der Sonne kommt. Wenn wir nun mit *Biot* und mehreren Physikern die Sonne für einen glühenden Körper hal-

## 28 Muncke üb. ein. räthselh. Naturphänom.

ten dürfen, und zugleich annehmen, daß die specifische Leichtigkeit derselben eine Folge ihrer größerer Ausdehnung durch die Wärme sey, so übersteigt diese Glühhitze alle unsere Vorstellungen, welche wir aus ähnlichen Erscheinungen auf der Oberfläche unserer Erde entlehnen, und ich halte es für gänzlich überflüssig, dieses durch eine Berechnung darzuthun, bei welcher ohnehin die Constanten mit der erforderlichen Schärfe auf keine Weise bestimmt werden könnten. Auf allen Fall aber muß die Hitze und Flüssigkeit, aus der Analogie zu schließen, nach Innen abnehmen; obwohl, in Folge des oben aufgestellten Lehrsatzes am heftigsten völliges Erkalten zu denken ist. In dieser flüssigen Masse denke ich mir einzelne größere und kleinere, nicht völlig geschmolzene Stücke schwimmend, welche nach statischen Gesetzen zuwallen über die Oberfläche hervorragen, und die mehr oder mindere dunkle Flecken bilden. Wo die flüssige Masse an den Rändern zum Theil überfließt, zum Theil unterbrochen ist, entsteht der punktirte Rand, und wenn sie wieder untersinken, bleibt die Narbe, wo die beiden flüssigen Ränder wieder zusammengestossen sind, noch einige Zeit sichtbar. Ob von dieser glühenden Masse metallische und sonstige Stoffe losgerissen und im Raume des Sonnensystems zerstreut werden können, darüber, so wie überhaupt über den Prozeß der Licht- und Wärme-Ausscheidung, erlaube ich mir hier vorerst noch keine Hypothese.



Ueber einen

Pyrophor,

welcher

bei der Sublimation des

Salmiaks

erzeugt wird.

Von

Dr. H a n l e i n L a h r.

In meiner chemisch-technischen Abhandlung über den Salmiak (Frankfurt bei J. Ch. Hermann) habe ich die merkwürdige Erscheinung mitgetheilt, daß der Rückstand des, auf direktem Wege, durch Sättigung des Ammoniaks mit Salzsäure verfertigten Salmiaks, nach dem Zerschlagen des Sublimirgefäßes, bei Berührung der Luft, sich schnell entzündet, und in heftige Gluth geräth, und also ein wahrer Pyrophor ist.

Dieser entzündliche Rückstand enthält, außer etwas salzsaurem Ammoniak, keine andern salzige oder ühliche Theile; seine übrigen Bestandtheile sind: Kohlenstoff, Stickstoff und etwas Wasserstoff. Man weiß aber, wie sehr der Stickstoff in Verbindung mit Kohle das Verbrennen derselben erschwert.

Die Ursache dieser Selbstentzündung muß also darin liegen, daß die thierische Kohle im Glühfeuer zerlegt und ihre beiden Grundlagen, Ammoniumoxyd, und das Oxyd der Kohle, zum Theil desoxydirt werden, in welchem Zustande sie, bei Berührung der feuchten atmosphärischen Luft, den Sauerstoff aus derselben begierig anziehen, sich erhitzen, und als verbrennliche Substanzen ins Glühen gerathen, wobei sich etwas Wasserstoffgas entwickelt, das theils mitverbrennt, theils von der Kohle verschluckt wird.

Zunächst in der Kohle kann zwar die bewegende Ursache der Entzündung, nicht aber der innere Grund des Verbrennens gesucht werden, da bekanntlich keine, am allerwenigsten die thierische Kohle, in ganz verschlossenen Gefäßen, zum Glühen gebracht werden kann. Läßt man den Rückstand 1 bis 2 Tage lang, bedeckt, im Glaskolben stehen, so oxydirt sich die Kohle allmählig und ohne Entzündung.

Es ist also bloß die Heftigkeit der Bewegung, bewirkt durch das schnelle Anzieln des Sauerstoffs aus dem dunstförmigen Wasser der Luft, wodurch der an solches gebundene Licht- und Wärmestoff plötzlich frei wird, als Feuer hervortritt, die Kohle durchdringt, und auf diese Art das Glühen verursacht; ein Phänomen, aus welchem man mit aller Wahrscheinlichkeit auf die Metallität der Kohle schließen kann.

Man wird vielleicht fragen, warum der auf dem Wege doppelter Verwandtschaft erzielte Salmiak keine selbstentzündliche Kohle zurückläßt? Hier aber sind jene Bedingungen nicht gegeben; denn bei dieser Sublimation bietet die Gegenwart von salzsaurem und schwefelsaurem Ammoniak, salz- und schwefelsaurem

Natron, und salzschwefel- und kohlen-saurer Kalk-  
erde, unter welchen Substanzen immer einige Zerse-  
tzung vorgeht, der Kohle hinlänglichen Sauerstoff dar,  
um sie jenes Processes zu überleben.

Bei diesem Verbrennen wird die Kohle nicht in  
Asche verwandelt; sie bleibt Kohle; denn sie nimmt  
nur so viel Sauerstoff (und Wasserstoff) auf, als das  
Verhältniß zur Grundlage des Stickstoffs, als eines  
integrirenden Bestandtheils derselben, erfordert, nach  
dessen Wiederherstellung die Kohle wieder verlischt.  
Nur das dabei befindliche salzsaure Ammoniak, das  
als zufällig betrachtet werden kann, wird in der Hitze  
verflüchtigt, weshalb die Masse sogleich unter Was-  
ser gebracht werden muß.

Der Schwefel ist nicht als ein wesentlicher Be-  
standtheil aller Pyrophöre zu betrachten; denn nicht  
alle enthalten ihn; wo er zugegen ist, befördert er  
das Verbrennen, weil er selbst ein verbrennlicher  
Körper ist, und in dieser Eigenschaft die elektrischen  
Kräfte erhöht.

Aber absolut bedingt zur Bildung eines Pyro-  
phors ist die Gegenwart der Kohle in Verbindung mit  
metallischen Grundlagen verschiedener Art, und das  
Wasser; welche Stoffe, mit einander in Contact ge-  
bracht, den electrochemischen Process hervorrufen.  
Werden die entgegengesetzten Electricitäten hiedurch  
auf einen hohen Grad gesteigert, so sind sie jedesmal  
von Licht und Wärme begleitet, das Wasser wird  
zerlegt, sein Sauerstoff bildet Oxyde, sein Wasserstoff  
wird von der Kohle verschluckt, oder verbindet sich  
mit dem Stickstoff, und so wird das Gleichgewicht  
wieder hergestellt. Ist die electricische Spannung  
schwach, so wird nach Maafgabe der respectiven ge-

zingen Intensität des electricischen Gegensatzes, entweder nur Licht oder nur Wärme erzeugt.

Diese Theorie läßt sich auf alle Pyrophore anwenden; alle enthalten, ausser der Kohle, entweder Kali, oder Ammoniak, oder ein anderes Oxyd, in einem gewissen Grade der Desoxydation ihrer metallischen Grundlagen, deren Bestreben sich mit Sauerstoff zu sättigen, d. h. ihre vorige Indifferenz wieder herzustellen, das Resultat des Verbrennens zur Folge hat.

Davy erhielt einen Pyrophor, als er Kohlensäure durch Kalimetall zersetzte, und letzteres im Uebermaas anwandte. Schon dieses Uebermaas deutet an, daß es zur Hervorrufung der pyrophorischen Eigenschaft der Kohle nicht hinreicht, bloß die Kohlensäure in Sauerstoff und Kohlenstoff zu zerlegen, sondern daß selbst das Grundprincip des Kohlenstoffs durch Berührung seines Sauerstoffs in Bewegung gesetzt werden mußte, um jene Erscheinung hervorzubringen, und daß also das Kalimetall eine stärkere Anziehung gegen den Sauerstoff äussert, oder in einem größern Verhältnisse zu demselben steht, als die metallische Base der Kohle, deren Daseyn sich in diesem Versuche zur Ueberzeugung ausspricht; denn woraus sollte sonst nach Wiederherstellung des Kali, der erzeugte Pyrophor bestehen?

Das Verbrennen von Davy's olivengrüner Substanz \*), die Selbstentzündung des, mit oder ohne Kali, geglähten Rufs, und Woodhousens \*\*) Beob-

achtungen über die Selbstentzündung des Rufs, und die Bildung des Pyrophors.

\*) Schweigger's Journal etc., 1. B. 3. H. 1800.

\*\*) Kbandauslat, 1800.

achtung der Entzündung und Ammoniakentwicklung von mit Kali calcinirter Kohle bei Besprengung mit kaltem Wasser etc. beruhen auf denselben Gründen. Ohne Annahme metallischer Grundlagen ist die pyrophorische Erscheinung nicht befriedigend zu erklären, und ich glaube, man könnte aus den, von mehreren Naturforschern gemachten sehr lehrreichen Versuchen bereits die hypothetische Wahrheit ableiten, *dafs alle saatzfähigen Basen Oxyde, und deren, ihrer Natur nach von einander verschiedene, Grundlagen die Organe sind, durch welche der Charakter eines jeden, d. h. sein eigenthümliches Hervortreten in die Sinnenwelt, festgesetzt wird.* Betrachten wir z. B. den Stickstoff als aus Ammoniakmetall, Sauerstoff und Wasserstoff, in einem bestimmten Verhältnifs, zusammengesetzt, so wird uns manche Erklärung leichter werden, und die trügerischen Phänomene, die uns bei einigen Versuchen Wasserstoff darbieten, wo wir Stickstoff, und diesen, wo wir Wasserstoff erwarten, uns nicht mehr täuschen.

Dafs auch die Pflanzenkohle Stickstoff enthalte, hat *Proust*, durch Bildung von Blausäure, mittelst des Glühens der Kohle mit Kali, für mehrere Arten von Kohlen indirect bewiesen. Die Holzkohle ist aber von der thierischen darin unterschieden, dafs in letzterer das Ammoniakoxyd und in jener das Oxyd der Kohle vorwaltet. Auch ist der Zutritt des Stickstoffes zur Pflanzenkohle nicht wesentlich, sondern oft nur als zufällige Folge des Holzverkohlungsprocesses zu betrachten, wobei der Stickstoff der eingeschlossenen atmosphärischen Luft zerlegt wird; dessen Oxyd sich dann mit der Kohle verbindet.

Noch habe ich Beispiele von Selbstentzündung anzuführen, welche nicht auf pyrochemischem Wege erzeugt werden, z. B. feuchtes Heu, mit Fett getränkte und fest zusammengepackte Wolle, frische Kräuter, mit Oelen oder Fetten gekocht, u. s. w. welche Substanzen, wenn sie fest zusammengepresst werden und auf einander liegen bleiben, sich erhitzen, und leicht in Entzündung gerathen. Es sind ebenfalls Pyrophore, zu deren Bildung die Natur, statt des Feuers, die Gährung einschlägt, und bei deren Erklärung wir wieder zu oben angegebenen Gründen zurückgeführt werden.

Das Moment dieser Veränderung organischer Substanzen ist der Uebergang der zweiten Gährungsperiode \*) in die dritte, oder in die *faule Gährung*. Sie ist das Resultat des in Thätigkeit gesetzten Electricismus im Conflict mit dem Chemismus; — entgegenwirkender Kräfte, wodurch die harmonische Verbindung (das Gleichgewicht) des organischen Ganzen aufgehoben, und der Körper in seine letzten Grundstoffe aufgelöst wird. Diese Stoffe vereinigen sich nun durch Masseanziehung, und die neuen Produkte sind Gebilde der *unorganischen Natur* \*\*). (S. meine *Abhandl. über den Salmiak*, Seite 38 und 39.)

Oft gehen diese Substanzen, wenn nicht alle Umstände zu einer *Entzündung* zusammentreten, blofs in eine *Verkohlung* über, und unwillkührlich wurde ich durch Betrachtung dieses Gegenstandes zu der Idee

---

\*) oft ein Ueberspringen derselben.

\*\*\*) Das auf diesem Wege erzeugte Kali enthält immer Stickstoff, H.

hingezogen, daß das Selbstverbrennen lebender, ausgetrockneter Menschen, welche viele geistige Getränke zu sich nahmen, ein wahrhaft pyrophorischer Process seyn könne, der in Zerlegung der geistigen Flüssigkeit durch Wasserbildung (als höchstes Bedürfnis der Natur) und dadurch veranlaßte Desoxydation des Stick- und Kohlenstoffs \*) besteht, welche Stoffe sich sofort, auf Kosten des Lebens, wieder oxydiren, und den thierischen Organismus zerstören. — Ein beachtenswerther Gegenstand für thierische Chemie.

Eben so halte ich die Phosphorescenz in Fäulnis übergehender Substanzen für einen unvollkommenen Pyrophor, oder für ein Verbrennen, bei welchem sich, wegen der Trägheit der Kräfte und Langsamkeit der Bewegung, nur Licht entwickelt.

---

\*) erregt durch thierische Electricität.

Analyse  
des  
Mejonits

Prof. Leopold Gmelin

in Heidelberg.

Der von mir untersuchte Mejonit war vom Vestr, wo er sich in Drusenhöhlen grauer, in früheren Ausbrüchen ausgeworfener, Kalksteinfragmente nicht ganz häufig vorfindet. Sehr hinderlich für die Untersuchung war der undurchsichtige, weiße, weichere, mit Säuren brausende Ueberzug, entweder durch vorübergehende Einwirkung des vulkanischen Feuers oder durch Verwittern hervorgebracht, mit welchem sich die meisten Krystalle bedeckt zeigten. Auch mußte die Kleinheit der oft mit fremdartigen Fossilien, wie Leucit, Kalkstein u. s. w. vereinigten Mejonitkrystalle, welche keine ganz genaue mechanische Sonderung zuliefs, das Resultat der Analyse minder genau machen.

Das specifische Gewicht der von mir analysirten Mejonitstücke fand ich durch das Nicholsonsche Aräometer gleich 2,650, was mit dem von Mohs gefunde-



nen specifischen Gewichte, von 2,612 nahe übereinkommt.

### *Verhalten des Mejonits im Feuer.*

Die Angabe von *Lelievre*, als sey der Mejonit leicht unter Aufschäumen, zu einem blasigen weissen Glase schmelzbar, welche in die meisten Handbücher der Mineralogie übergegangen ist, habe ich nicht bestätigt gefunden, da es mir bei wiederholten Versuchen nicht gelungen ist, mit einem guten Löthrohre feine Stückchen Mejonits auch nur an den Kanten zu schmelzen.

In einer Glasröhre erhitzte Mejonitstücke entwickelten wie so manche andere Fossilien wenige wässerige, brenzlich riechende und geröthetes Lackmuspapier bläuende Dämpfe, wobei sie 0,4 Proc. am Gewicht verloren. Bei weiterm Erhitzen derselben in einem Platintiegel bis zum starken Rothglühen verflüchtigten sich noch 1,2 Proc., worauf sich das Fossil weder zusammengebacken, noch in der Durchsichtigkeit verringert, hingegen der Platintiegel violett angelauten zeigte.

Aus dem geblühten Fossile, wahrscheinlich vorzüglich aus seinem weissen Ueberzuge, läßt sich durch Wasser freier Kalk ausziehen.

### *Analyse durch kohlen sauren Baryt.*

4,439 Gramm Mejonitstücke wurden mit 20,0 Gr. kohlen sauren Baryts innig gemengt in einem Platintiegel, der von einem irdenen umgeben war, 1/2 Stunde lang dem Essenfeuer bis zum schwachen Weissglühen ausgesetzt. Im Deckel des Platintiegel zeigte sich ein geringes weisses, Curcuma röthendes Sublimat, das

mit Schwefelsäure 0,045 Gr. Salz lieferte, dessen Menge jedoch zu gering war, um mit Sicherheit als schwefelsaures Lithion erkannt werden zu können, für welche Vermuthung jedoch die größere Flüchtigkeit dieses Alkalis spricht. Den übrigen Theil der durch Salzsäure, Schwefelsäure, Ammoniak und klee-saures Ammoniak bewirkten Zerlegung übergehe ich, da er nichts Besonderes darbietet.

#### Analyse durch Salzsäure,

Da ich mich bald überzeuge, das der Mejonit, mit Salzsäure im Mörser zart eingerieben, unter schwacher Kohlensäureentwicklung (die wohl bloß vom Ueberzuge abzuleiten ist) stark angegriffen und beim Erhitzen vollständig zersetzt, und in eine Gallerte verwandelt würde (obgleich in manchen Handbüchern der Mineralogie das Nichtgelatinisiren des Mejonits als ein Kennzeichen aufgeführt wird), so bediente ich mich dieser einfacheren und sicherern Methode, bei der ich Alaunerde und Eisenoxyd durch reines und den Kalk durch kohlensaures Ammoniak abschied.

Die gelungenste Analyse mit Salzsäure gab mir in 100. getrockneten Mejonits:

Kieselerde	40,8
Alaunerde	30,6
Kalk	22,1
Natron mit wenig Lithion	2,4
Eisenoxyd	1,0
Kohlensäure und Verlust	3,1

---

100,0

Das Natron gab sich mir in seiner Verbindung mit Schwefelsäure durch das Verwittern seiner Krystalle zu erkennen: die Gegenwart des Lithions vor-

muthe ich vorzüglich aus der violetten Färbung des Platintiegels, da es mir nicht gelang, seine kleine Menge isolirt darzustellen. — Ich enthalte mich, das Resultat dieser Analyse einer Berechnung nach der Proportionslehre zu unterwerfen, weil theils der Ueberzug, theils die Beimengung fremdartiger Fossilien einen Fehler in das Resultat bringen mußten. Am meisten nähert sich dieses Fossil in seiner Zusammensetzung dem Scapolith und dem Prehnit,

## 10 Ueber Erscheinungen

~~schon mehrfach vorkommend, dass die Eisberge~~  
und die Eisberge, die sich in der Arktik  
auf der nördlichen Küste von Grönland  
zu finden pflegen, von den Schiffen  
als Hindernisse betrachtet werden, und  
dieser Umstand hat die Aufmerksamkeit  
der Naturforscher auf sich gezogen,  
und hat zu mehreren Beobachtungen  
geführt, die die Natur dieser Erscheinung  
besser kennen lehren.

### Neue Nachrichten

über die

## Erscheinungen,

*welche jetzt die nördlichen Meere darbieten.*

(Aus den Annal. de Chim. et d. Phys. Tom. VIII, Jul. 1818)

p. 328 f.)

---

**E**s ist unsere Absicht, in diesen wenigen Blättern einige verbürgte Nachrichten, aus englischen Zeitschriften, über den Eisbruch zusammenzustellen, den gegenwärtig die Eisberge erleiden, welche seit mehreren Jahrhunderten Grönlands Küsten umgaben, und die Seefahrer verhinderten, sich dem Nordpol zu nähern. Auch werden wir diesen mehrere neue Beobachtungen über die Strömungen beifügen, welche eine unmittelbare Verbindung der Baffinsbai mit dem nördlichen Meere, und eine gänzliche Trennung Asiens von Amerika sehr wahrscheinlich machen.

Der Capitain *Beaufort* begegnete am letzten 4. October im  $46^{\circ} 30'$  nördlicher Breite Eisbergen, welche die Strömungen nach Süden trieben.

Der Lieutenant *Parry* begegnete gleichfalls, welchen am 2. April in einer nördlichen Breite von  $44^{\circ} 51'$ .

Die Kriegsschaluppe (*the Fly*) segelte gegen Ende März im  $42^{\circ}$  N. B. zwischen zwei großen schwimmenden Eisinseln durch.

Das vom Capitain *Vivian* commandirte Packetboot von Halifax, *la Grâce*, spürte, als es am letztverwichenen 28. März in die nördliche Breite von  $41^{\circ} 50'$  und von Greenwich westliche Länge von  $50^{\circ} 55'$  gekommen kam, den ganzen Tag einen außerordentlich kalten Nordwind, der die Nähe des Eises verkündete. Am folgenden Morgen bemerkte man wirklich eine Menge schwimmender Inseln, deren einige sich 200 bis 250 Fufs über die Meeresfläche erhoben, sich nach allen Richtungen bewegten, und einen Raum von mehr als 7 Stunden einnahmen.

*William Dayment* Vorsteher der *Beig Ann de Poole*, verließ den Hafen von Greenspond in Terra nova am Morgen des 19. Januar 1818, und Abends begegnete er schwimmenden Inseln. Am folgenden Morgen, bei Sonnenaufgang, war das Schiff so von Eis eingeschlossen, daß man selbst von dem Maste aus keinen Ausgang wahrnahm.

Das Eis erhob sich in diesem ganzen Umfange ohngefähr 14 Fufs über die Wasserfläche, bewegte sich gegen Südost und zog das Schiff 29 Tage lang in derselben Richtung. Am 17. Februar bemerkte der Capitain *Dayment*, als er sich 500 Meilen östlich vom Cap Race und im  $44^{\circ} 57'$  nördlicher Breite befand,

gegen Südost einen Ausgang und wurde so frei. Vom 19. Januar bis zum 3. Februar machte die Brig täglich nur 4 Meilen (1 1/3 Stunde); vom 3. bis zum 17. Februar aber betrug ihre Schnelligkeit in einer Stunde beinahe eine Meile. Dayment berichtet, daß er während der 29 Tage, welche diese sonderbare Fahrt anhielt, mehr als 100 sehr große Berge von festem und bläulichem Eis wahrgenommen habe, welches die Seefahrer *Groenländisches Eis* nennen.

Auf ihrer Fahrt von Sanct Johann in Neufundland nach Schottland begegnete die Brig *Funchal* von Greenock zweimal wiederholt großen Eisfeldern; sogleich am 17. Januar 1818, ohngefähr 15 Meilen von dem Hafen, den sie so eben verlassen hatte, und dann am 20. desselben Monats im 47° 1/2 Breite. Das erste war 8 Meilen (beinahe 3 Stunden) breit und man sah seine Gränze nach Norden nicht; das zweite, eben so ausgedehnt, trug auf seiner Mitte einen ungeheuren Eisberg (an immense ice-berg).

Wir wollen hiermit diese Aufzählung schliessen, denn sie reicht hin, um zu beweisen, daß die Ortsveränderung des Eises sich zu gleicher Zeit auf einem großen Raume der nördlichen Meere zugetragen haben muß, und daß sie noch fort dauert. Die Zeitschriften erzählen auch, daß einige dieser schwimmenden Inseln sich bis zu den Tropen hinabgeben und nichtsdestoweniger ziemlich große Ausdehnungen behalten hätten, und daß man deren unter andern auch nahe bei dem Kanal von Bahama gesehen habe. Wir haben nun keinen Grund dieses Factum in Zweifel zu ziehen; aber wir haben es uns zum Gesetze gemacht, in diesen Auszug nur solche Angaben aufzunehmen, welche ganz glaubwürdig sind, und das

wird man den erstern nicht streitig machen; denn wir haben sie in einer Abhandlung *Barrow's*, Sekretärs der englischen Admiralität, gefunden.

Die Bewegung des Eises, die man seit einigen Jahren in der Nachbarschaft der Bank von *Terra-nova* beobachtet hat, beweist, daß auf der Küste von Labrador eine Strömung seyn muß, welche in jeder Jahreszeit von Norden nach Süden geht. Dieses Resultat wird übrigens durch das Zeugniß aller Seefahrer bestätigt, und unter andern durch das des Kapitain *Buchan*, der in diesen Gegenden 5 Jahre hintereinander stationirt war. Daraus geht hervor, daß die unter dem Namen *Gulf stream* bekannte Strömung, welche von Süden nach Norden längs der östlichen Küste der vereinigten Staaten läuft, nicht über *Terra Nova* hinausgeht und daß also die tropischen Erzeugnisse nicht auf diesem Wege in die nördlichen Meere gelangen können. Von den zahlreichen Beispielen, die man anfahren kann, um die Thatsache zu bestätigen, daß der *Gulfstrom*, wenn er bis *Terra Nova* gelangt, sich gegen Osten wendet, und nach einer zweiten Beugung sich gegen die Küsten von Frankreich, Spanien, Portugall und Afrika kehrt, wählen wir hier nur die zwei folgenden, weil sie ganz neu sind.

Am 25. Jun. 1817. warf der Capitain der *Catharina* von London, als er sich im 44° nördlicher Breite und heiläufig im 15°, 49' westlicher Länge von Greenwich befand, seine wohl verpichtete Flasche, in die er einen Zettel gethan hatte, ins Meer; und man fischte diese Bouteille am vergangenen 16. November, mitten in der Bucht von Carnate in der Provinz Gallizien auf.

Im Mai 1817. genau in derselben Bay von Car-

nate wurde eine zweite schwimmende Flasche aufgefangen, welche ein an M. John Williamson Shik von Georgien adressirtes Billet enthielt, und vom Capitain *W. Baugh* im  $49^{\circ}$  nördlicher Breite und  $43^{\circ}$  westlicher Länge während seiner Reise nach Liverpool auf dem Schiff *Georgia* ins Meer geworfen war. Der Zettel war nicht datirt.

Man sieht leicht, wie viele sonderbare Notizen man in kurzem über die Richtung und Geschwindigkeit der beständigen Strömungen erhalten würde, wenn die Seefahrer sich die Mühe gäben, von Zeit zu Zeit den Meeresfluthen wohl verschlossene Flaschen anzuvertrauen, die immer eine genaue Angabe des Orts und Tags, wo sie ins Meer geworfen wurden, enthielten. So ist es z. B. wahrscheinlich, daß, wenn man dieses Mittel schon bei Cooks Reisen gebraucht hätte, als er die nördlichen Küsten von Asien und Amerika untersuchte, man jetzt nicht mehr über die Trennung dieser Erdtheile streiten würde, und daß man dann wissen würde, ob die Behringsstraße, wie Capitain *Borney* behauptet, nur der Eingang einer tiefen Bucht ist, oder ob sie mit dem Meere um den Nordpol in Verbindung steht.

Wir haben eben angeführt, daß, in jeder Jahreszeit längs der Küste von Labrador, eine von Norden nach Süden gehende Strömung Statt findet, in welcher man oft schwimmendes Holz, das nur unter den Tropen wachsen konnte, findet; es ist demnach schwer zu begreifen, daß es anders als durch die Behringsstraße in die nördlichen Meere sollte gekommen seyn. Der Gouverneur der dänischen Niederlassung an der *Discon Bay*, die auf der westlichen Küste von Groenland liegt, besitzt einen Tisch von Elephaantenbaum aus ei-



nem Stamm, der in jener Gegend mitten in der nördlichen Strömung, von der wir eben sprachen, aufgefischt wurde; man bekam auch zu gleicher Zeit einen Campeschen-Baum mit.

Kämen diese Producte von der Landenge, welche die beiden Amerika verbindet, aus dem Meerbusen von Mexiko, so würde sie die Gulf stream bis Terra Nova und von da gegen einige Küsten von Frankreich oder Spanien haben führen können; allein man kann nicht zugeben, daß sie der Küste an Labrador gefolgt, und gegen die reisende Strömung geschwommen wären, die aus der Davisstraße herabkommt.

Im Jahr 1786 entdeckte der dänische Admiral *Loewenorn*, im Angesicht der grönländischen Küste, in einer Breite von  $65^{\circ} 11'$  und im  $35^{\circ} 8'$  westlicher Länge von Paris, ebenfalls einen Elefantenbaumstamm, der so groß war, daß man ihn, um ihn aufs Schiff zu ziehen, zersägen mußte. Dieser Stamm war bis zum Kern von Würmern zerfressen, denn sonst hätte er, wie bekannt, nicht schwimmen können. Man fing ihn in der von Nordost nach Südwest, der Küste von Grönland parallel laufenden Strömung auf, welche jährlich eine so große Menge schwimmenden Holzes an die nördlichen Gestade von Spitzberg, der Insel Jean-Mayen und Island führt. Hier kann man nun unmöglich annehmen, daß der Elefantenbaum durch unbekannte Flüsse, deren Mündungen sich im Norden der alten und neuen Welt öffneten, in die nördlichen Meere geschwemmt worden sey, da man weiß, daß dieser Baum nur in Amerika und nahe am Aequator wächst. Nicht zu gedenken, daß auch andere Arten schwimmenden Holzes, das die Buchten von Spitzberg anfüllt, oft von *Seewürmern* (Sea-worm)

durchlöchert sind, welche nur in den heißen Clima-  
ten leben.

Die Theorie, die wir Tom. VII. S. 193 entwickelt haben, und nach welcher alle Tropen-Producte durch die Behringsstraße in das nördliche Eismeer gelangt wären, setzt voraus, daß im stillen Ocean eine von Süden nach Norden gehende Strömung sey, von der die nördliche Strömung im atlantischen Meere, die aus der Davisstraße von Spitzberg und der Ostküste von Grönland kommt, so zu sagen, nur eine Verlängerung wäre. Nun haben aber bereits die Seefahrer, wenn sie gleich die Meere von Japan und Kamtschatka viel weniger als den nördlichen atlantischen Ocean befahren haben, einige Thatsachen gesammelt, welche das Daseyn eines solchen Stromes ausser allem Zweifel setzen.

In jedem Jahre wird eine ungeheure Menge schwimmendes Holz an die mittäglichen Küsten der den aleutischen Archipelagus ausmachenden Inseln ausgeworfen. Man bemerkt darunter Lärchen, Tannen, Espen und andere Bäume, welche im Ueberflufs wachsen, jedoch mehr im Süden auf den zwei entgegengesetzten Küsten von Asien und Amerika. Das wahre Kampherholz (the true camphor-wood), ein Erzeugniß der heißen Klimate, verdient eine besondere Erwähnung, weil es zeigt, daß die Strömung der Wogen von Süd nach Nord sich im stillen Meere wahrnehmen läßt, ja sogar sehr nahe beim Aequator. Dieses Holz bleibt nicht ganz in den südlichen Buchten der Aleutischen Inseln. Eine beträchtliche Menge desselben schwimmt in die von den Inseln gelassenen Zwischenräume, und wird bis über die Behringsstraße hinaufgetrieben. Auf Cooks letzter Reise fischten die

Matrosen der *Résolution* und der *Découverte* schon im 70° der Breite täglich so viel Holz aus dem Meere, als sie zu ihrem Bedarf nöthig hatten. Auch sagt der Capitain *Clerke* in seinem Tagebuche ausdrücklich, daß dieses Holz vortreflich gebrannt habe und nicht im geringsten von Nässe durchdrungen (it was not in the least water-soaked); woraus zu folgen scheint, daß es nicht lange schwamm und daß die Bäume, welche die südliche Strömung in diese Gegenden geführt hatte, das vorige Jahr schon bis zum Polar-Meerbusen vorgeedrungen waren.

Die Nord-Südströmung längs den Küsten von Spitzberg und Grönland ist reisend und sehr breit, während die südnördliche, welche Cook in der Behringsstraße bemerkte, schmal ist und in einer Stunde nur eine Viertelstunde zurücklegt. Diese Verschiedenheit ist der stärkste und vielleicht der einzige Grund, den man der Verbindung der beiden Ströme entgegensetzen kann. *Barrow* meint, daß das abfließende Meer aus den Polarbassins ersetzt wird vermittelst einer Strömung, die, nach ihm, mit einer großen Schnelligkeit über die Eisgränze im Norden der Behringsstraße hinausläuft; und um zu beweisen, daß diese Idee sehr natürlich ist, führt er an, daß die Eisberge (seebergs), deren untere Fläche beträchtlich unter das Wasser sinkt, zuweilen den Winden entgegen schwimmen, und also ganz anders, als die Massen, welche, so zu sagen, nur auf der Oberfläche der Wellen ruhen. „Es ist erstaunlich, sagt der Naturforscher *Fabricius*, der mehrere Jahre lang in Grönland wohnte, die Schnelligkeit zu sehen, mit der sich ein Eisberg zuweilen gegen den Wind bewegt; aber es ist klar, daß dieß davon herrührt, daß die Grund-

fläche des Berges, die sehr tief unter Wasser ist, einen großen Stofs von einer untern Strömung erhält, während der Wind nur auf den bei weitem kleineren über die Wasseroberfläche hervorragenden Theil wirken kann. Da aber die Eisberge sehr ungleiche Tiefen haben, so wird man auch leicht begreifen, wie es manchmal kommt, daß der eine der Richtung der bestimmten Strömungen auf der Oberfläche durch die Wirkung des Windes folgt, während ein anderer, ganz in der Nähe, sich entweder langsamer oder ihm entgegen bewegt.

Wir schließen diesen Auszug mit einigen Beobachtungen in der Nähe von Grönland, die sich auf die Temperatur und specifische Schwere des Seewassers beziehen. Man wird hier den Beweis finden, daß, wenn man sie mit denen von *John Davy* (Tom. VII. pag. 30 f.) vergleicht, die Meinung, nach welcher die *Salzigkeit* und folglich die Dichtigkeit des Seewassers um so geringer ist, je höher die Breite wird, keinen Grund hat.

in den nördlichen Meeren.

	Breite.	Länge.	Temperatur des Meerwassers.	Specificches Gewicht.	Bemerkungen.
1811. Jul. 2.	78° 26' N.	4°, 16' O.	+ 30, 0.	1, 0265	
17.	70, 36	1, 35	+ 6, 1	1, 0271	
1812. April 28.	70, 0	2, 40	+ 4, 4	1, 0274	
1814. April 31.	72, 16	8, 30	+ 5, 0	1, 0269	
1815. April 9.	72, 37	6, 11	+ 3, 9	1, 0261	Kein Eis.
April 18.	77, 35	5, 40	+ 3, 4	1, 0267	Unter dem Eise.
Mai 24.	78, 0	4, 36	+ 1, 1	1, 0259	Viel Eis.

Die Längen in dieser Tabelle sind nach dem Meridiane von Paris berechnet.

## A b h a n d l u n g

über das

## Cyanogen und die Hydrocyansäure,

von

*V a u q u e l i n.*

(Uebersetzt aus den Annalen der Chemie und Physik Tom. IX. October 1818. von S. Haas, Mitglieder der physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen. \*)

Herr *Gay - Lussac* erinnert bei der schönen Arbeit über Cyanogen und Hydrocyansäure, die jedem andern minder Unterrichteten als ihm vollendet geschehen haben würde, daß noch mehrere Versuche zu machen übrig beyen, um ihr den höchstmöglichen Grad von Vollkommenheit zu geben, und fordert daher die Chemiker auf, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen.

Um nun den Wunsch unsers Collegen einigermaßen zu erfüllen, unternahm ich die Versuche, deren

\*) *D. z. H.* Vergl. B. 25. § 489. Note.

Resultate ich hier darlege. Ob ich gleich schon einen gebahnten und leicht zu verfolgenden Weg vor mir halte, so bin ich doch weit entfernt, mich ganz am Ziele zu glauben; es sind noch viele Seitenpfade, mit jenem Wege verzweigt, der Entdeckung aufbehalten; aber das giebt sich mit der Zeit.

*Von der Veränderung, welche das, in Wasser aufgelöste, Cyanogen mit der Zeit erleidet.*

Ich beginne meine Abhandlung mit diesem Gegenstand, weil von der genauen Kenntniß der Veränderung des Cyanogen's durch Wasser, die Erklärung einer Menge ihm eigenthümlicher Erscheinungen, so wie auch die Wirkung der Hydrocyansäure auf andere Körper, abhängt.

Man weiß, daß das Gas, von dem hier die Rede, ohngefähr in  $4\frac{1}{2}$ mal seines Volums Wasser auflöslich, und daß seine Auflösung sauer und von sehr stechendem Geruch und Geschmack ist.

Die frisch bereizete Auflösung ist wasserhell; aber schon nach Verlauf von einigen Tagen färbt sie sich hellgelb, hernach braun und endlich setzt sie einen Stoff von eben dieser Farbe ab.

Während sich diese Veränderungen ereignen, vermindert sich der Geruch um Vieles; er scheint nicht mehr ganz der vorige zu seyn, man glaubt vielmehr den der Hydrocyansäure darin zu erkennen. Daß sich wirklich schon Hydrocyansäure gebildet habe, scheint sich auch noch durch die Entwicklung von Ammoniak anzukünden, welche erfolgt, sobald Kali in die Flüssigkeit gebracht wird.

Wenn man indese die Flüssigkeit mit Eisenfeile

versetzt: so bildet sich demohngeachtet kein Berlinerblau, wie mit der reinen Blausäure, wovon wir aber die Ursache weiter unten sehen werden.

Bringt man in diese so veränderte Flüssigkeit Eisenfeile und einige Tropfen Essigsäure: so bildet sich kein Berlinerblau; es entstehet aber sogleich, wenn der vom Eisen abgesonderten Flüssigkeit verdünnte Schwefelsäure zugesetzt wird.

Wenn in die Mischung von Eisenfeile und wässeriger Auflösung des veränderten Cyanogen's Schwefelsäure gebracht wird, so erzeugt sich auf der Stelle Berlinerblau; ist aber Ueberschufs von Eisen vorhanden, so verbindet sich dieser nach und nach mit der Schwefelsäure und das Blau verschwindet, erscheint aber von Neuem durch Hinzusetzung einer bestimmten Menge Schwefelsäure.

Es könnte beim ersten Anblick scheinen, als sey es nicht das Wasser, was im Cyanogen die Zersetzung von der wir so eben sprachen, begründe, denn Alkohol von 40°, der davon das 8fache, dem Volum nach, auflöst, bewirkt die nemliche Veränderung; allein ich habe bemerkt, daß in dem Maafse, wie sich der Alkohol der vollkommenen Wasserbefreiung näherte, auch seine Wirkung auf das Cyanogen abnahm. Gewifs ist es, daß sich Cyanogen im rectificirten Schwefeläther nicht färbt, ob es sich gleich reichlich und schnell darin auflöst.

Wenn man der ätherischen Auflösung des Cyanogen's Wasser zusetzt und beide durch einander schüttelt, so färbt sich das Wasser, nachdem es sich vom Aether abgesondert hat, sehr bemerkbar, und der Aether selbst färbt sich schwach, aber erst später.

Dieser Versuch scheint mir es klar zu beweisen,



dafs das Wasser die wirkende Ursache der Veränderungen sey, welche das darin aufgelöste Cyanogen erleidet.

Wenn Wasser mit einer ätherischen Auflösung des Cyanogen's geschüttelt wird, entzieht es einen Theil des letztern dem Aether, und zu gleicher Zeit nimmt der Aether einen kleinen Antheil Wasser auf, welches, auf das im Aether aufgelöste Cyanogen wirkend, diesen färbt.

Wenn man Wasser, in welchem das Cyanogen die Veränderungen, von denen wir eben sprachen, erlitten hat, der Destillation unterwirft: so erhält man ein alkalisches Product, das die Auflösungen des Bleies und Quecksilbers niederschlägt, einen sehr starken Geruch von Hydrocyansäure verbreitet, und mit schwefelsaurem Eisen Berlinerblau giebt; Kalkwasser wird davon in Flocken niedergeschlagen. Die Flüssigkeit enthält also hydrocyansaures und kohlsaures Ammoniak.

Der Rückstand von dieser Destillation besteht aus einer Flüssigkeit, in welcher eine sehr fein zertheilte braune Materie schwimmt; abgeklärt durch Ruhe gab sie bei gelindem Abrauchen Krystalle, unter denen einige gelblich waren. Diese Krystalle haben einen kühlenden und stechenden Geschmack; auf roth glühendes Eisen gebracht, blähen sie sich auf, verdampfen mit Rauch, ohne sich zu entzünden und hinterlassen eine schwache kohlige Spur: Schwefelsäure entwickelt daraus keinen merkbaren Geruch, wird aber Ammoniak in die Nähe dieser Mischung gebracht, so entstehen weisse Dämpfe. Auf glühende Kohlen geworfen, verbrennen sie nicht, wie ein salpetersaures Salz thun würde.

Die Auflösung dieses Salzes schlägt das salpetersaure Silber und essigsäure Blei in weissen, in Salpetersäure auflöselichen Flocken nieder; sie bewirkt in der Auflösung des salpetersauren Baryts eine Trübung, welche durch hinzugesetzte Salpetersäure wieder aufgehoben wird; mit kaustischem Kali gerieben, stösst sie starken Ammoniakgeruch aus; mit schwefelsaurem Eisen giebt sie kein Berlinerblau, selbst dann nicht, wenn sie mit Kali versetzt worden war; indess Salzsäure, etwas mit Wasser verdünnt, regt aus diesem Salze den Geruch nach Hydrocyansäure auf, der nicht etwa trüglich ist, da Papier, auf welches man Eisenoxyd gebracht hatte, und das einige Zeit jenem Dampf ausgesetzt wurde, sich blau färbte, sobald man es in schwache Schwefelsäure tauchte.

Aus diesen Versuchen folgt nun, dafs das Salz, von dem hier die Rede ist, Ammoniak zur Basis habe; aber welche Säure ist es, die dessen anderen Bestandtheil ausmacht? Ich muthmafste anfangs, dafs es die Salpetersäure sey; aber die Versuche, welche ich anstellte, um dieses vollends zur Gewifsheit zu bringen, bestätigten meine Vermuthungen nicht; so dafs ich glaube, es sey eine neue und eigenthümliche Säure, die sich hiebei gebildet; die geringe Menge, welche ich von diesem Salz erhielt, erlaubte mir jedoch nicht, die Säure daraus darzustellen, um ihre Eigenthümlichkeiten mehr im Einzelnen erforschen zu können.

Man sieht übrigens, dafs sich durch die Zersetzung des im Wasser aufgelösten Cyanogen's drei Säuren erzeugen, die eine vermittelst des Hydrogen's, die beiden andern vermittelst des Oxygens und des Ammoniaks, welches sie sättigt.

Der Antheil Hydrogen, welcher zur Bildung der Hydrocyansäure und des Ammoniaks nöthig ist, macht nicht hinlängliches Oxygen frey, um allen übrigen Kohlenstoff und Stickstoff in Säure zu verwandeln, wodurch dann jener Antheil braunen Stoffes entsteht, welcher während der Zersetzung des Cyanogen's gefällt wird.

*Von der Wirkungsart des Cyanogen's auf die Metalloxyde.*

Ich spreche hier im Allgemeinen von der Art der Wirkung des Cyanogen's auf die Oxyde.

Die Wirkungsart des flüssigen Cyanogen's ist nicht bei allen Oxyden ein und dieselbe; aber die Unterschiede wurden noch nicht genau bestimmt.

Die alkalischen Oxyde z. B., bewirken in dem innern Wesen jener Substanz eine plötzliche und durchdringende Veränderung, deren Resultate wahrscheinlicher Weise die nämlichen sind, wie jene, welche mit dem Wasser allein Statt finden; der Unterschied in den Resultaten hängt dann nur von der Anwesenheit des angewandten Alkali ab. In diesem letztern Fall erfolgen die Erscheinungen, welche wir bei dem in blosem Wasser aufgelösten Cyanogen angegehen haben, rascher; die braune Farbe stellt sich mit einem Mal dar, aber es setzt sich nicht ab, wenn ein Ueberschuß von Alkali vorhanden ist, weil der Stoff, welcher den Bodensatz giebt, im Kali auflöslich ist.

Die Salze, welche hier durch die Veränderung des Cyanogen's gebildet werden, enthalten die nemlichen Säuren, aber Kali oder Natron kann bloß ihre Base seyn, weil das Ammoniak, welches sich bei die-

ser Arbeit erzeugt, frei wird. Dafs sich jemals Cyanoxyde (cyanures d'oxides) bilden, glaube ich nicht.

Das Daseyn des Ammoniak habe ich dargethan, indem ich in ein tiefes Gefäfs eine Verbindung aus Cyanogen und Kali brachte und in den leeren Raum des Gefäßes, mehr als zwei Zoll hoch über die Flüssigkeit einen durch Säure gerötheten Lakmuspapierstreifen hing, der sogleich an allen Stellen sehr lebhaft blau gefärbt wurde. Der Geruch, den diese Verbindung austiefs, so wie das Product aus der Destillation derselben, bewiesen das nämliche.

*Wirkung des rothen Quecksilberoxydes auf das im Wasser aufgelöste Cyanogen.*

Ich suche durch diesen Versuch zu entscheiden, ob sich zwei Salze und dem gemäß zwei Säuren bilden.

Wenn man Deuteroxyd des Quecksilbers in eine wässrige Cyanogen-Auflösung bringt, so verliert sich in kurzem der Geruch des letztern, die Masse des Oxydes vermindert sich, die Flüssigkeit bekommt einen merkbar mercurialischen Geschmack, und das zurückbleibende Quecksilber erhält ein bräunliches Ansehn.

Wird die Flüssigkeit, nachdem sie ihren Geruch verloren, in einer Retorte abgedampft; so erhält man 1) ein alkalisches Product, welches kohlen-saures Ammoniak enthält; 2) ein Salz, welches in vierseitigen Prismen, wie das gewöhnliche Cyanquecksilber krystallisirt; 3) ein anderes durchsichtigeres Salz, welches in vierseitigen Tafeln krystallisirt, deren Kanten zuweilen zugeschräuft sind und dessen Geschmack an-

gangs kühl und stechend, hintennach aber sehr mercurialisches ist.

Dieses Salz ist auflöslicher, als Cyanquecksilber; auf glühender Kohle schmilzt es und verwandelt sich in Rauch, während das Cyanquecksilber verpufft; Kali schlägt nichts aus seiner Auflösung nieder, eine Eigenthümlichkeit, die es mit dem Cyanquecksilber gemein hat.

Das Quecksilber, welches nicht aufgelöst worden war, enthielt einige Spuren kohligen Stoffes; aber viel weniger, als wenn das Cyanogen durch Wasser allein zersetzt worden wäre; was auch natürlich scheint, denn wenn sich ein Cyanquecksilber bildete, so möchte sich nothwendiger Weise das Oxygen, welches mit dem Quecksilber verbunden war, mit einem andern Antheil Cyanogen vereinigen, wodurch das Niederfallen des kohligen Stoffes verhindert wird. Dieser Rückstand, in einer Glasröhre dem Feuer ausgesetzt, entwickelte hydrocyansauren Geruch, wurde schwarz, und das Quecksilber, welches zurückgeblieben war, sublimirte sich.

Die Hydrochlorinsäure entbindet aus diesem Salz einen sehr starken hydrocyansauren Geruch; und bringt man nachher noch Kali in die Mischung, so entsteht ein weißer Niederschlag und es entwickelt sich Ammoniak.

Es bildeten sich also bei dieser Arbeit zwei Salze, wie es auch mit dem Chlorin der Fall ist; aber unterscheiden sich diese Salze durch die Natur ihrer Säure, oder liegt die Verschiedenheit blofs in der Gegenwart von Ammoniak bei dem einen? Es möchte wohl natürlich scheinen, anzunehmen, es hätten sich zwei Säuren gebildet, weil eine Vertreibung des Oxy-

gen's aus dem Quecksilber Statt fand, und dieses Oxygen sich nicht entband; — aber da sich auch Kohlensäure bildet, so ist es möglich, daß zur Bildung derselben jenes Oxygen verwandt wurde. Indes auch Wasser wurde zersetzt, denn man findet in dem mercurialischen Salze Ammoniak, und Salzsäure sowohl als Schwefelsäure, entbinden aus diesem ammoniakalischen Quecksilbersalz Hydrocyansäure, was bei vorhandener Cyansäure nicht geschehen würde; es bleibt daher ungewiß, ob sich hier zwey Säuren gebildet haben.

*Wirkung der Hydrocyansäure auf das Kupferoxydhydrat.*

Wir untersuchen hier den Unterschied zwischen einfachem und dem dreifachen blausauren Kupfersalze.

Hydrocyansäure, mit Kupferoxydhydrat in Berührung gebracht, verlor augenblicklich ihren Geruch; die Verbindung erhielt eine gelbe, etwas ins Grüne fallende Farbe und krystallisirte in Gestalt kleiner Körner.

Wird diese Verbindung, ehe sie noch in krystallinischen Zustand übergeht, mit kochendem Wasser ausgewaschen, so wird sie weiß. Ammoniak löst diesen Stoff auf, ohne sich zu färben, wenn nur die Mischung vor dem Zutritt der Luft bewahrt wird; eine Thatsache, die auch *Scheele* bemerkte. Die Salpetersäure löst dieses blausaure Kupfer mit Aufbrausen, und man glaubt den Geruch von Hydrocyansäure mit salpetrigem Gase vermischt wieder dabei wahrzunehmen. Das weiße blausaure Kupfer hängt sich allen Körpern an, als wenn es feucht wäre, sey es auch noch so trocken. Mit kaustischem Kali verbunden wird es gelb, sodann braun und endlich schiefergrau.

In einer Röhre erhitzt, gab es anfangs eine Säure, welche hineingetauchtes Lakmuspapier röthete, aber in der Folge entwickelte sich Ammoniak, welches die Farbe des Lakmus wieder herstellte; der Rückstand hatte eine braune Farbe, seine Auflösung in Hydrochlorinsäure war gelb und wurde mit derselben Farbe durch kaustisches Kali niedergeschlagen.

Da das Kupfer keine sehr große Verwandtschaft zum Oxygen hat, so möchte es natürlich scheinen, anzunehmen, daß, wenn sein Oxyd mit Hydrociansäure in Berührung kommt, Zersetzung und daraus folgende Bildung von Cyankupfer entstehe; dessen Farbe aber ist nicht roth wie jene des blausauren Kupfers, das mittelst des gewöhnlichen blausauren Kali und des schwefelsauren Kupfers erhalten wird. Freilich wohl enthält dies letztere Berlinerblau, welches Einfluss auf die Farbe des einfachen Cyankupfers haben kann, dessen eigentliche Farbe gelb zu seyn scheint.

Ein anderer Versuch scheint gegen diese Ansicht zu streiten, nämlich dieser: das gewöhnliche blausaure Kupfer, so stark getrocknet, als ohne Zersetzung desselben möglich, und in einem verschlossenen Apparat erhitzt, gab hydrociansaures Ammoniak und Wasserdämpfe. Dies beweist, daß es hydrociansaures Kupfer ist, oder daß diese Verbindung, des sorgfältigsten Trocknens ungeachtet, noch Feuchtigkeit enthalte. Zu beachten ist indessen, daß, da dieses blausaure Kupfer auch Eisen enthält, die während der Destillation sich entwickelnde Hydrociansäure von diesem letztern, das wir als ein hydrociansaures Salz betrachten, herrühren kann.

*Ueber das blausaure Kupfer.*

Das blausaure Kupfer hat bekanntlich eine purpurrothe Farbe und, so lange es feucht ist, ein bedeutendes Volum, aber in flüssiges Ammoniak gebracht, nimmt es bald eine grüne Farbe an, verliert sein Volum und wird wie krystallinisch.

Ammoniak, das über diesen Stoff gestanden hat, wird kaum grün gefärbt, und enthält nur eine Spur von Kupfer, die man übrigens durch geschwefelton Wasserstoff bemerkbar machen kann. Wird dieses Ammoniak mit Wasser verdünnt und einige Zeit in einem verschlossenen Gefäß aufbewahrt, so setzt sich ein sehr schön orangefarbner Stoff zu Boden.

Gießt man auf den vom Ammoniak abgesonderten grünen Stoff Wasser, so erlangt er augenblicklich seine rothe Farbe und sein ursprüngliches Volum wieder, und diese Erscheinungen erneuern sich, so oft man es wünscht.

Aus diesen Versuchen scheint sich zu ergeben, daß 1) das gewöhnliche blausaure Kupfer unverkennbar ein Hydrat ist; 2) dieses Hydrat zersetzt wird durch Ammoniak, welches ihm seinen Wassergehalt entzieht, und dadurch Volumverminderung bewirkt; 3) die rothe Farbe dieser Substanz von der Anwesenheit des Wassers herrührt, die grün-gelbliche aber, welche ihr das Ammoniak ertheilt, die eigenthümliche Farbe derselben ist.

Es ist bemerkenswerth, daß das Ammoniak bloß auf die Feuchtigkeit und durchaus auf keinen der übrigen Bestandtheile dieser Verbindung einwirkt. Das einfache blausaure Kupfer hingegen wird vom Ammoniak sehr gut aufgelöst.



*Wirkung des Cyanogen's auf das oxydirte Eisen.*

Wir untersuchen hier, ob das Berlinerblau Cyaneisen oder hydrocyansaures Eisen sey.

Nach den bereits vorausgeschickten Erläuterungen wird es uns nicht schwer werden, die Verhaltungsweise des Cyanogen's zum oxydirten und selbst zum metallischen Eisen aufzufassen; die Erscheinungen sind folgende:

Grünes Eisenoxydhydrat, mit Cyanogenauflösung behandelt, nimmt sogleich eine braune Farbe an, die nach und nach an Lebhaftigkeit zunimmt; indess tritt ein Punkt ein, wo es dunkelgrün wird.

Wenn man, nachdem das Cyanogen seinen Geruch verloren hat, was bald erfolgt, die über dem Eisenoxyd stehende Flüssigkeit abgießt, so bemerkt man in derselben einen schwachen Geruch von Hydrocyansäure, und man erhält durch die Destillation hydrocyansaures und auch etwas kohlensaures Ammoniak. — Wird nun das zurückgebliebene Eisenoxyd mit Schwefelsäure übergossen, so löst sich der größte Theil auf; was zurückbleibt, ist Berlinerblau von grünlichter Farbe. Wird endlich Schwefelsäure in die Mischung gebracht, ehe sich noch die Flüssigkeit abgesondert hat, so erhält man eine größere Menge Berlinerblau, weil das hydrocyansaure Ammoniak sich zersetzt, dessen Säure an das Eisen übergeht.

Es scheint mir klar, daß bei diesem Versuch das Cyanogen dieselben Veränderungen erleidet, wie mit bloßem Wasser, nur mit größerer Raschheit; es bildet sich eben so Ammoniak, Kohlensäure und Hydrocyansäure, welche anstatt sich ausschließend mit

zersetze das Wasser, indem es seinen Sauerstoff anziehe, und das Cyanogen bemächte sich dann des freigewordenen Wasserstoffs, um damit Hydrocyansäure zu bilden, woraus dann wieder hydrocyansaures Eisen und hydrocyansaures Ammoniak entsteht.

Wird aber auch die Zersetzung des Wassers durch Eisen zugegeben, so muß doch zu gleicher Zeit auch eine Zersetzung desselben durch das Cyanogen angenommen werden, weil man in der Flüssigkeit wieder Kohlensäure und eine eigenthümliche Säure findet, welche nur durch das Oxygen des Wassers gebildet werden konnten. Gewiß ist es, daß metallisches Eisen sowohl als Eisenoxyd die Zersetzung des Cyanogen's vorzüglich beschleunige, indem es wahrscheinlich auf das Cyanogen wie ein schwaches Kali wirkt, in dem Maafse, als es sich oxydirt.

#### *Wirkung der Hydrocyansäure auf das Eisen.*

Mit Wasser verdünnte Hydrocyansäure in einer, durch Quecksilber gesperrten Glocke, mit Eisen in Berührung gesetzt, gab sogleich Berlinerblau, und zu gleicher Zeit entband sich Wasserstoffgas. Der größte Theil des Berlinerblau's, das sich hiebei gebildet hatte, blieb in der Flüssigkeit aufgelöst und kam nur bei dem Zutritt der Luft zum Vorschein; woraus erhellt, daß blausaures Eisenoxydul (bleu de Prusse au minimum) in Hydrocyansäure auflöslich ist.

Trockne Hydrocyansäure erlitt durch Eisenfeile keine Veränderung, weder in Farbe noch Geruch; bloß das Eisen, welches sich am Boden des Gefäßes angehängt hatte, schien eine braune Farbe angenommen zu haben.

Die vom Eisen nach einigen Tagen abgesonderte Hydrocyansäure wurde in einem kleinen Gefäße unter eine Glocke gebracht, wo sie sogleich verdunstete, ohne einen Rückstand zu lassen; sie hatte also kein Eisen aufgelöst.

Im Wasser aufgelöste Hydrocyansäure in Verbindung gebracht mit Eisenhydrat, das durch Kali erhalten und mit kochendem Wasser ausgewaschen worden war, gab augenblicklich Berlinerblau, ohne Hinzuthun einer Säure, was auch *Scheele* schon anmerkte.

Wenn die Hydrocyansäure im Ueberschuß mit Eisenoxyd verbunden ist, so nimmt die Flüssigkeit, welche über dem Berlinerblau steht, nach einiger Zeit eine herrliche Purpurfarbe an, und wird sie abgeraucht, so läßt sie in dem Gefäße blaue Kreise und Kreise von dem purpurnen Stoff zurück, in denen man Krystalle von derselben Farbe erblickt. Wasser, das auf diese Stoffe gebracht wird, löst allein die Purpurfarbe auf, und wird davon sehr schön gefärbt; was sich nicht auflöst, ist Berlinerblau, das in der Hydrocyansäure aufgelöst enthalten war. Einige Tropfen Chlorin in diese purpurne Flüssigkeit gebracht, ändern sie in Blau um, und eine größere Menge zerstört die Farbe gänzlich. Bemerkenswerth ist hier, daß Kali aus dieser so entfärbten Flüssigkeit nichts niederschlägt.

Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß Hydrocyansäure mit dem Eisen nicht geradezu Berlinerblau bildet; daß sich dieses aber unter gleichen Umständen durch Zuthun des Wassers erzeugt. Eben so findet man auch, daß das Cyanogen, welches in der Verbindung mit Wasser Eisen auflöst, was durch den

tintenartigen Geschmack, den es erhält, durch das Verschwinden seines Geruchs und durch den Rückstand, den es nach seiner Verdampfung übrig läßt, dargethan ist, demohngeachtet kein Berlinerblau giebt.

Schon diese ersten Versuche sprechen dafür, daß Berlinerblau keine Cyanverbindung (cyanure), sondern ein Hydrocyansalz (hydrocyanate) ist.

### *Wirkung des Feuers auf das Berlinerblau.*

Um zur vollendeten Gewißheit über die Natur des Berlinerblau zu gelangen, schien es uns nothwendig, dies letztere selbst genau zu untersuchen, und wir schreiten daher sogleich zur Erklärung einer Erscheinung, die sich uns *beim Trocknen* desselben darbot.

Es entzündete sich dieser Stoff nach Art des Pyrophors, und brannte bis zu seiner gänzlichen Zerstörung fort, obgleich das Platinagefäß, das ihn enthielt, vom Feuer genommen wurde. Während der ganzen Dauer dieser Verbrennung entband sich hydrocyansaures Ammoniak, leicht bestimmbar durch seinen Geruch, und der Rückstand war rothes Eisenoxyd.

Das Ammoniak und die Hydrocyansäure, welche sich fortwährend bei der Verbrennung des Berlinerblau entwickeln, bieten noch einen neuen Grund für die oben ausgesprochene Ansicht dar, daß diese Substanz hydrocyansaures Eisen sey.

Durch Schwefelsäure gereinigtes und möglichst getrocknetes blausaures Eisen wurde in einer Retorte der Destillation unterworfen. Bald nach begonnener Arbeit gewahrte man Wassertropfen in dem Halse der Retorte, und nach verstärkter Hitze erschien ein

weißer Dampf, der sich zu nadelförmigen Krystallen verdichtete.

Das Gas, welches sich hierbei entwickelte, wurde zu verschiedenen Zeitabschnitten, in vier Glocken von gleicher Größe aufgefangen. Das erste Product mit Kalialösung vermischt, verminderte sich um ohngefähr den dritten Theil seines Volums. Die zwei andern Drittheile, die nicht vom Kali aufgenommen wurden, verbrannten mit blauer Farbe und das Product aus ihrer Verbrennung fällte Kalkwasser.

Das angewandte Kali brauste mit Säuren nicht merklich auf, bewirkte aber doch eine schwache Trübung des Kalkwassers und gab mit schwefelsäurem Eisen sehr schönes Berlinerblau; woraus folgt, daß das eingesogene Gas größtentheils Hydrocyansäure war.

Das zweite gasförmige Product mit Wasser geschüttelt verlor die Hälfte seines Volums; und das Wasser nahm unverkennbaren Geruch und Geschmack nach Hydrocyansäure an. Es färbte das durch Säure geröthete Lakmuspapier blau und gab mit schwefelsäurem Eisen Berlinerblau; es war also hydrocyansäures Ammoniak, in Wasser aufgelöst.

Das Gas, welches vom Wasser nicht aufgenommen wurde, brannte ebenfalls mit blauer Flamme und das Product aus seiner Verbrennung trübte das Kalkwasser stark.

Die Wände der dritten Glocke waren mit einem gelben Stoff bedeckt, der das Ansehen eines Oels hatte und in Kali auflöslich war. Wasser nahm von diesem Gas nur den vierten Theil auf, färbte sich gelb, wurde alkalisch, bekam unverkennbar den Geschmack der Hydrocyansäure und gab mit schwefel-

saurem Eisen viel Berlinerblau. Das unauflösliche Gas war von derselben Natur wie die vorhergehenden.

Das Salz, welches sich während der Destillation des Berlinerblau in den Hals der Retorte sublimirte, wurde in Wasser aufgelöst; es hatte einen starken Ammoniakgeruch. Die Auflösung war sehr alkalisch; sie brauste mit Säuren und gab mit schwefelsaurem Eisen kein Ammoniak. Es war also reines kohlensaures Ammoniak. Nach diesem Versuch scheint es, daß hydrocyansaures Ammoniak flüchtiger sey, als kohlensaures.

Der Rückstand von der Destillation wurde vom Magnet schwach gezogen, löste sich ohne Aufbrausen in Salzsäure auf und die Auflösung gab mit Kali einen grünlich-braunen Niederschlag. Unaufgelöst blieb ein kleiner Antheil Berlinerblau, welcher der Zersetzung entgangen war.

Die, bei Zersetzung des Berlinerblau, durch Hitze erhaltenen Resultate zeigen deutlich, daß es Oxygen und Hydrogen enthält; aber sind diese beiden Körper wesentliche Bestandtheile des Berlinerblau, oder rühren sie von dem darin enthaltenen Wasser her? Diefs ist noch zu untersuchen, um über die Natur des Berlinerblau zu entscheiden.

Ohne hier von der Möglichkeit zu sprechen, das Berlinerblau vollkommen zu trocknen, ohne dadurch einen Anfang von Zersetzung desselben zu bewirken, können wir doch mit einigem Recht annehmen, daß das wenige noch darin enthaltene Wasser nicht wohl der Wirkung des Feuers widerstehen werde bis zum Ende der Zersetzung des Berlinerblau, und gerade

in enthalten die Produkte das meiste Oxygen und Hydrogen \*).

\*) Durch gegenseitige Zersetzung angemessener Mengen von schwefelsaurem Eisen und blausaurem Kali, im Wasser aufgelöst, erhielt ich ein schönes Blau, mit dem ich ein Fläschen, in welchem Eisenfeile enthalten war, füllte. Nach ohngefähr einem Monat veränderte sich die blaue Farbe in eine grünliche und dieser folgte späterhin eine schmutzig-weiße. Als die Farbe sich nicht weiter veränderte, goß ich einen Theil in ein Glas, wo sie sogleich grünlich, und durch Zuthun von Wasser und Umrühren an der Luft schön blau wurde.

Wäre das Berlinerblau ein Cyanoisen, so könnte man die Veränderung, welche es durch Eisenfeile erleidet, bloß als eine basische Cyanverbindung betrachten, und man würde nicht begreifen, wie dieser Stoff durch die Berührung der Luft seine blaue Farbe wieder erlangen könne. Leicht begreiflich wird es aber, wenn man annimmt, das Eisen entziehe dem hydrocyansauren Salz einen Theil Oxygen und bringe es dadurch in den Zustand des proto-hydrocyansauren Eisens.

Es läßt sich auch eben so wenig annehmen, daß jener weiße Stoff ein basisch-hydrocyansaures Salz (sous-hydrocyanate) sey, weil sich in diesem Fall Hydrogen hätte entbinden müssen, allein es zeigte sich auch keine Spar davon. Man könnte zwar auch glauben, daß das Eisen durch Theilung des Oxygens mit dem im Berlinerblau enthaltenen Eisenoxyd eine Verbindung gebildet habe, die ein basisches proto-hydrocyansaures Salz (sous proto-hydrocyanate) seyn würde; allein auch dieses würde durch die Berührung der Luft, anstatt blau zu bleiben, eine grüne Farbe angenommen haben.

*Vauquelin.*

Anmerk. d. Uebersetz. Gay-Lussac betrachtet das-

Wir werden dadurch bestimmt das Berlinerblau als ein hydrocyansaures Salz anzusehen, und das während seiner Zersetzung entwickelte Oxygen und Hydrogen als herrührend von der Hydrocyansäure und dem Eisen zu betrachten,

Erwägen wir ferner die starke Verwandtschaft des Eisens zum Oxygen, so werden wir wohl schwerlich glauben, daß in dem Augenblicke der Erzeugung des Berlinerblau durch Berührung der Hydrocyansäure und des Eisenoxydhydrats das Oxygen des letztern an das Hydrogen der Säure abgetreten werde, da diese das Hydrogen selbst sehr fest hält. Ziehen wir endlich noch die Zersetzung des Wassers durch das Eisen in Betrachtung und durch das Cyanogen

---

Berlinerblau (s. B. XVI. 71, d. J.) als Cyaneisenhydrat, und da bekanntlich durch Eisenfeile das Wasser auch bei gewöhnlicher Temperatur zerlegt wird, so konnte sich bei Vauquelin's Versuch das freiwerdende Hydrogen mit dem Cyanogen vereinen und erst Hydrocyaneisenoxydul gebildet werden, welches bei Berührung der Luft eine grüne und dann blaue Farbe annahm (wie das oben wirklich angeführt ist), indem auf ähnliche Art, wie bei der hydrogenirten Kohle, das Oxygen der Luft sich mit dem Hydrogen vereinte, wodurch das Hydrocyaneisenoxydul wieder in ein Cyaneisenhydrat übergehen konnte. Im Original stehen zum Schlusse des vorletzten Abschnittes dieser Note Vauquelin's noch folgende Worte: *il paraît que l'oxyde qui s'est formé dans cette opération ne s'est point détaché du fer lui-même, sans quoi le bleu de Prusse aurait pris, par son exposition à l'air, une teinte plus ou moins verte; ce qui n'a pas eu lieu.* Der Uebersetzer gesteht, daß ihm diese Stelle nicht ganz verständlich scheint,



selbst, wie wir dieß gezeigt haben, so werden wir noch um so weniger geneigt seyn, das Berlinerblau als ein Cyaneisen anzusehen.

*Wirkung des geschwefelten Wasserstoffgases auf das Cyanogen.*

Dieser Versuch sucht zu erforschen, ob zwischen dem geschwefelten Wasserstoff und dem Cyanogen eine einfache Verbindung oder eine gegenseitige Zersetzung Statt finde.

Um das gegenseitige Einwirken der Schwefelwasserstoff-Säure und des Cyanogen's genau beobachten zu können, vermischte ich beide in gleichem Volum über Quecksilber. Ich konnte, auch selbst nach mehreren Tagen, durchaus keine Erscheinung wahrnehmen, welche auf eine Verbindung oder Zersetzung deutete; da das Volum immer dasselbe blieb.

Nachdem ich aber die Mischung mit einer, zur Auflösung des Cyanogen's unzureichenden, Menge Wassers in Berührung brachte, erfolgte sogleich eine schnelle Einsaugung; die Flüssigkeit nahm eine strohgelbe Farbe an, die nach und nach in's Braune überging, und das Gas war beinahe alles verschwunden; bloß ein äußerst kleiner Maafstheil Stickgas, das vom zersetzten Cyanogen herrührte, blieb zurück.

Die Flüssigkeit, welche beide Gasarten aufgelöst enthielt, hatte gar keinen Geruch; ihr Geschmack war zuerst stechend, dann ungemein bitter; sie war nicht merkbar sauer; und, ein sehr merkwürdiger Umstand, mit einer Auflösung von schwefelsaurem Eisen vermischt zeigte sich keine Wirkung. Kali der Mischung zuge-

setzt bewirkt einen grünlich-gelben Niederschlag, der, durch Schwefelsäure wieder aufgelöst, etwas Berlinerblau zurückliefs.

Dieselbe Flüssigkeit, in eine Auflösung des essigsauren Bleis gebracht, bewirkte keine Veränderung; aber kaustisches Kali, dieser Mischung im Ueberschusse zugesetzt, gab einen gelben Niederschlag, der sich bald in's Schwarze umänderte. Dieser Niederschlag war Schwefelblei, und die überstehende Flüssigkeit gab mit schwefelsaurem Eisen Berlinerblau. Eine gleiche Wirkung fand auch ohne Kali Statt, nur viel langsamer.

Diese Flüssigkeit, welche weder essigsaures noch salpetersaures Blei niederschlug, fällte augenblicklich salpetersaures Silber in braunen Flocken, und zu gleicher Zeit kam auch der Geruch des Cyanogen's wieder sehr stark zum Vorschein. Dasselbe geschah bei salzsaurem Golde, hlos mit der Ausnahme, daß das Cyanogen nicht wieder merkbar wurde.

Wenn die Verbindung, von der hier die Rede ist, in einem luftleeren Glas aufbewahrt wird, so färbt sie sich mit der Zeit immer stärker und setzt einen braunen Stoff ab, der mir jenem Produkt aus der Auflösung des Cyanogen's in bloßem Wasser ähnlich zu seyn schien. Sie hat dann merkbar den Geruch der *Hydrocyansäure* und fällt das essigsaure Blei schneller, als wenn sie frisch bereitet worden ist.

Wie läßt sich nun diese Flüssigkeit betrachten? Etwa als eine bloße Vereinigung von Cyanogen und Schwefelwasserstoffsäure? Die oben angeführten Versuche sprechen nicht sehr für diese Meinung.

Ist sie als eine *Hydrocyansäure* zu betrachten,

welche Schwefel, der aus der gegenseitigen Zersetzung der beiden Gasarten hervorging, aufgelöst enthält?

Dies scheint wahrscheinlicher; denn angenommen, die Flüssigkeit sey nur eine Vereinigung der beiden Gasarten, so dürfte doch wohl der geschwefelte Wasserstoff seine Eigenschaft, auf die Bleisalze zu wirken, nicht verlieren. Allein nach der Hypothese, daß der geschwefelte Wasserstoff zersetzt und Hydrocyansäure gebildet worden sey, welche Schwefel aufgelöst enthielt: warum zeigte sich nicht der Geruch derselben, und wie erklärt sich noch überdies die Wiederenstehung des geschwefelten Wasserstoffs und des Cyanogens durch die Bleiauflösung, welcher Kali zugesetzt wurde?

Wollte man sich jedoch mit einer etwas minder gründlichen Erklärung begnügen, so könnte man sie in der Verwandtschaft des Cyanogen's zum Kali und in jener des Hydrogen's zum Oxygen des Bleies finden, woraus Cyankali und Schwefelblei hervorgehen würden.

In der Erwartung, dieser Erklärung einige Wahrscheinlichkeit geben zu können, brachte ich fein zerkleinerten Schwefel in Hydrocyansäure, aber es zeigte sich keine Wirkung zwischen diesen beiden Stoffen, die Säure änderte weder Farbe noch Geruch. Es ist wahr, daß der Schwefel, wenn auch so fein zerkleinert als es durch mechanische Hülfe geschehen kann, jedoch nie in dem Grade ist, als wie aus geschwefeltem Wasserstoff niedergeschlagen. Deshalb kann auch dieser bloß negative Versuch, die Hypothese, welche wir aufstellten, noch nicht umstossen.

Die unmittelbare Zersetzung des salpetersauren Silbers durch diese eigenthümliche Flüssigkeit möchte

nicht schwer zu begreifen seyn; es wird hinreichen, wenn wir im Silber eine stärkere Verwandtschaft zum Schwefel und eine geringere zum Oxygen annehmen, als im Blei, was auch mit sonst bekannten Erscheinungen nicht im Widerspruch steht.

Sonach würde dann die Hydrocyansäure zersetzt, ihr Hydrogen verbände sich mit dem Oxygen des Silbers und dieses mit dem Schwefel, das Cyanogen aber würde frei, was wirklich der Fall ist. Uebrigens glaube ich, daß die Erscheinungen, welche die uns hier beschäftigende Flüssigkeit darbietet, auch eben so gut erklärt werden können, wenn wir zwischen Cyanogen und geschwefeltem Wasserstoff eine einfache Verbindung annehmen, welche indessen doch dies Merkwürdige hat, daß die Stoffe, aus denen sie besteht, gänzlich ihre saure Eigenschaft verlieren, was bei andern sauern Stoffen noch nicht bemerkt wurde.

#### *Wirkung des Quecksilberoxyds auf das dreifache blausaure Kalisalz.*

Es wird sich hierbei zeigen, daß sich ein vierfaches Salz bildet.

Das Kali scheint keine Veränderung im Zustande des Cyanquecksilbers hervorzubringen; das rothe Quecksilberoxyd hingegen zersetzt das blausaure Kali sehr schnell. Es beweist dieses die stattfindende Auflösung des Quecksilberoxyds, der rostartige Bodensatz, die alkalische Beschaffenheit, welche die Flüssigkeit annimmt und das basische kohlensaure Kali, welches man durch gelindes Abrauchen erhält.

Diese Wirkung des Quecksilberoxyds auf das blausaure Kali ist sehr eigenthümlich, anfänglich fin-

det keine vollkommene Zersetzung Statt, gleichviel ob mehr oder weniger Oxyd dazu verwandt wurde; selbst das Eisen, welches in dieser Salzverbindung enthalten, wird durch das Quecksilber nicht gänzlich abgeschieden, es bleibt, wie durch Säuren zu zeigen, noch welches zurück; endlich aber bildet sich ein vierfaches Salz von besondern Eigenthümlichkeiten. Das Eisen, welches mit röthlich-gelber Farbe niederfällt, ist nicht reines Eisenoxyd, denn nach vollkommenem Auswaschen gab es, mit Hydrochlorinsäure behandelt, Berlinerblau; auch scheidet es sich nicht auf einmal aus, sondern während des Abrauchens und der Krystallisirung des neuen Salzes, werden wiederholt Mengen desselben gefällt.

Es ist daher entschieden, daß das Dutoxyd des Quecksilbers durch seine Wirkung auf das blausaure Eisenkali, bloß einen Theil Kali und basisch hydrocyansaures Eisen daraus absondert, an deren Stelle es dann tritt, um deren Functionen bei dem Kali zu übernehmen.

Bekanntlich trägt das Eisenoxyd, seine Wirkung mit der der Hydrocyansäure vereinigend, zur Neutralisirung des Kali im blausauren Kali bei, denn die Hydrocyansäure allein kann in keiner Verhältnismenge vollkommene Neutralisirung der Kalien bewirken.

Auch eine weit innigere und dauerhaftere Verbindung der Hydrocyansäure mit den Kalien wird durch die Gegenwart des Quecksilbers bewirkt, weil das daraus entstehende dreifache Salz weder saure noch alkalische Eigenschaften zeigt, während in der Verbindung bloß von Hydrocyansäure und Kali, die beiden Stoffe, der eine durch seinen Geruch, der andere durch seinen Geschmack, bemerkbar sind.

*Wirkung des Schwefels auf das Cyanquecksilber.*

Wir suchen hier die gegenseitige Verwandtschaft des Schwefels und des Cyanogen's zum Quecksilber kennen zu lernen.

Zwei Grammen Schwefel und eben so viel Cyanquecksilber, genau gemischt und der Hitze ausgesetzt, gaben 280 kubische Centimeter Gas, von folgender Eigenschaft.

Es schwärzte die Auflösung des essigsauren Bleis, und gab durch Verbrennung schwefelige Säure; es enthielt also geschwefelten Wasserstoff.

110 kubische Centimeter von diesem Gas mit einer essigsauren Bleiauflösung in Verbindung gebracht, verminderten sich bis auf 60; da sich aber das Cyanogen in 0,22 seines Volums Wasser auflöst und das Volum der essigsauren Bleiauflösung 10 Centim. betrug; so mußten 42 Cent. Cyanogen verschluckt worden seyn. Diese 42 also zu jenen übriggebliebenen 60 gerechnet, bilden ein Ganzes von 102; es wurden also durch die Bleiauflösung 8 Centim. des fremdartigen Gas aufgelöst.

Enthalten nun 110 Cent. Cyanogen 8 Cent. fremdes Gas, so müssen die aus 2 Grammen Cyanquecksilber erhaltenen 280 Cent. 24 desselben Gas enthalten; wodurch die Totalsumme für das Cyanogen auf 260 gebracht wird. \*)

---

\*) Diese Berechnung stimmt weder mit sich selbst, noch mit den frühern Angaben, in Beziehung auf das Auflösungsverhältniß des Cyanogen's, vollkommen überein, und ist daher wahrscheinlich nur annähernd anzunehmen; wenn nämlich 0,22 Volumtheile Wasser 1 Volumtheil Cyanogen auflösen,

In die Glocken, welche das Gas enthalten hatten, wurde Wasser gebracht, und es zeigten sich hierauf einige Tropfen gelber Flüssigkeit, welche wie Oel aussah und auf dem Wasser schwamm; auch bemerkte man, daß die Wände der Glocken nicht feucht geworden waren.

Bei einem andern Versuch, wo auf 2 Grammen Cyanquecksilber nur 2 Decigrammen Schwefel genommen wurden, erhielt man nur 245 Cent. von obigem Gas; dies beweist, daß das Cyanogen im obigen Versuch ausser dem geschwefelten Wasserstoff noch irgend ein anderes Gas enthielt.

Dieses letztere Gas färbte die Auflösung des essigsauren Bleies nicht schwarz, enthielt also auch keinen geschwefelten Wasserstoff; eben so wenig wurde auch schwefelige Säure darin wahrgenommen, jedoch erlangte es nach dem Verbrennen den Geruch dieser Säure. Das Cyanogen kann demnach einen kleinen Antheil Schwefels gasförmig aufnehmen.

Wir wollen noch bemerken, daß, sobald die Mischung aus Schwefel und Cyanquecksilber warm zu werden begann, sich mit einem Mal, wie durch eine Explosion, eine große Menge Gas entband, welche

---

20 werden 10 Kubik-Centimeter Wasser nicht 42, sondern 45 Centimeter Cyanogen auflösen, was auch mit der Angabe *Fauquelin's* (S. 51.) und mit der *Gay-Lussac's* (B. XVI. S. 57.) vollkommen übereinstimmt. Nimmt man aber, da diese letzte Angabe nur als annähernd bezeichnet ist a. a. O., auch an, daß 1 Volumth. Wasser sich mit 4,2 Volumth. Cyanogen verbinde, so ist doch wenigstens nachher 20 zu lesen statt 24, was wohl ein bloßer Druckfehler ist.

*Anmerk. d. Uebers.*

## 86. Vanquelin über Cyanogen

Antheil Kali, das durch die Wirkung des Feuers verflüchtigt wurde, begleitet wird \*).

### *Beobachtungen bei der Zersetzung des Cyanquecksilbers durch Hydrocyansäure.*

Wir suchten hier ein Verfahren, um Hydrocyansäure zum medicinischen Gebrauch auf eine einfachere Weise zu erhalten.

Bei der Wiederholung der Versuche des Hrn. Gay-Lussac über die Hydrocyansäure hatte ich Gelegenheit einige Bemerkungen zu machen, welche hier anzuführen zweckmäßig scheint.

Die erste bezieht sich auf die Wirkung der Hydrochlorinsäure auf das Cyanquecksilber.

10 Grammen von diesem Salz wurden mit 20 Gr. Hydrochlorinsäure in einem Apparat zersetzt, der geeignet war, die sich entwickelnde Hydrocyansäure zu verdichten und aufzufangen; bei einer Temperatur unter dem Siedpunkte der Mischung gewährte man noch keine Spur von Hydrocyansäure; sie wurde hierauf eine Zeit lang in gelindem Kochen erhalten, aber ohnerachtet dieser Temperaturerhöhung erschien nicht das mindeste in der durch eine Mischung aus Eis und

---

\*) Es würde dieses nach *Wöhler* (B. VII. S. 129 fg.) so zu betrachten seyn, daß nämlich jeber Antheil Kali, bei dem Glühen durch thierische Kohle desoxydirt, sich verflüchtigt, und sogleich wieder Sauerstoff aus der Feuchtigkeit der Luft ergreift, deren Wasserstoff dann an das Cyanogen übergeht,



Salz kalt erhaltenen Vorlage. Ich schloß, nach der Angabe des Hrn. *Gay-Lussac*, daß diese Säure sich in jenem Theil des Apparats verdichtet haben könnte, wo der Marmor \*) befindlich war, erhitzte ihn daher, aber ohne Erfolg. Nach einer Arbeit von einigen Stunden fand ich nichts als einige Tropfen einer weissen Flüssigkeit von sehr starkem Geruch, die ich kaum sammeln konnte.

Wenn bei dieser Arbeit alle Hydrocyansäure, gemäß dem Mischungsverhältnisse des Cyanquecksilbers, entbunden worden wäre, so hätten wir wenigstens 2,5 Gramm derselben erhalten müssen.

Der Rückstand in der Retorte würde Chlorinquecksilber oder ätzender Sublimat gewesen seyn, wenn der Erfolg den Angaben entsprochen hätte; allein die nach dem Erkalten der Flüssigkeit Statt gefundene Krystallisirung des Salzes schien von der des ätzenden Sublimats verschieden. Er wurde auf folgende Weise geprüft:

1) Dieses Salz löste sich in Wasser weit schneller auf als Quecksilbersublimat, und brachte eine sehr merkbare Kälte hervor.

2) Die Auflösung gab mit Kali einen weissen Niederschlag, statt daß dieser gelb geworden seyn würde, wenn das Salz reines Chlorinquecksilber gewesen wäre.

---

\*) Es ist hier die von *Gay-Lussac* B. 16. S. 7 u. 8 angegebene Vorrichtung zu berücksichtigen. Man vergl. auch die erste Abhandlung *Gay-Lussac's* über Darstellung der Blausäure B. 11. S. 204 — 208.

3) Eine bestimmte Menge dieses Salzes, mit einer Auflösung von kaustischem Kali gerieben, wurde sogleich weiß und stiefs einen sehr starken Ammoniakgeruch aus.

Diese Eigenthümlichkeiten beweisen, daß dieses Salz kein ätzender Sublimat ist, sondern eine Verbindung aus hydrochlorinsaurem Ammoniak und hydrochlorinsaurem Quecksilber, die man ehemals *Alembrothsalz* hiefs. Sie beweisen zu gleicher Zeit, daß bei der erwähnten Arbeit das Cyanogen zum Theil zersetzt wurde, und daß sein Stickstoff sich mit dem Wasserstoff der Hydrochlorinsäure oder mit dem des Wassers verband, um Ammoniak und, als nothwendige Folge, hydrochlorinsaures Quecksilberammoniak darzustellen. Nach der ersten Ansicht hätte sich Kohle absetzen, und nach der zweiten Kohlensäure bilden müssen; allein es fand weder das Eine noch das Andere Statt, jedoch nahm die Flüssigkeit eine etwas braune Farbe an.

Von dieser Erscheinung sagt Hr. *Gay-Lussac* nichts, weil er sie wahrscheinlich bei Anwendung von weniger Säure nicht gewahr wurde; indess bei einem andern Versuch, wozu ich nur 30 (?) Grammen Hydrochlorinsäure verwandte, erhielt ich nicht mehr als ohngefähr 2 Grammen Hydrocyansäure, welche alle, vom Hrn. *Gay-Lussac* bezeichnete, Eigenthümlichkeit besafs. Der Rückstand von dieser Arbeit enthielt noch hydrochlorinsaures Quecksilberammoniak, obgleich der Proceß mit möglichster Sorgfalt geleitet worden war.

Sonderbar ist es, daß, nachdem einige Zeit nachher dieser Versuch noch zweimal wiederholt wurde, gar kein dreifaches Salz von Ammoniak und Quecksilber erhalten werden konnte; ich weiß zwar nicht, was

an dieser Verschiedenheit Schuld war, doch wäre es vielleicht möglich, daß bei den ersten Arbeiten die Hydrocyansäure eine Zersetzung erlitten hätte, weil der Apparat schon Tags zuvor in Bereitschaft gesetzt wurde, wodurch das Cyanquecksilber mit der Hydrochlorinsäure lange in Berührung stehen mußte, bis die Wärme darauf einwirken konnte.

Diese so eben dargelegten Beobachtungen, welche sich auf die zuweilen stattfindenden Vorgänge zwischen der Hydrochlorinsäure und dem Cyanquecksilber beziehen, würden an und für sich wenig Interesse gewähren, wenn sich nicht daran eine bessere Verfahrensart angeschlossen, diese Säure zu erhalten.

Indem ich darüber nachdachte, daß das Quecksilber den Schwefel so heftig anzieht, und daß das Cyanogen sich so leicht mit dem Hydrogen verbindet, wenn ihm dieses in einem passenden Zustand dargeboten wird, kam ich auf den Gedanken, daß die Zersetzung des Cyanquecksilbers durch geschwefelten Wasserstoff, auf trockenem Wege gelingen könnte, und suchte dies auf folgende Weise zu bewirken: in eine gelind erwärmte Röhre, welche mit einer Vorlage verbunden war, die durch eine Mischung aus Eis und Salz kalt erhalten wurde, brachte ich Cyanquecksilber und leitete geschwefeltes Wasserstoffgas über dasselbe, welches aus einer Mischung von Schwefel-eisen und, mit Wasser verdünnter, Schwefelsäure ganz langsam entbunden wurde.

Sobald das geschwefelte Wasserstoffgas mit dem Quecksilbersalz in Berührung gerieth, wurde dieses schwarz, und diese Wirkung pflanzte sich bis zum andern Ende des Apparats fort. Während dieser Zeit ward keine Spur von geschwefeltem Wasserstoff an

der Oeffnung einer Röhre bemerkbar, welche an der Vorlage angebracht, dieser gleichsam zum Rauchfang diente. Sobald aber, als dieser Geruch merkbar zu werden anfing, wurde die Gasentbindung eingestellt und die Röhre erhitzt, um noch allenfalls darin zurückgebliebene Säure auszutreiben. Nachdem der Apparat auseinander genommen wurde, fand sich in der Vorlage eine weißse Flüssigkeit, welche alle bekannten Eigenthümlichkeiten der trocknen Blausäure besaß und ohngefähr den 5ten Theil des dazu verwandten Cyanquecksilbers ausmachte.

Diese Methode ist leichter, und giebt eine beträchtlichere Ausbente, als jene, wozu Hydrochlorinsäure angewandt wird. Ich wiederholte sie mehreremal und sie glückte mir immer; nur muß man dafür besorgt seyn, die Arbeit einige Augenblicke vorher abzubrechen, ehe der Geruch des geschwefelten Wasserstoffes bemerkt wird, weil sonst die Hydrocyansäure verunreinigt würde. Dieser Uebelstand läßt sich indess leicht vermeiden, wenn man am Ende der Röhre etwas kohlensaures Blei anbringt.

Da man übrigens die trockne Hydrocyansäure nur zu einigen chemischen Untersuchungen nöthig hat, und sie zum medicinischen Gebrauch, wo dieser zu machen ist, nur mit Wasser verdünnt angewandt werden kann, so will ich die Pharmaceuten an das Verfahren des Hrn. *Proust* erinnern, das sonst leicht in Vergessenheit gerathen könnte. Es bestehet dieses darin, daß man in eine kalt bereitete gesättigte Auflösung des blausauren Quecksilbers einen Strom von geschwefeltem Wasserstoff, bis zum Ueberschuß, treten läßt, dann die Mischung in einem Glas verschließt, von Zeit zu Zeit schüttelt, und endlich filtrirt. Enthält

diese Hydrocyansäure, wie es fast immer der Fall ist, einige Spuren vom geschwefelten Wasserstoff, was man durch den Geruch wahrnimmt, so wird sie noch mit etwas gepulvertem kohlensaurem Blei versetzt, geschüttelt und wieder filtrirt.

Durch dieses Verfahren erhält man die Hydrocyansäure in weit concentrirterem Zustand; als zum medicinischen Gebrauch nöthig ist, und diese hat dann vor jener trocknen noch den Vorzug, daß sie sich lange Zeit unverändert aufbewahren läßt, wenn man sie nur immer sorgfältig vor dem Zutritt der Luft und der Wärme bewahrt.

### R e s u l t a t e .

Aus den angeführten Arbeiten ergibt sich nun:

- 1) Daß das in Wasser aufgelöste Cyanogen sich in Kohlensäure, in Hydrocyansäure, in Ammoniak und eine besondere Säure, die man Cyansäure nennen könnte, und in einen kohligen Stoff verwandelt; und dieses vermöge der Bestandtheile des Wassers, welches es zersetzt. Die neuen Zusammensetzungen ordnen sich unter einander auf folgende Weise: Das Ammoniak sättigt die Säuren, woraus die auflöslichen ammoniakalischen Salze entstehen, und der unauflösliche kohlige Stoff fällt zu Boden.
- 2) Daß die Veränderung, welche die eigentlichen Kalien in der Zusammensetzung des Cyanogen's bewirken, ihrer Natur nach ganz dieselbe ist, wie die vorhergehende; daß sich nämlich auch Hydrocyansäure, Kohlensäure, sehr wahrscheinlich auch Cyansäure, kohliger Stoff und Ammoniak

bildet, welches letztere dann vermöge des Vorhandenseyns der andern Kalien, frei wird, worauf sich auch die Bemerkung des Hrn. *Gay-Lussac* gründet, dafs die Auflösung des Cyanogen's in einem Kali, mit saurer Eisenauflösung sogleich Berlinerblau giebt.

- 3) Dafs die gewöhnlichen Metalloxyde auf das aufgelöste Cyanogen die nämliche Wirkung äufsern, wie die Kalien, aber mit verschiedener Schnelligkeit, nach Maaßgabe der Verwandtschaft, welche jedes derselben zu den sich entwickelnden Säuren besitzt; dafs sich aber hier drei Salze, oder dreifache Salze bilden, so wie wir in dem Abschnitt vom Eisen- und vom Kupferoxyd gezeigt haben; dafs folglich das Cyanogen — in dieser Hinsicht dem Chlorin ähnlich — nicht fähig ist, sich geradezu mit den Metalloxyden zu verbinden, und dafs sich eine Wasserstoffsäure und Sauerstoffsäuren bilden, weil das Cyanogen ein zusammengesetzter das Chlorin aber ein einfacher Stoff ist.
- 4) Dafs das Cyanogen das Eisen auflösen kann, ohne dafs sich Berlinerblau bildet, und ohne dafs eine Wasserstoffentbindung Statt findet, was die schöne Purpurfarbe beweist, welche Galläpfeltinktur damit hervorbringt; da man aber in dem Antheil Eisen, der nicht aufgelöst wurde, Berlinerblau findet, so ist es ungewifs, ob das Eisen durch das Cyanogen aufgelöst worden sey. Wahrscheinlicher ist es, dafs dieses durch die Cyansäure geschah, so dafs also in diesem Fall das Wasser zersetzt wurde; es würde dann Hydrocyansäure gebildet worden seyn, welche an das Eisen überging, und Cyansäure, welche ebenfalls,

- 3<sup>r</sup> mit Eisen verbunden, dieses aufgelöst erhielt. Vielleicht bildet sich auch Ammoniak und Kohlensäure.
- 5) Dafs die Hydrocyansäure geradezu mit dem Eisen sowohl als mit seinem Oxyd Berlinerblau bildet, ohne saurer weder noch alkalischer Beihülfe; dafs folglich das Berlinerblau ein hydrocyansaures Eisen zu seyn scheint.
- 6) Dafs sich jedesmal, wenn Cyankali mit Wasser in Berührung kommt, Ammoniak erzeugt, welches sich mit der zu gleicher Zeit frei werdenden Kohlensäure verbindet, woraus folgt, dafs auch viel Cyankali nur wenig hydrocyansaures Salz geben kann, weil immer ein beträchtlicher Theil jener Substanz in Ammoniak und Kohlensäure verwandelt wird.
- 7) Aus meinen Versuchen scheint auch hervorzugehen, dafs jene Metalle, welche, wie das Eisen, die Eigenschaft besitzen, das Wasser in gewöhnlicher Temperatur zu zerlegen, nur hydrocyansaure Salze, diese aber, welche das Wasser nicht zersetzen, gegentheils nur Cyanverbindungen bilden. Zu der Zahl dieser letztern gehören Silber und Quecksilber; bei dem Kupfer aber ist es möglich, dafs eine Ausnahme Statt finde.
- 8) Alle meine Versuche endlich bestätigen blofs die schönen Resultate, welche Hr. *Gay-Lussac* über die Zusammensetzung des Cyanogen's und der Hydrocyansäure erhielt, und leiten blofs noch einige weitere Folgerungen daraus ab.
-

A n a l y s e  
e i n e s  
a n t i k e n N a g e l s,  
der in einer Grabstätte bei *Dillich*, im  
kurhessischen Amte *Borken*, gefunden  
worden ist;

v o m

*Hofrath* *Wurzer*

in Marburg.

**E**s ist bekannt, dafs im hohen Alterthume sowohl die Angriffs- als Vertheidigungswaffen von Kupfer waren. Wir sehen dies nicht nur im *Herodot*, sondern auch im *Homer*. Auch fand bei den spätern Griechen und Römern die Anwendung des Kupfers zu Waffenstücken noch Statt, als man mit der Gewinnung des Eisens und dessen Bearbeitung schon vertraut zu werden angefangen hatte. Dafs aber auch Deutsche solche — vielleicht von den Römern eroberte — Waffen zuweilen geführt haben, ist, so viel ich weifs, minder bekannt.



Das aufgefundene Grab ist nach der Meinung meines Freundes und Collegen, des Herrn Hofraths *Rommel*, der sich bei seiner Bearbeitung der hessischen Geschichte in Aufsuchung und Beurtheilung dieser Gegenstände einen bekannten Takt erworben hat, kein römisches Grab gewesen; denn man findet dergleichen auch in Gegenden, wo die Römer nie herkamen (nach *Hirt's* Bemerkung); auch fand man dieses in einem Eichenwald, der den alten Deutschen heilig war, und in Gesellschaft von Urnen, deren ganze Gestalt und Masse nicht römisch ist. Merkwürdig waren auch die dabei gefundenen ungewöhnlich grossen Menschenknochen (Beweise, das man später, nach Einführung des Christenthums und so nach Abschaffung des Verbrennungs-Gebrauchs, in den Grabstätten der heidnischen Vorfahren und neben ihren Urnen sich gern begraben liess; wie auch ein strenges Verbot *Karls des Grossen* beweiset) und, wie wenigstens die ersten Entdecker behaupteten, deutliche Spuren eines alten rauhen Thierfelles. Noch verdient vielleicht bemerkt zu werden, das in einem ähnlichen chattischen Grabe auf 5 bis 6 Steinen, die neben den Urnen lagen, sich eine alte rohe Schrift fand, die nach der Meinung des Finders (Herrn Hofraths *Rommel*) und den Herrn, denen er die Schrift mittheilte, Bischoffs *Münter* und Professors *Crolefonds* eine alte europäische oder deutsche *Chiffre - Schrift* ist. Auch würden die *Chatten* dasselbe gewiss nach dem letzten Streifzug der Römer unter *Germanicus* zerstört haben, wenn es ausländisch gewesen wäre. —

In dieser Grabstätte fanden sich ein Schwert und ein paar *Nägel*, womit vielleicht ein hölzerner Griff an dasselbe befestigt gewesen war. Doch sahen die

Nägel sich nicht ganz gleich; vielleicht waren die in verschiedenen Zeiten (und von verschiedenen Künstlern gefertigt) angewandt worden. Ich erhielt einen davon von Sr. Königl. Hoh. dem Kurf. von Hessen zur chemischen Untersuchung.

Dieser Nagel war mit dem grünen firmisartigen Roste der Patina (*Aerugo nobilis*) überzogen. Ich liefs den Nagel von allen Seiten davon befreien und poliren; es trat ein schöner gelber, dem Golde ähnlicher Metallglanz hervor. Der Nagel wog 60 Gran. Ich zerstückelte und übergoss ihn mit 8 Theilen Salpetersäure von 1,225 eigenth. Gewichte, und digerirte ihn bis zur vollständigen Zerlegung. Jetzt wurde das Ganze mit 4 Th. destillirtem Wasser verdünnt und ruhig hingestellt, bis die Flüssigkeit vollkommen klar geworden war, und alles Zinnperoxyd sich zu Boden gesetzt hatte. Durch Filtriren wurde dieselbe gesondert, mit destillirtem Wasser abgeseift, getrocknet, und bis zum anfangenden Rothglühen erhitzt. Die durchgelaufene Flüssigkeit wurde, nachdem sie auf *Zinn*, *Blei*, *Eisen* und *Silber* geprüft worden war, und ich mich überzeugt hatte, dafs sie von diesen Metallen nichts enthielt, in zwei Theile getheilt; aus dem einen wurde das Kupfer durch Eisen präcipitirt, und der zweite wurde in eine flache Schale gegossen, deren Boden mit einer breitgeschlagenen Bleiplatte belegt war. Nach 3 Tagen (zuletzt unter Anwendung einer gelinden Wärme) war die Auflösung ganz zersetzt, und das Kupfer metallisch gefällt.

Das Verhältnifs der Bestandtheile war:

Zinn	—	4,42
Kupfer	—	95,58
		<hr/>
		100

Wahrscheinlich besteht das Schwert aus denselben Bestandtheilen in einem andern quantitativen Verhältniß, nämlich einem größern Antheil Zinn, welcher den Nagel weniger biegsam gemacht haben würde.

Alle in Deutschland und Frankreich aufgefundene Gegenstände dieser Art haben, wie *Klaproth*, *John*, *Mongez* u. a. beweisen, in einem mehr oder weniger abweichenden Mengeverhältniß dieselben Resultate geliefert. —

Kupfer, ohne Zusatz eines andern metallischen Stoffes, ist bekanntlich zu solchen Zwecken ganz unbrauchbar, und das ganze Geheimniß des „Aes“ der Römer bestand in einem Zusatz von Zinn zum Kupfer.

Ueber die  
Bereitung  
des ätzenden  
Quecksilbersublimats,  
von  
I. B. Trautwein \*).

---

Bei der Menge vortrefflicher chemischer, und pharmazeutisch-chemischer Schriften, die wir in unsern Zeiten besitzen, könnte es zwar überflüssig scheinen, Anleitung zur Fabrikation eines Salzes zu geben, worüber beinahe jedes Handbuch das Verfahren lehrt. Gleichwohl möge ein chemisches und pharmaceutisches Publikum mir gütigst erlauben, über die Bereitung

---

\*) Herr Trautwein, welcher im vorigen Jahr sehr thätig theilnahm, an der B. XXIII, S. 489. erwähnten physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen, steht nun der chemischen Fabrik des Hrn. Diehl in Nürnberg vor, und wir können mit Gewissenhaftigkeit die Präparate dieser Fabrik denen empfehlen, welche derselben bedürfen.

des ätzenden, salzsauren Quecksilbers hier einige Nachrichten mitzutheilen, die in Betreff des Praktischen bei dem grössten Theile der Leser dieses Journals vielleicht eine geneigte Aufnahme finden.

Den ätzenden Sublimat erhielt man ehemals bekanntlich fast ausschliessend von den Holländern: allein während Deutschland seit ungefähr einem halben Jahrhundert in allen Zweigen der Künste und Wissenschaften mehr als je den Ausländern sich an die Seite gestellt hat, so war es namentlich auch das chemische Fabrikwesen, das bei den gemachten Entdeckungen, in seinen Anstalten und Einrichtungen nicht zurückbleiben wollte, sondern sich besser entwickelte. So wie z. B. ehemals die holländischen chemischen Fabriken für Deutschland, ausser dem Sublimat, noch den grössten Bedarf von rothem Präzipitate, Zinnober u. a. lieferten, — so sind es jetzt die deutschen Fabriken (in Oesterreich, Baiern und fast allen Staaten), welche diese Gegenstände nicht allein für Deutschland, sondern noch in bedeutenden Mengen für das Ausland, für Rußland, Pohlen u. s. w. ja selbst zum Theile für Holland in den Handel bringen.

Das älteste Verfahren, den Aetzsublimat zu bereiten, bestand, wie hinreichend bekannt ist (und besteht zum Theil jetzt noch) darin, dafs salpetersaures Quecksilber mit metallischem Quecksilber, gebranntem schwefelsauren Eisen und getrocknetem Kochsalz zusammengerieben, und diese unter den nöthigen praktischen Maasregeln zur Sublimation gebracht wurden. Ein späteres zweckmäßigeres Verfahren, eine Darstellung desselben aus schwefelsaurem Quecksilber und Kochsalz, hat jedoch diese Methode grösstentheils verdrängt; und diese zweckmäßigere Art ist es auch

keit getrieben werden kann: nur durch Zerschlagen der Retorten und nachheriges Pulvern oder Vermischen des aus Glaubersalz und geschmolzenem Sublimat bestehenden Rückstandes mit neuer Sublimatmasse läßt sich dieser Vorfall wieder gut machen. Die Menge des aus 100 Pf. Quecksilber, oder aus 140 Pf. schwefelsaurem Quecksilber und 140 bis 150 Pf. abgeknistertem Kochsalze gewonnenen ätzenden Quecksilbersublimats beträgt nach der regelmäsig nach Angabe verrichteten Sublimation — 130 bis 133, seltener gegen 156 Pfunde. —

Die Haupterfordernisse zur möglichsten Ausbeute in der Fabrikation des Quecksilber-Deutochlorids im Großen beruhen überhaupt auf der erfahrungsmäßigen Beobachtung: *dafs sowohl das schwefelsaure Quecksilber, als auch das Kochsalz zu seiner Bereitung möglichst trocken seyen, — dafs seine Sublimation nur einen geringen Feuergrad erfordere, und dafs die leichte Schmelzbarkeit dieses Salzes, in Betreff des Zurückfließens während der Arbeit, ein öfteres Nachsehen erheische.* —

Fourcroy in seinem „System der Chemie im Auszuge von Wolff“ 2ter Band S. 217 hegt aus den einleuchtenden Gründen unserer chemischen Theorien die Vermuthung, die Fabrikation des Sublimats müßte auf eine sehr vortheilhafte Weise sich aus einem Gemenge von schwarzem Manganoxyd, calcinirtem schwefelsaurem Eisen, Hochsalz und metallischem Quecksilber bewerkstelligen lassen. Mein Freund, Herr Schmitthener und ich wollten es nicht unversucht lassen, die Theorie dießfalls durch die Erfahrung zu bestätigen. Den ersten Versuch, den wir damit machten, und wobei wir nach Gutdünken das Verhältniß

von 9 Pf. Quecksilber, 6 Pf. Braunstein, 16 Pf. calcinirtem Vitriol und 16 Pf. abgeknistertem Kochsalze wählten, entsprachen unserer Erwartung vollkommen: ja, wir waren sogar so glücklich, in Rücksicht des Procentüberschusses an dem Präparate, gegen das verwendete Quecksilber, die 30 Pfunde zu erreichen — und das Fabricat war vollkommen weiß. Ein anderes Verhältniß erwähnter roher Ingredienzien, das wir nun aber Behufs eines Versuchs nach Grundsätzen, aus den Gesetzen chemischer Aequivalente ableiten wollten, entsprach im Erfolge unserer Erwartung nicht, — und zwar aus dem nachher leicht eingesehenen Grunde der nicht allseitig genug erfolgten Berührung des aus trockenem, gröblich gepulverten Substanzen bestehenden Gemengsels. Wir erhielten da nur versüßtes salzsaures Quecksilber (Quecksilber-Protohaloid) das etwas eisenhaltig war, neben einem ansehnlichen Theil laufenden Quecksilbers. Gleiches Verhalten hatte es mit dem Producte, als wir später ersterwähntes Verhältniß, eingedenk der Davy'schen Theorie von der oxydirten Salzsäure, unter Weglassung des Manganoxydes in einem Versuche wiederholten; wir erhielten hier ebenfalls bloß versüßtes salzsaures Quecksilber und metallisches Quecksilber. — Diese Methode einer einfachen durch Reiben zu bewerkstelligenden Vermengung des Braunsteins, calcinirten Vitriols und Kochsalzes mit Quecksilber und nachheriger Sublimation zu Sublimat ist indess recht bequem; sie erfordert nur einen etwas stärkern Feuergrad als diejenige mittelst schwefelsauren Quecksilbers, und daher auch etwas mehr Sorgfalt für das Verhüten des Zurückfließens. Die Lage jeder Fabrik,

## 98 Trautwein über die Bereitung des etc.

die Preise der Schwefelsäure, des Vitriols, des Brausteins und des Glases werden entscheiden müssen, wo etwa dieses Verfahren gegen die übrigen Arten mit Vortheil wird in Ausübung gebracht werden können.



Ueber  
 Polarität und doppelte Strahlenbre-  
 chung  
 der Krystalle;  
 vom  
 Professor Bernhardi.

Um die Polarität der Krystalle zu prüfen, besitzen wir zur Zeit kein anderes allgemeines Mittel, als den trägerischen Pendel, d. h. einen an einem Faden aufgehängenen Schwefelkies, dessen Stelle indess vielleicht jeder andere Körper, der selbst Polarität besitzt, vertreten kann. Ein solcher Schwefelkiespendel bewegt sich an manchen Stellen der Krystalle in sich immer mehr erweiternden Spirallinien, die endlich in Kreise übergehen, von der Linken zur Rechten nach dem scheinbaren Laufe der Sonne, während er an andern in engeren Kreisen von der Rechten zur Linken schwingt. Jene hat man *positive*, diese *negative Pole* genannt. Da wo der Pendel sich zwischen zwei Polen befindet, schwingt er in gerader Richtung von dem einen zum

## 100 Bernhardi über krystallinische Polari-

ändern, und hält man ihn in den Mittelpunkt schein mehreren, so ruht er gänzlich.

Der Pendel schwingt bekanntlich nicht in Händen aller Menschen, sondern das Vermögen d scheint dem größern Theile derselben wo nicht ab gehen, doch nur in einem geringern Grade eigen seyn. Hierüber dürfen wir uns nun zwar eben wenig wundern, als über die Erscheinung, daß a das oxydulirte Eisen die magnetischen Kräfte in s verschiedenen Graden aussert; indefs scheint doch ner Umstand vorzüglich den Grund zu enthalten, v um noch immer einige Physiker (so viel mir beka doch nur solche, welche das Vermögen nicht se besitzen), die Meinung hegen, daß jene merkwü gen Schwingungen auf bloßer Täuschung beruhet oder doch sehr verdächtig sayen. Was wir in ih Meinung bestärkt, ist die Thatsache, daß alle re, mäßig schwingende Bewegung aufhört, sobald de nige, welcher den Pendel hält, die Augen verschlie Allein diese auffallende Erscheinung spricht mehr als gegen die Unverdächtigkeit jener Versuche; di bei jedem Menschen hört; sobald er die Augen schlie offenbar alle Ausströmung auf, wie man sich lei dadurch überzeugen kann, daß man den Pendel ü den Scheitel oder die innere Handfläche eines M schen hält. So lang er die Augen geöffnet hat, ma der Pendel an diesen Stellen bei Mannpersonen i mer Schwingungen, wie an positiven Polen, bei Frau zimmern hingegen wie an negative. Nach Verschli sung hört alle Bewegung auf, und das geschieht au im natürlichen und magnetischen Schlafe. Ueber d geöffneten Augen selbst schwingt der Pendel d Mannpersonen wie an negativen, und bei Frauenzi

ern wie am positiven Pole, so wie denn überhaupt im weiblichen Geschlechte die Pole sich überall auf entgegen gesetzte Weise verhalten, wie beim männlichen. Ob nun die Ursache, warum bei geschlossenen Augen alle Schwingungen aufhören, darin zu suchen sey, daß das in die Augen einströmende Licht die Quelle der magnetischen Materie abgiebt, oder vielmehr darin, daß die Seele nach Verschließung der Augen in einen andern Zustand versetzt, und mehr in sich gekehrt wird, wollen wir hier nicht näher untersuchen. Für letztere Annahme scheint der Umstand zu sprechen, daß diese Versuche auch weniger gelingen, wenn man sich überhaupt nicht dazu aufgelegt hält, wenn man sie zu lang fortsetzt, und darüber müdet, wenn man sie vor den Augen unbekannter Menschen anstellt u. s. w. Aus einem ähnlichen Grunde scheint der Pendel auch dann nicht in dem Grade anzusprechen, wenn man den Arm, womit er gehalten wird, unterstützt, indem man in diesem Falle zu wenig Kraft aufzuwenden nöthig hat. Dagegen ist es völlig gleichgültig, ob man den Pendel unmittelbar an einem eisernen Stabe befestigt in die Hand nimmt. Daß übrigens nicht blos Täuschung obwalte, beweist schon der Umstand, daß man oft ganz unvertretete Resultate erhält, daß verschiedene Beobachter ihren Aussprüchen im Wesentlichen übereinstimmen, und daß diese Erscheinungen mit manchen andern in sehr genauer Beziehung stehen, und dadurch erhellen, als durch irgend eine bekannte Theorie ans Licht gesetzt werden, wovon wir unten durch Ausmittlung der bisher unbekanntenen allgemeinen Bedingung, auf die Eigenschaft der doppelten Strahlenbrechung, ein Beispiel geben wollen, Daß man sich in-

dessen bei Anstellung solcher Versuche leicht täuschen könne, ist allerdings wahr, denn fast unbemerkbar kann dem Pendel von der Hand eine Bewegung bloß mechanisch mitgetheilt werden. Ich trage daher auch gegenwärtig nur dasjenige vor, was ich als das Resultat mit aller Sorgfalt angestellter und vielfältig wiederholter Versuche ansehen darf.

Untersucht man Krystalle von verschiedenen Substanzen, so bemerkt man bald den bisher, wie mich dünkt, noch nicht beachteten Unterschied, daß bei manchen alle Pole gleichnamig, bei andern hingegen die entgegengesetzten ungleichnamig sind, so daß die eine Hälfte positiv und die andere negativ ausfällt. Man kann daher die Krystalle überhaupt in *homopolare* und *heteropolare* eintheilen, wovon jene wieder in *positiv* und *negativ* homopolare zerfallen, je nachdem sie bloß positive oder bloß negative Pole besitzen. Zu den heteropolaren scheinen alle Krystalle von unregelmäßiger Grundform zu gehören, ich keine wenigstens keine, die davon eine Ausnahme machten. Die Pole sind aber bei ihnen auf sehr verschiedene Weise vertheilt. Beim Rhomboëder des Kalkspaths z. B. befinden sie sich an sämtlichen Ecken, so daß die eine Endecke einen positiven, die andere einen negativen Pol bildet, und die Seitenecken abwechselnd positive und negative Pole darstellen; und zwar sind immer diejenigen Seitenecken positiv, die nach der positiven Endecke zu liegen, und diejenigen negativ, welche von der negativen Endecke sich am wenigsten entfernen. Jede primitive Häutenfläche des Rhomboëders erhält auf diese Weise drei polarisch gleiche und einen polarisch ungleichen ebenen Winkel. Der Quarz hat ebenfalls acht Pole, wovon ein positiver und ein

negativer auf die Endecken, die übrigen auf die Seitenecken des Triangulärdodekaëders fallen, welche abwechselnd positiv und negativ sind. Am Rhomboëder des Turmalins zeigen sich nur sechs Pole, indem blos die Seitenecken sich abwechselnd positiv und negativ verhalten. Nach der Erhitzung verändern sich die Pole: diejenigen, welche vorher positiv waren, werden negativ, und umgekehrt die negativen positiv. An den vorhergenannten Krystallen findet nach der Erwärmung keine solche Umkehrung Statt. Der Honigstein läßt ebenfalls sechs Pole bemerken, wovon ein positiver und ein negativer auf die Endecken fallen, während die vier übrigen nicht an den Seitenecken, sondern an den Seitenkanten sich befinden, so daß zwei an einander gränzende positiv und die gegenüber liegenden negativ sind. Der Feldspath besitzt acht Pole, welche die acht am meisten hervorstehenden Ecken seiner Krystalle bilden, die sich abwechselnd positiv und negativ zeigen. Beim Schwerspathe sind sechs Pole vorhanden, die den vollkommensten Durchgängen der Blätter entsprechen. Auf ähnliche Weise scheint es sich beim Gypse zu verhalten. Der Topas besitzt wenigstens acht Pole, die aber nicht auf die hervorstehenden Ecken fallen, sondern mehr auf die Kanten; auch sind sie nicht abwechselnd positiv und negativ, sondern alle negative liegen nach dem freien Ende des Prisma, während sämtliche positive nach dem andern gekehrt sind. Nach der Erwärmung verhält es sich umgekehrt. Auch bei der Hornblende kehren sich nach der Erwärmung die Pole um, deren dies Mineral vier besitzt, welche an den vier Ecken liegen, die die schärfern Seitenkanten von *Hauy's* primitiver Form bilden. Die positiven liegen bei dem nicht erhitzten an dem mehrflächigen Ende des Prisma.

Wenden wir uns von den Substanzen, welchen eine unregelmäßige Grundform zukommt, zu denen von regelmäßiger primitiver Gestalt, so werden wir die meisten homipolar finden, so daß sie entweder bloß positive oder bloß negative Pole besitzen. Positiv verhalten sich z. B. der Diamant, der Granat, der Schwefelkies, der Flußspath; negativ dagegen der Alaun, das Steinsalz. Der Diamant scheint sechs positive Pole zu besitzen, die den Ecken des regelmäßigen Oktaëders entsprechen. Dem Granate kommen eben so viel zu, und zwar fallen sie auf die sechs vierseitigen Ecken, und entsprechen daher ebenfalls den Ecken des regelmäßigen Oktaëders. Der Schwefelkies zeigt acht positive Pole, die an den acht Ecken des Würfels liegen. Am Flußspathe bemerkt man deren zwölf, die auf eine sehr ausgezeichnete Weise auf die zwölf Kanten des Würfels fallen. Am Alaun gehen sich sechs negative Pole, die mit den Ecken des Oktaëders übereinkommen, deutlich zu erkennen. Das Steinsalz besitzt dagegen deren acht, die den Ecken des Würfels entsprechen.

Mit Recht läßt sich erwarten, daß mit lauter negativen Polen versehene Körper, wenn sie selbst als Pendel gebraucht werden, auch in entgegengesetzten Richtungen schwingen, d. h. am positiven Pole von der Rechten zur Linken, und am negativen von der Linken zur Rechten, und so verhält es sich auch. Man kann daher die Pendel selbst in positive und negative einteilen. Die bisher angeführten Beobachtungen müssen immer in Bezug auf den positiven Pendel verstanden werden. Körper, die zugleich positive und negative Pole besitzen, sind zu Pendeln weniger geeignet, wie wohl sie in der Regel sich wie positive zu verhalten scheinen.

Bisher habe ich nur zwei Körper von regelmässiger Grundform, die gleichwohl ungleichnamige Pole besitzen, kennen gelernt. Der eine ist der Boracit, welcher acht Pole zeigt, die den Ecken des Würfels entsprechen. Diejenigen, wo die zahlreichsten Flächen aufgesetzt sind, verhalten sich negativ, die gegenüberliegenden mit der geringern Anzahl von Flächen positiv. Nach der Erwärmung findet das Gegentheil Statt, die Pole haben sich umgekehrt, so daß darin der Boracit mit dem Turmalin vollkommen übereinstimmt. Der andere regelmässige und gleichwohl heteropolarische Körper ist der Magneteisenstein, eine in Hinsicht ihrer Polarität einzige Substanz; denn keine andere besitzt bloß zwei ungleichnamige Pole, so wie diese. Sie fallen auf zwei der entgegengesetzten Ecken des regelmässigen Oktaeders, so daß der positive Pol dem Nordpole, und der negative dem Südpole entspricht. Hieraus läßt sich dann mit Recht vermuthen, daß der Magnetismus des oxydulirten Eisens bloß eine besondere Aeusserung des allgemeinen Magnetismus sey, der auch den übrigen Körpern nicht abgeht, ja daß vielleicht jeder Körper, welchem sich, wie diesem, bloß zwei magnetische Pole mittheilen ließen, auch die besondern magnetischen Eigenschaften des Eisenoxyduls, nämlich Aehnliches anzuziehen, in einem gewissen Grade zeigen würde. Es ist daher nicht unschicklich, auch die Pole anderer Körper, an welchen der Pendel jene kreisenden Bewegungen macht, die magnetischen Pole, und die geraden Linien, die durch zwei entgegengesetzte Pole gezogen werden können, die magnetischen Achsen zu nennen. Ein Körper wird daher die Hälfte so viel magnetische Achsen haben, als ihm magnetische Pole zukommen.

Bei den homopolaren Körpern ist zwischen den beiden magnetischen Polen kein Unterschied, bei den heteropolaren ist der eine immer positiv und der andere negativ. Es giebt indessen Krystalle, bei welchen man die magnetischen Achsen nicht so bestimmen kann, wie eben angegeben wurde, weil ihren Polen keine andere gegenüberliegen. Hieher gehört z. B. das regelmäßige Tetraeder des Fahlerzes, an welchem blos die vier Ecken positiv polarisch sind. An solchen Krystallen kann dann magnetische Achse die gerade Linie genannt werden, die von einer Ecke auf die gegenüberliegende Fläche senkrecht sich ziehen läßt. Es giebt daher monopolare und dipolare magnetische Achsen.

Der verstorbene Prof. *Knoch* hat bemerkt \*), daß an Krystallen, welche mit der einen Seite verwachsen sind, das freie Ende sich jederzeit positiv verhält. Die Wahrheit dieser Beobachtung kann ich im Allgemeinen bestätigen, indessen finden doch Ausnahmen Statt. So können schon homopolare negative Körper ihrer Natur nach nie an dem freien Ende positiv werden. Aber auch die heteropolaren von unregelmäßiger Grundform, welche durch Erwärmung elektrisch werden, wie der Turmalin und der Topas, scheinen an ihrem freien Ende immer negativ zu seyn, und nur durch Erwärmung erst positiv zu werden.

Diese Umkehrung der Pole am Turmalin kann um so weniger auffallend seyn, da man schon früher gefunden hat, daß auch die elektrischen Pole beim Erkalten sich zuweilen umkehren. Man darf auch wohl

\*) *Gilbert's Annalen der Physik* 27r Bd, 4r St.



mit Sicherheit annehmen, daß die elektrischen Achsen keine andern sind, als die magnetischen, und daß daher dem Turmalin nicht, wie man bisher allgemein annahm, bloß eine Electricitätsachse zukomme, sondern daß deren so gut, wie beim Boracit, mehrere, und zwar drei vorhanden sind. Dies wird besonders noch durch den Umstand um so wahrscheinlicher, daß der Turmalin gewöhnlich in neunseitigen Prismen krystallisirt vorkommt, und sich dadurch vor allen andern Körpern von rhomboëdrischer Grundform auszeichnet. Denn wir wissen, daß alle diejenigen Krystalle, die durch Erwärmung elektrisch werden, an den ungleichnamigen Polen eine verschiedene Anzahl von Flächen aufsetzen. Lügen nun bei dem Turmalin die beiden elektrischen Pole an den beiden Enden der Achse des Rhomboëders, so wäre es unbegreiflich, wie dieser Umstand einen Einfluß auf eine ungleichmäßige Aufsetzung der Seitenflächen besitzen könne. Geben wir hingegen zu, daß die elektrischen Pole mit den magnetischen zusammenfallen, so ist es ganz in Uebereinstimmung mit unsern übrigen Erfahrungen, daß an den Polen, die sich nach der Erwärmung positiv elektrisch zeigen, auch die größte Anzahl von Flächen aufgesetzt ist, und also das Prisma neunseitig ausfällt, oder da, wo dies der Fall nicht ist, die Flächen doch von verschiedener Ausdehnung sind.

Da hier einmal vom Turmalin die Rede ist, so erlaube ich mir noch zu bemerken, daß ich den sogenannten Dichroit bloß für eine geringe Abänderung desselben halten kann. Dafür spricht: 1) die *chemische Analyse*. *Gmelin* fand darin 42,6 Proc. Kieselerde, 34,4 Thonerde, 5,8 Talk, 1,7 Kalk, 15,0 Eisenoxydul, 1,7 Mangan, während *Kauquelin* den grünen

Turmalin aus 40 Proc. Kieselerde, 59 Thonerde, 3,84 Kalk, 12,5 Eisenoxydul und 2 Manganoxyd zusammengesetzt erklärt. Einige andere Analysen des Turmalins stimmen fast noch mehr mit der des Dichroits überein. 2) Die *Krystallisation*. Die Krystalle des bairischen Dichroits, welche ich der Güte des Herrn Hofr. *Fuchs* verdanke, der dieses Mineral zuerst als Dichroit erkannte, stellen neunseitige Prismen vor, wie sie ausser dem Turmalin keiner andern Substanz zukommen. *Cordiér* fand den spanischen in regelmässig sechsseitige, an den Kanten zum Theil abgestumpfte Prismen krystallisirt, was mit unserer Behauptung durchaus nicht in Widerspruch steht, da sechsseitige und zwölfseitige Prismen auch zuweilen beim Turmalin vorkommen, und nimmt man an, das bloss die abwechselnden Kanten abgestumpft gewesen seyen, so hat man das neunseitige Prisma. 3) Der *Farbenwechsel*. Der edle Turmalin zeigt so gut, wie der Dichroit, beim durchfallenden Lichte andere Farben, als beim auffallenden, was vielleicht in der eigenen Lage der magnetischen Pole bei dieser Substanz seine Erklärung findet. 4) Die *elektrischen Eigenschaften*. Der Dichroit aus Baiern wird so gut wie der Turmalin nach der Ermärmung polarisch elektrisch. Endlich findet auch in seinen übrigen Kennzeichen kein wesentlicher Unterschied Statt. Wenn daher, wie es scheint, die Boraxsäure einen wesentlichen Bestandtheil des Turmalins ausmacht, so wird man sie sicher im Dichroit auch auffinden.

Schliesslich kann ich nicht umhin, noch auf die Aufschlüsse aufmerksam zu machen, welche die Lehre von den magnetischen Polen für die Theorie der doppelten Strahlenbrechung zu geben verspricht. Es ist

unverkennbar, daß alle *diejenigen Körper die Strahlen doppelt brechen, welche ungleichartige magnetische Achsen besitzen.* Beim Kalkspath z. B. sind die drei magnetischen Achsen, die von einer Seitenecke zur andern gehen, einander gleich; aber die vierte, welche der Achse des primitiven Rhomboëders entspricht, ist davon verschieden. Ein Theil des einfallenden Lichts folgt daher der magnetischen Ziehkraft in dieser Richtung, während der übrige die gewöhnliche Brechung erfährt. Das zweite Bild fällt deshalb immer nach einem der beiden Pole zu, die an den Endecken des Rhomboëders liegen. Auf ähnliche Weise verhält es sich beim Honigstein, beim Schwerspathe und andern Körpern von unregelmäßiger Grundform, die doppelte Strahlenbrechung besitzen. Keine Substanz von regelmäßiger primitiver Gestalt bricht dagegen die Strahlen doppelt, weil sie sämtlich, selbst den Boracit nicht ausgenommen, gleiche magnetische Achsen besitzen. Es giebt indessen auch Körper von unregelmäßiger Gestalt, welchen keine doppelte Strahlenbrechung zukommt, weil bei aller Unregelmäßigkeit der Form ihre magnetischen Achsen doch nicht von einander abweichen, und dies ist es, was am entschiedensten für den innigen Zusammenhang spricht, in welchem die magnetische Polarität mit der doppelten Strahlenbrechung steht. Ein solcher Körper ist z. B. der Turmalin, der, ungeachtet er in seiner Grundform wenig (vielleicht gar nicht wesentlich) vom Kalkspath abweicht, die Strahlen gleichwohl bloß einfach bricht, da seine drei magnetischen Achsen einander gleich sind, und ihm die vierte ungleiche, die der Kalkspath besitzt, gänzlich fehlt. Aus dieser einfachen Strahlenbrechung des Turmalins läßt sich zugleich

schließen, daß hierbei nicht, wie man häufig annimmt, die Polarität des Lichts selbst im Spiele sey. Denn wäre letzteres der Fall, so würde man zu erwarten haben, daß das Licht, wenn es durch zwei gegenüberliegende Seitenflächen des Prisma eines Turmalins strömte, in zwei Strahlen werde getheilt werden, da auf der einen Seite drei positive und auf der andern drei negative Pole liegen, und davon zeigt sich gleichwohl durchaus nichts. Auch der Umstand, daß jeder der beiden Strahlen nach dem Durchgange noch immer in dieselben Farben getrennt werden kann, und andere Erfahrungen lassen das Phänomen der doppelten Strahlenbrechung nicht wohl aus der Polarität des Lichts erklären. Wenn übrigens der eine Strahl nach dem Durchgange andere Eigenschaften erhält, als der andere, so sind hinreichende Quellen vorhanden, welche eine solche Verschiedenheit bewirken können. Man darf nämlich nicht nur annehmen, daß die Menge des Lichts, seine Richtung und seine Geschwindigkeit bei beiden verschieden sey, sondern es ist selbst möglich, daß sie durch die verschiedenen magnetischen Ströme noch insbesondere verändert werden, daß z. B. der eine ein größeres Quantum magnetischer Materie mit sich fortreißt, als der andere, daß jener mehr verdichtet wird als dieser, u. s. w.

---

111

---

**Verfahren**  
um  
**Schwefelwasserstoffgas im Großen**  
zu bereiten.

Von  
**Gay-Lussac.**

(Uebersetzt aus den *Annales de Chimie et de Physique* T. VII.  
März 1818, S. 314 von G. A. *Herrich*, Mitglieder der phys.  
Gesellschaft von Studierenden in Erlangen \*).

---

**M**an nimmt hiezu gewöhnlich Schwefeleisen, das man durch das Rothglühen einer Mischung aus Schwefel und Eisen erhält. Bei diesem Processe tritt jedoch der Uebelstand ein, daß das so erhaltene Schwefeleisen sich öfters nur sehr unvollkommen durch Säuren zersetzt. Wenn man ein recht reines Gas erhalten will, muß man (wie *Thenard* und ich in unsern physicalisch-chemischen Untersuchungen riethen) lieber Schwefelspießglanz nehmen; da man aber hierbei sehr stark concentrirte Salzsäure braucht, so ist dieses Verfahren für den gewöhnlichen Gebrauch wenig vortheilhaft.

---

\*) Durchgesehen v. H.

Jetzt verfare ich auf folgende Weise:

Ich bringe eine Mischung von zwei Theilen Eisenfeile und einem Theil Schwefelblumen in eine Retorte; setze so viel Wasser hinzu, als nöthig ist, um daraus einen Teig zu machen, und erhitze die Retorte ein wenig, um die Verbindung des Eisens und Schwefels zu begünstigen, die sich bald durch starke Entbindung von Wärme, und durch eine schwarze Farbe zu erkennen giebt, welche die ganze Masse annimmt.

Schwefelsäure, um das 4fache ihres Volums mit Wasser verdünnt, entbindet hieraus das Schwefelwasserstoffgas fast so rasch, als aus einem Schwefelwasserstoffkali. Uebrigens hat man diese Verbindung des Eisens und Schwefels nicht vorher zu bereiten, es sey denn, daß man sie sehr sorgfältig vor Berührung der Luft schütze, weil sie sehr schnell sich umbildet, und es auch nur weniger Augenblicke zu ihrer Bereitung bedarf.

Die Natur dieser merkwürdigen Verbindung ist noch problematisch. Ist sie eine Verbindung mit Schwefel, oder eine mit Schwefelwasserstoff? Wenn man in Betrachtung zieht, daß Wasser zu ihrer Bildung absolut nothwendig ist, daß dieses verschwindet und fest wird, so kann man wohl annehmen, daß hier eine Verbindung mit Schwefelwasserstoff entstehe. Wenn Wasser nicht ein wesentlicher Bestandtheil dieser Zusammensetzung wäre, so wär es nicht zu begreifen, wie es durch seine bloße Gegenwart das Eisen bestimmen sollte, sich mit dem Schwefel zu verbinden. Man könnte freilich annehmen, daß sich ein Hydrat des Schwefeleisens bilde; aber ich gestehe, daß ich mich kaum entschließen kann, dieß anzunehmen.

Auszug  
des  
meteorologischen Tagebuches

vom

Professor *Heinrich*

in

Regensburg.

---

Januar 1819.

## B a r o m e t e r.

Mo- nats- Tag.	Stunde.	Maximum.	Stunde.	Minimum.	Medium.
1.	10 A.	27 <sup>''</sup> 4 <sup>'''</sup> , 87	12 Mittag	27 <sup>''</sup> 2 <sup>'''</sup> , 64	27 <sup>''</sup> 3 <sup>'''</sup>
2.	8 F.	27 5, 55	2 A.	27 4, 70	27 5,
3.	10 A.	27 6, 22	3 F.	27 5, 55	27 5,
4.	8 F.	27 6, 48	2. 10 A.	27 5, 61	27 5,
5.	10 F.	27 5, 74	2 A.	27 5, 15	27 5,
6.	8 F.	27 5, 44	6 F. 2 A.	27 5, 09	27 5,
7.	4 F.	27 4, 97	10 A.	27 4, 04	27 4,
8.	10 A.	27 4, 11	4. 6 F.	27 5, 71	27 3,
9.	10 F.	27 3, 50	10 A.	27 3, 02	27 3,
10.	8 A.	27 4, 62	5 F.	27 2, 38	27 3,
11.	11 A.	27 4, 00	4 A.	27 3, 05	27 3,
12.	10 A.	27 5, 81	4½ F.	27 4, 23	27 4,
13.	4½ F.	27 5, 63	8 A.	27 4, 08	27 4,
14.	10 F. 12 M.	27 4, 29	10 A.	27 3, 84	27 4,
15.	3 F.	27 2, 98	10 A.	27 0, 84	27 2,
16.	9½ F.	27 2, 55	6½ F.	26 8, 96	27 0,
17.	4 F.	27 2, 96	11½ A.	26 10, 05	27 0,
18.	5 F.	26 9, 48	2 A.	26 8, 98	26 9,
19.	10 A.	26 11, 44	4 F.	26 9, 06	26 10,
20.	4 F.	26 11, 26	10 A.	26 9, 86	26 10,
21.	6 F.	26 10, 74	2 A.	26 9, 14	26 9,
22.	10 F.	26 10, 90	4½ F.	26 10, 33	26 10,
23.	10 A.	27 0, 84	4 F.	26 10, 96	26 11,
24.	4 F.	27 1, 21	10 A.	26 11, 64	27 0,
25.	12 Mittag	27 0, 36	10 A.	26 11, 94	27 0,
26.	10 F.	26 11, 94	6 A.	26 11, 32	26 11,
27.	10 F.	26 11, 27	4 A.	26 10, 84	26 11,
28.	4 F.	26 10, 53	4 A.	26 9, 41	26 9,
29.	3 F.	26 9, 98	9 A.	26 8, 73	26 9,
30.	6 F.	26 7, 92	6 A.	26 7, 39	26 7,
31.	9½ A.	26 7, 41	4 A.	26 6, 80	26 7,
Im ganz. Mon.	den 4ten F.	27 6, 48	den 31ten A.	26 6, 81	27 1,



Thermometer.		Hygrometer.			Winde.		
Ma- xim.	Me- dium.	Ma- xim.	Mi- nim.	Me- dium.	Tag.	Nacht.	
6	+ 0,0	+ 0,97	678	610	644,7	NW. 2	WNW. 1
0	- 2,0	- 0,10	664	393	621,2	WNW. 1	W. 1
5	- 1,2	+ 0,35	684	485	597,6	ONO. 1. 2	OSO. 1
4	- 3,0	- 1,48	572	390	518,5	OSO. 1	OSO. 1
8	- 2,5	- 2,02	562	541	554,2	SO. 1	OSO. 1
2	- 5,0	- 3,92	515	479	491,6	O. 1	SSO. 1
6	- 5,5	- 5,15	488	468	478,6	O. 1	O. 1
6	- 6,0	- 6,18	532	485	512,5	OSO. 1. 2	OSO. 1. 2
0	- 5,8	- 3,59	601	506	557,8	OSO. 2	OSO. 2
8	- 1,3	+ 0,34	577	462	503,5	OSO. 1	SO. 1
5	- 1,7	+ 0,12	506	418	460,2	SO. 1	SO. SW. 2
5	- 0,2	+ 1,41	635	438	535,7	WNW. 2	W. SO. 2
5	- 0,9	- 0,27	449	354	404,3	OSO. 2	OSO. 1
5	- 1,8	- 0,29	425	348	395,8	OSO. 1	OSO. W. 1
0	+ 2,5	+ 3,52	541	468	520,7	W. 2. 3	WSW. 2. 3
6	+ 0,2	+ 2,02	640	507	600,5	NW. 3. 4	W. 2
3	+ 0,3	+ 0,91	689	628	646,4	W. SO. 2	SO. SW. 2
2	+ 1,5	+ 2,75	665	645	653,2	SW. 2. 3	SW. 2
7	- 0,8	+ 0,56	715	632	671,2	WSW. 2. 3	SW. 2
0	- 0,6	+ 0,35	670	551	615,7	SW. 2	WSW. 2
6	- 4,5	- 1,22	585	541	562,1	O. 1	SW. 1
1	- 2,0	- 0,47	577	484	548,7	SO. 1	O. 1
6	- 1,0	+ 0,07	471	403	447,9	OSO. 1	OSO. 1
7	+ 0,4	+ 0,96	359	284	313,6	OSO. 1	OSO. 1
3	- 1,3	- 0,20	391	285	337,9	OSO. 1. 2	OSO. 1. 2
4	- 3,4	- 2,07	358	274	319,6	OSO. 1.	OSO. 1
2	- 4,4	- 3,81	404	334	378,7	O. 1. 2	O. 1
0	- 5,8	- 4,10	446	388	407,4	O. NNO. 1	NO. 1
8	- 6,0	- 4,22	454	402	424,5	ONO. 1	ONO. 1. 2
2	- 3,8	- 1,27	555	500	530,3	ONO. 1	NNW. 1
3	- 1,5	- 0,65	532	455	490,3	N. 1	N. 1
6	- 6,0	- 0,83	715	274	507,9		

Der mittlere Windrichtungswinkel ist die mittlere Richtung des Windes, die sich aus den verschiedenen Richtungen ergibt, die er während der Beobachtung annimmt.

Witterung.

Allgemeine  
Uebersicht  
der  
Witterung.

	Formittags.	Nachmittags.	Nachts.	Heitere Tage Schöne Tage Vermischte Tage Trübe Tage Tage mit Wind Tage mit Sturm Tage mit Nebel Tage mit Schnee Tage mit Regen
1.	Schnee, Regen, Wind.	Wind, Regen, Sonne.	Heiter, Trüb.	
2.	Trüb.	Trüb.	Trüb.	
3.	Schön.	Schön, Nebel.	Nebel, Trüb.	
4.	Trüb.	Trüb.	Trüb.	
5.	Trüb.	Trüb.	Trüb.	
6.	Trüb, Nebel.	Nebel.	Trüb, Nebel.	
7.	Trüb, Nebel.	Nebel.	Trüb.	
8.	Trüb, Wind.	Trüb, Wind.	Trüb, Wind.	
9.	Trüb, Wind.	Trüb, Wind.	Verm. Tr. Reg.	
10.	Verm. Trüb.	Regen. Verm.	Schön, Trüb.	Heitere Nächte Schöne Nächte
11.	Vermischt.	Trüb.	Trüb, Heiter.	Verm. Nächte
12.	Schön, Wind.	Schnee, Regen, Vermischt.	Heiter, Nebel.	Trübe Nächte
13.	Tr. Neb. Wind.	Nebel.	Nebel, Trüb.	Nächte mit Wind
14.	Trüb, Regen.	Regen, Trüb.	Regen, Trüb.	Nächte mit Sturm
15.	Regen, Wind.	Trüb, Wind.	Regen, Sturm.	Nächte mit Nebel
16.	Trüb, Sturm.	Wind, Verm.	Sturm, Schön, Trüb.	Nächte mit Schnee
17.	Trüb, Wind.	Verm. Wind.	Trüb, Wind.	Nächte mit Regen
18.	Trüb, Wind.	Regen, Wind.	Wd. Schön, Tr.	Reif
19.	Wind, Verm.	Sturm, Verm.	Trüb, Wind, Schnee.	Gewitter
20.	Trüb, Wind.	Schnee, Wind.	Trüb, Schön.	Regen- und Schnee
21.	Schön.	Trüb, Schnee.	Vermischt.	Wasser 11,5 L
22.	Trüb.	Trüb.	Trüb.	nien.
23.	Trüb, Schnee, Wind.	Regen, Schnee	Trüb, Nebel.	Herrschende Win- de OSO. O, W
24.	Nebel, Trüb.	Nebel.	Nebel.	Zahl der Beobach- tungen 512.
25.	Nebel, Trüb.	Nebel, Wind	Nebel.	
26.	Nebel, Trüb.	Nebel.	Nebel.	
27.	Nebel, Trüb.	Nebel.	Nebel.	
28.	Nebel, Trüb.	Nebel.	Heit. Tr. Nebel.	
29.	Nebel, Trüb.	Nebel.	Heiter, Wind.	
30.	Vermischt.	Trüb.	Trüb, Verm.	
31.	Trüb.	Trüb.	Trüb.	

Der Hauptstrom der Donau blieb stets offen; nur der nördliche Arm war größtentheils mit Eis bedeckt; auch dieses machte sich, vom 14ten aufgefangen, los: hierauf Eisgang, Wasserhöhe, durchaus ohne Schaden. Der Sturm am 16ten d. erreichte 6½ U. frühe sein Maximum, es Donner, Schnee, Regen, ohne beträchtlichen Schaden. Am 26ten d. sehr Niederschlag des Nebels, bei kaltem Ostwind, Bildung 5 Zoll dicker, über ein Zoll dicker, horizontaler Eiskristalle, in der Richtung des Windes; gegen drei Tage anhaltend.

**Chemische Untersuchung**  
*zweier Tyroler Mineralien,*  
 des  
**A n d a l u s i t s**  
*von der Liesenzer Alpe*  
 und des  
**B u c h o l z i t s,**  
*eines neuen*  
*(früher mit dem Faserquarz verwechselten)*  
**M i n e r a l s.**  
 Vom  
**Apotheker Dr. Rudolph Brandes,**  
*in Salz-Uffeln im Lippeschen,*

**E i n l e i t u n g.**

Das Tyroler Gebirge ist mit merkwürdigen und interessanten Naturkörpern so reichlich ausgestattet, daß die Aufmerksamkeit der Naturforscher, und namentlich des Mineralogen, dem sich hier ein so weites Feld eröffnet, im hohen Grade verdient. Eine große

*Journ. f. Chem. u. Phys. 25, Bd. 2. Heft.*

Masse von Bildungen ist gewiß noch in diesen Riesenmassen verborgen, die zu Tage gefördert das Gebiet der Wissenschaft auf eine den Forscher sicher belohnende Weise vermehren werden. Mehrere Tyroler Mineralien wurden in neueren Zeiten vorzüglich durch *Gehlen*, *Fuchs*, *Vogel* u. m. a. genauer Untersuchungen gewürdigt, nicht ohne Nutzen für die Wissenschaft. Mögen daher auch die nachfolgenden beiden Untersuchungen, die ich auf den Wunsch des verdienstvollen Herrn Professor *Weiss* in Berlin unternahm, der mich dazu gütigst mit möglichst reinen Exemplaren versah, nicht ganz ohne Interesse seyn. Beide Mineralien gehören in die von *Hausmann* so schön zusammengestellte Familie des Feldspaths, das erstere gewiß, und das zweite wage ich ebenfalls dorthin zu stellen. Bei genauer Untersuchung wird man bei demselben das Eigenthümliche und die ganze Tendenz in den Bildungen dieser Familie auch bei diesem Minerale wiederfinden, und diese Stelle als zweckmäßig für dasselbe anerkennen; denn obgleich dieses Mineral nicht so deutlich und in die Augen fallend, wie die übrigen Glieder dieser Familie, eine wirklich ausgebildete krystallinische Bildung zeigt: so ist es doch keinesweges amorphisch zu nennen, wie die faserige Textur sowohl als der stellenweise deutlich hervortretende blättriche Bruch beweisen. Auch die chemische Untersuchung wird diese Ansicht, wie ich glaube, zur Genüge rechtfertigen, und dieses Minerals als eine selbstständige Species in der Familie des Feldspaths oder des Zeoliths, in der kieselsauren Alaunerde-Ordnung überhaupt, anerkennen lassen.

## I.

## Untersuchung des Tyroler Andalusits.

## I.

Durch dunkle und graue Farben zeichnet sich der Andalusit von der Liesenzer Alpe von dem mehr fleischrothen, violblauen, röthlichbraunen und pfirsichblüthrothen Andalusit der übrigen bisher bekannten Fundörter sehr aus; obschon er sonst im Uebrigen mit demselben übereinstimmt, dieselbe sich dem rechtwinklich vierseitigen Prisma nähernde Krystallform besitzt, sich eben so wie dieser im Bruch und im Glanze verhält, nur weniger durchscheinend wie dieser zu seyn scheint. Uebrigens ist er gleich dem meisten anderen Andalusit innig mit einem glimmerartigen Gestein sowohl verwachsen, als auch zum Theil selbst damit überzogen.

Auch die chemische Seite dieses Minerals ist durch die trefflichen Untersuchungen *Vauquelins*, nach welcher der Spanische (*Brongniart traité de Mineralogie* I. 365. *Hausmanns* Handbuch der Mineralogie 506.)

52 Alaunerde

38 Kieselerde

2 Eisenoxyd

8 Kali

enthält, und *Bucholz's*, nach welcher nämlich der Andalusit von Herzogau in der Oberpfalz aus

60,5 Alaunerde

56,5 Kieselerde

4,0 Eisenoxyd

besteht (*v. Moll's Ephemeriden* IV. 199) auf eine dem Mineralogen gewifs befriedigende Weise aufgeheilt,

## 116 Brandes Analyse des Andalusits

und die Wiederholung einer neuen Analyse des Andalusits könnte unnöthig erscheinen, wenn nicht die Bestätigung einer früheren Wahrheit schon an sich Interesse und Nutzen hätte, und dazu noch der neue Fundort dieses Minerals und die Abweichung in der Farbe des letzteren dazu aufforderte, auch dasselbe speciell zu analysiren. Der Unterschied der beiden oben angegebenen Analysen besteht hauptsächlich in der von *Vauquelin* angegebenen Kalimenge. Die Verhältnisse der Kieselerde zur Alaunerde stimmen mehr überein.

So weit ich es vermochte, habe ich die äusseren Kennzeichen dieses Andalusits nachstehend angegeben.

### II

#### *Äussere Kennzeichen.*

*Farbe*: die Hauptfarbe war aschgrau und graulichweiss, nur an einigen Stellen zeigten sich dunkelgraue und röthliche Punkte.

*Bruch*: uneben von kleinem Korn ins splittrige — *Bruchstücke* unbestimmt eckig, ziemlich scharfkantig.

*Durchsichtigkeit*: an den Kanten schwach durchscheinend.

*Härte*: Glas ritzend, übrigens leicht zersprengbar.

*Verhalten vor dem Löthrohr*: hier schien er ohneachtet langer Einwirkung der Flammspitze nicht verändert zu werden, mit calcinirtem Borax aber begann er bald zu fließen und nach dem Erkalten fand sich auf der Kohle eine nur wenig gefärbte grünliche Glasperle.

*Vorkommen:* krystallisirt in beinahe rechtwinklichen vierseitigen Prismen. Eine genaue goniometrische Messung der Einfallswinkel der Seitenflächen war wegen der Unebenheit der Flächen nicht gut möglich; doch schienen sie zwischen  $95^{\circ}$  und  $87\frac{1}{2}^{\circ}$  zu fallen.

## III.

*A n a l y s e.*

## A.

100 Gran des in einem Chalcedonmörser zum feinsten Pulver zerriebenen Minerals wurden mit 10 Drachmen concentrirter Aetzkalkilauge anderthalb Stunden lang in einem Silbertiegel erst gelindem Feuer zur Verdampfung aller wässrigen Theile, und darauf einer erhöhten Hitze ausgesetzt, ohne daß indess die Masse in einen eigentlichen Fluß überging. Nach dem Erkalten des Tiegels war sie fast ganz weiß, nur stellenweise schwärzlich und bräunlich gefärbt; sie wurde mit kochendem destillirten Wasser aufgeweicht, aufs sorgfältigste in eine Porcellanschaale gespült; letztere im Sandbad erwärmt und nun ihrem Inhalte so lang Salzsäure hinzugesetzt, bis nicht allein die sich bei den ersten Zusätzen der Säure ausgeschiedenen gallertartigen Flocken wieder vollkommen aufgelöst hatten; sondern erstere auch im bemerklichen Ueberschuß zugegen war, worauf jetzt eine vollkommene durchsichtige hellgelbliche Flüssigkeit entstand, welche nun so lang erhitzt wurde, bis alles Wässrige und die überschüssige Säure verjagt worden war. Die trockne Salzmasse wurde mit destillirtem Wasser aufgeweicht;

alles in ein geräumiges Glas gegeben, ruhig hingestellt, der sich abgesondert habende Niederschlag durch Abgießen und Abfiltriren von der Flüssigkeit getrennt, nach möglichster Auswaschung auf einem 22 Gran schweren Filter gesammelt und nach Auslaugung und Trocknen des letztern 55 Gran schwer gefunden. Eine halbe Stunde lang in einem hessischen Schmelztiegel roth geglühet betrug die Menge dieses Stoffs noch  $47\frac{1}{2}$  Gran. Da nun zwar nach allem zu schließen dieser Stoff nur in reiner Kieselerde bestehen konnte, so bewog mich doch die demselben fast gänzlich fehlende rauhe Beschaffenheit der geglüheten Kieselerde, denn er liefs sich vielmehr weich anfühlen, ihn noch weiter zu prüfen. Er wurde daher zweimal, jedesmal mit einer halben Unze concentrirter Salzsäure gekocht und der dabei ungelöst gebliebene Rückstand ausgewaschen, getrocknet und geglühet, worauf derselbe jetzt nur noch 54 Gran betrug und sich wie vollkommen reine Kieselerde verhielt. Die davon getrennten salzsauren Flüssigkeiten, mit Aetzammoniakflüssigkeit im Ueberschufs versetzt, zeigten dadurch einen Bodensatz, der alle Eigenschaften der *Alaunerde* besafs, welche daher, da die davon getrennten Flüssigkeiten bei der ferneren Behandlung mit schicklichen Reagentien keine Spur eines noch fremden Stoffs bemerken liefsen, mit  $13\frac{1}{2}$  Gran zu berechnen ist,

## B.

Die aus A erhaltenen salzsauren Flüssigkeiten wurden mit Aetzammoniak übersättigt, und der dadurch reichlich entstandene stark aufgequollene fast schneeweiße Niederschlag vollkommen ausgewaschen in eine Unze siedender Aetzkalklauge getragen, worin



daher von denselben abgossen, um durch Untersuchung der Krystalle den Grund dieser mir ganz unbekannt und befremdenden Erscheinung aufzufinden. Da die Menge derselben indess so sehr gering war: so mußte mir vorzüglich an der Erkennung ihrer Grundlage gelegen seyn, die ich endlich, berücksichtigend die Eigenschaft der Bittererde, sich so leicht mit Ammoniak und einer Säure zu einem dreifachen Salze zu vermengen, für Bittererde zu halten geneigt war. Zu den Krystallen wurden daher 20 Tropfen Wasser und 3 Tropfen Schwefelsäure gegeben und durch gelinde Wärme eine vollständige Auflösung des Salzes bewirkt, die in einem Uhrgläschen freiwilliger Verdampfung ausgesetzt, auch nach einiger Zeit in, dem Bittersalz ähnlichen, Krystallen anschoß, und auch durch einen demselben ähnlichen Geschmack sich als schwefelsaure Bittererde verrieth, welche aufs Neue im Wasser aufgelöst, durch kohlensaures Kali zersetzt, einen Niederschlag gab, welcher nach dem Auswaschen, Sammeln und Glühen  $\frac{3}{4}$  Gran Bittererde betrug; so daß demnach  $2\frac{1}{4}$  Gran für Kalk zu berechnen sind, wenn man die übrige Substanz dafür ansieht.

## D.

100 Gran des höchst fein gepulverten Andalusits wurden mit der dreifachen Menge kohlensauren Baryts und 15 Gran reiner Kohle innig gemengt und das Gemenge in einem Platintiegel fest eingedrückt einer einstündigen starken Rothglühhitze ausgesetzt. Beim Erkalten des Tiegels fand sich die Masse von den Wänden ab so innig in einen Klumpen zusammengezogen, daß die ganze Masse beim Umstürzen des Tiegels vollkommen herausfiel. Sie wurde jetzt durch

## 122 Brandes Analyse des Andalusits

Wasser und Salpetersäure aufgelöst, darauf durch Aetzammoniak und hernach durch kohlenstoffsaures Ammoniak von allen erdigen Substanzen getrennt, die rückständige Flüssigkeit in einem Platintiegel bei gelinder Wärme bis zur Trookne abgeraucht, und darauf der Tiegel einer zur gänzlichen Verflüchtigung des Ammoniaksalzes hinreichenden Hitze ausgesetzt. Der gebliebene Rückstand verhielt sich wie kohlenstoffsaures Kali, krystallisirte mit Schwefelsäure in der bekannten Form und betrug 4 Gran, wofür ich zwei Gran Kali in Rechnung bringe.

### E.

100 Gran des gepulverten Minerals wurden eine halbe Stunde lang in einem hessischen Schmelztiegel erhitzt; nach dem Erkalten hatte der etwas röthlich gefärbte Rückstand noch nicht völlig einen Gran verloren, ein Verlust, der wohl nur in Wasser bestehen konnte.

### IV.

#### R e s u l t a t e.

1) 100 Theile des Tyroler Andalusits	enthalten:
<i>Kieselerde</i> (A) - - -	34,000
<i>Alaunerde</i> (A. B $13\frac{1}{2}$ + $42\frac{1}{2}$ ) -	55,750
<i>Eisenoxyd</i> (B) - - -	3,375
<i>Manganoxyd</i> (B) - - -	0,625
<i>Kali</i> (D) - - - -	2,000
<i>Kalk</i> (G) - - - -	2,125
<i>Bittererde</i> (C) - - -	0,375
<i>Wasser</i> (E) - - -	1,000
	<hr/>
	99,250.

2) Es ergibt sich, daß auch dieser Andalusit, wenn wir die Kiesel- und Alaunerde als dessen wesentliche Bestandtheile betrachten, mit den früher untersuchten in chemischer Hinsicht nahe übereinstimme, da sich hier von beiden Substanzen den früheren sehr ähnliche Verhältnisse finden.

3) Es muß demnach der Andalusit als eine basische Kieselsaure Alaunerde angesehen werden, in welcher, wenn wir entweder bloß auf die Kiesel- und Alaunerde sehen wollten, der Sauerstoff der Säure das  $1\frac{1}{2}$ fache von dem der Basis seyn würde; denn

34 Kieselerde enthalten	16,873 Sauerstoff
55,750 Alaunerde —	26,003 —

oder wenn wir die andern damit verbundenen Substanzen mit als wesentlich zu der Mischung rechnen wollen, zu denselben so viel Kieselerde gerechnet werden muß, daß die Alaunerde das Doppelte an Sauerstoff enthält von demjenigen, welchen der mit ihr verbundene Antheil Kieselerde besitzt.

4) Scheint der Erfolg in C dafür zu sprechen, daß die, auch von *Pfaff* so gründlich durchgearbeitete Scheidungsmethode des Kalks von der Bittererde dennoch mit einiger Vorsicht anzuwenden sey, daß man die saure Auflösung beider Körper nicht mit Ammoniak übersetze und möglichst schnell den durch sauerklee-saures Kali entstandenen Kalkniederschlag absondere, indem sich auch bald eine schwerlösliche Verbindung (wahrscheinlich aus Sauerklee-säure, Ammoniak und Bittererde bestehend) zu bilden scheint.

Vorzüglich wegen des sonderbaren Erfolges bei dieser Analyse in C fand ich es für zweckmäßig, die Un-

tersuchung nochmals zu wiederholen. Das Resultat dieser Wiederholung stimmte aber bis auf ganz unbedeutende Abweichungen mit dem der ersten Untersuchung überein: nur war die in A ausgeschiedene Kieselerde gleich anfangs reiner, indem Salzsäure derselben nur noch  $1\frac{1}{2}$  Gran Alaunerde entzog. Nach der Fällung der Alaunerde, des Eisen- und Manganoxides wurde die Flüssigkeit ebenfalls (wie in C) mit kohlensaurem Natron gefällt. Der entstandene Niederschlag betrug getrocknet 4 Gran, löste sich jetzt in Salzsäure bis auf eine geringe Spur von Kieselerde auf und Aetzammoniakflüssigkeit gab in dieser salzsauren Auflösung noch eine schwache Spur von Alaunerde zu erkennen. Die Flüssigkeit wurde wieder genau neutralisirt, mit einer Lösung von neutralem sauerklee-sauren Kali versetzt, wodurch ein feiner pulveriger Niederschlag, in welchem ich durchaus nichts krystallinisches wahrnehmen konnte, entstand. Die von dem Kalk getrennte Salzlösung wurde nun einige Zeit ruhig hingestellt, worauf sich bald an den Wänden des Glases sowohl, als am Boden desselben Salzrinden bildeten. Die Flüssigkeit gab mit kohlenstoffsaurem Kali einen weissen Niederschlag, dessen Basis sich wie die des ausgeschiedenen Salzes als *Bittererde* zu erkennen gab.

Was bei der ersten Untersuchung die plötzliche Ausscheidung der Krystalle bewirkte, ist mir noch nicht ganz deutlich geworden. So viel ist indess gewiss, daß wenn man reine salzsaure Bittererde in Wasser auflöst, derselben Ammoniak und sauerklee-saures Kali zusetzt, sich — oft erst nach 24 Stunden — ein krystallinischer Niederschlag sowohl am Boden, als an den Seitenwänden des Glases bildet, dessen nähere

Untersuchung zukünftigen Stunden der Musse aufgespart ist. — Die schöne prismatische Form dieses Salzes indefs, die ich bei der ersten Untersuchung des Andalusits erhielt, habe ich nie wieder gesehen. Wurden die aus der salzsauren Bittererdelösung obenerwähnten krystallinischen Niederschläge auf einem Filter gesammelt: so konnte man keine deutliche ausgezeichnete Form der Krystalle bemerken; das Ganze stellte vielmehr nur ein so zu sagen krystallinisches Pulver dar. Selbst nachdem ich ein Vierteljahr lang die Lösung des Bittererdesalzes mit Ammoniak und sauerklee-saurer Kalilösung in Berührung lies, konnte ich ausser jenen Salzrinden keine deutlich ausgebildeten Krystalle entdecken. Da ich nun bei der Wiederholung der Analyse des Andalusits keine andern Substanzen, als die in den Resultaten der ersten Untersuchung angegebenen finden konnte; so muß ich fast schliessen, daß bei derselben vielleicht quantitative Verhältnisse der reagirenden Körper mit einander in Berührung waren, die jene Krystallbildung veranlassten, deren günstiges Zusammentreffen mir nächher niemals wieder gelang.

## 2.

## Untersuchung des Bucholzits,

*eines neuen Minerals.*

## I.

Im Monat März dieses Jahrs erhielt ich auch dieses Mineral vom Herrn Professor *Weiss*, unter dem Namen Faserquarz. Die Untersuchung desselben wünschte ich um so lieber vorzunehmen, als mir damals

noch keine Analyse des Faserquarzes bekannt war, und ich so die Lücke in der chemischen Kenntniss dieses Minerals auszufüllen hofft. *Werner* hatte bekanntlich diese Art des Quarzes, die sich in den Amethystgängen bei Wiesenbad, auch bei Hartmannsdorf und lagerweise in dem Alaunschiefer des Voigtlandes findet, festgestellt (man vergleiche *Steffens* Oryctognosie). Unser Mineral findet sich zwar an einem andern Fundorte, in Tyrol, indess stimmen die äussern Kennzeichen desselben, wie sich unten ergeben wird, sehr nahe mit der Diagnose des Faserquarzes überein; so dass es leicht möglich ist, unser Mineral mit demselben für identisch zu halten. Dass es aber vom Faserquarze in chemischer Hinsicht ganz verschieden ist, wird aus den folgenden Untersuchungen aufs bestimmteste erhellen.

## II.

*Äussere Kennzeichen.*

**Farbe.** Die Farbe unsers Minerals ist weiss und schwarz in manchfaltiger Mischung beider; stellenweise fast ganz weiss durch alle Mischungen mit schwarz, denen oft ein Stich ins Bläuliche sich angesellt, hindurch bis ins Samtschwarze. Der eigentliche Faserquarz ist vielmehr violblau in mannichfachen Abstufungen, gelblich- und milchweiss.

**Glans.** Auf den ganz schwarzen und rein weissen Stellen am deutlichsten, indess auch hier nur wenig glänzend, mehr Wachs- und Perlmutterglanz als Glasglanz.

*Bruch.* Der Hauptbruch ist fasrig, am ausgezeichnetsten an den schwärzeren Stellen, bei den mehr grauen und weissen ist die fasrige Textur oft nur schwer erkennbar; dagegen scheint hier besonders auf dem Querbruch ein mehr muschlicher Bruch sich zu zeigen; auch ist da, wo diese Farben sich zeigen, eine deutliche Anlage zum blättrigen Bruche nicht zu verkennen, dessen Blätterdurchgänge denen des Feldspaths analog zu seyn scheinen. Die *Bruchstücke* erscheinen keilförmig, scharfkantig und unbestimmt eckig.

*Durchsichtigkeit.* In dünnen Stücken, besonders in den weissen Bruchstücken schwach durchscheinend.

*Härte.* Das Glas ritzend, vom Quarz geritzt werdend.

### III.

#### *A n a l y s e.*

##### A.

50 Gran des feingepulverten Minerals wurden in einem hessischen Schmelztiegel eine halbe Stunde lang roth geglühet. Das nach dem Erkalten des Tiegels wiedergewogene Steinpulver zeigte keinen Gewichtsverlust, so daß die Abwesenheit wässriger Theile sowohl, als auch überhaupt durch Hitze verflüchtigungsfähiger Stoffe dadurch aufs deutlichste hervorging.

##### B.

50 Gran des im Chalcedonmörser zum feinsten

Stäube zerriebenen Minerals wurden in einem Platintiegel mit sechs Drachmen concentrirter Aetzkalilauge bis zur Trockne des Gemenges erhitzt, der Tiegel darauf mit Kohlen umhüllt und das Ganze noch drei Viertelstunden lang geglüht, die trockne Masse in destillirtem Wasser aufgeweicht, alles aufs sorgfältigste in eine Porcellanschale gespült, im Sandbade erwärmt und mit Salzsäure im Ueberschuß versetzt. Die jetzt vollkommen klar und hell erscheinende Auflösung wurde zur möglichsten Trockne abgedampft, die zerriebene Salzmasse in ein geräumiges Glas gegeben und noch einige Stunden mit salzsaurem Wasser digerirt; nach Ablagerung des unlöslichen Rückstandes die Flüssigkeit hell abgegossen und ersterer noch zweimal mit hinlänglicher Menge reinen Wassers ausgewaschen, auf einem 14 Gran schweren Filter gesammelt, getrocknet und gewogen und jetzt 34 Gran schwer gefunden. Durch halbstündiges Rothglühen sank die Gewichtsmenge dieser Substanz noch bis auf 28 Gran herab. Ohngeachtet dieser Stoff vorher mit salzsaurem Wasser noch digerirt war, so versuchte ich doch noch ihn ferner auf seine Reinheit zu prüfen, zumahl da derselbe auch etwas gefärbt erschien, und der Platintiegel sich etwas angegriffen zeigte. Er wurde daher zweimal, jedesmal mit zwei Drachmen Salzsäure ausgekocht und durch möglichste Trennung der sauren Flüssigkeiten vom ungelösten Rückstande durch Uebersättigung der ersteren mit Aetzammoniak, Sammeln des ausgewaschenen voluminösen Niederschlages auf einem  $8\frac{1}{2}$  Gran schweren Filter 5 Gran reiner geglüheter *Alaunerde* erhalten. Der unaufgelöste Rückstand wurde mit Aetzkalilauge behandelt, worin er sich bis auf  $\frac{1}{2}$  Gran, der sich wie Platinoxid verhielt, auf-



löste, sich übrigens als reine *Kieselerde* ergab und demnach mit  $22\frac{1}{2}$  Gran zu berechnen ist. Das Platin-oxyd konnte nur vom Tiegel herrühren, wie auch der angegriffene Zustand desselben zeigte.

## C.

Die salzsauren Flüssigkeiten aus B gaben mit Aetzammoniak übersättigt einen reichlichen voluminösen Niederschlag, der mehrmals mit destillirtem Wasser ausgewaschen, noch feucht in siedende Aetzkallilauge getragen wurde, in welcher er sich bis auf  $1\frac{1}{2}$  Gran Eisenoxyd vollkommen auflöste. In Salzsäure löste sich letzteres ohne Chlorinentbindung auf, und verhielt sich überhaupt wie reines Eisenoxyd, wofür ich  $1\frac{1}{2}$  Gran *Eisenoxydul* rechne. Die alkalische Flüssigkeit wurde hierauf mit Salzsäure und dann mit Aetzammoniak versetzt, wodurch nach vollständigem Auslaugen, Trocknen und Glühen des Niederschlages  $21\frac{1}{2}$  Gran *Alaunerde* erhalten wurden.

## D.

Die von der eisenoxydhaltigen Alaunerde in C getrennte ammoniakalische Flüssigkeit zeigte sich bei ihrer ferneren Prüfung ganz frei von noch andern erdigen Stoffen.

Der Erfolg in B hinsichtlich des Angegriffenseyn des Platintiegels bewog mich die Untersuchung zur völligen Gewißheit eines sicheren Resultats noch einmal zu wiederholen, und diesmal einen Silbertiegel zur Aufschließung des Minerals anzuwenden, welche auch mit derselben Menge der Materialien wie in B glücklich erfolgte, ohne daß sich der Silbertiegel an-

## 330 Brandes Analyse des Andalusits

gegriffen zeigte. Das Resultat dieser Untersuchung, zu welcher mehr dunklere Stücken des Minerals genommen wurden, stimmte aber mit dem der ersten Analyse sehr nahe überein, da ich diesesmal 25½ *Kieselerde*, 2 *Eisenoxydul* und 24 *Alaunerde* erhielt; so daß das oben erhaltene Platinoxid nur vom Tiegel selbst herzuläßen war.

### E.

Zur ferneren Untersuchung, ob das Angreifen des Platintiegels vielleicht von einem kleinen Antheile Lithion herrühre; und überhaupt, um das Mineral auf einen Gehalt an alkalischen Stoffen zu prüfen, wurden 50 Gran des feinen Steinpulvers mit 150 Gran salpetersauren Baryts innigst gemengt und mehrere Stunden einer heftigen Glühhitze ausgesetzt, der Rückstand mit destillirtem Wasser übergossen (letzteres bräunte das Curcumapapier sogleich), in Salzsäure aufgelöst, zuerst mit Aetzammoniak- und darauf mit kohlenstoffsaurer Ammoniaklösung gefällt, die von den Niederschlägen abfiltrirten Flüssigkeiten im Platintiegel abgeraucht, die Ammoniaksalze verjagt, der geringe in Fluß gerathene Rückstand nach dem Erkalten des Tiegels in Wasser gelöst und nach Verdunstung der Lösung in einem Porcellanschälchen 1½ Gran schwer gefunden. Der Platintiegel zeigte sich nicht angegriffen. Sowohl salpetersaures Silberoxyd, als salzsaure Platinlösung bewirkten in der rein salzig-schmeckenden Salzlösung Niederschläge. Für das erhaltene Salz bringe ich ½ Gran reines Kali in Rechnung.

## IV.

*Resultate.*

- 1) Nach den in obiger Analyse erhaltenen Bestandtheilen unseres Minerals glaube ich nicht zu irren, oder wenigstens der Wahrheit sehr nahe zu kommen, wenn ich die Mengen seiner Bestandtheile in 100 Theilen folgendermaassen annehme:

<i>Kieselerde</i>	46,00
<i>Alaunerde</i>	50,00
<i>Eisenoxydul</i>	2,50
<i>Kali</i>	1,50

---

 100.

- 2) Schon nach der verschiedenen und mannichfachen Modification der schwarzen Farbe unsers Minerals läßt sich schliessen, daß das Eisenoxydul ein sehr veränderlicher Mischungstheil desselben seyn müsse, und obgleich dasselbe dieses Mineral stets begleiten mag, doch nicht eigentlich zu seiner chemischen Mischung gehöre.

- 3) Möchte es der Natur dieser Verbindung am angemessensten seyn, sie als eine neutrale kiesel-saure Alaunerde mit einem Antheile kiesel-sauren Kali anzusehen, wie die Verhältnisse der stöchiometrischen Werthe der Bestandtheile und auch eben so ihre Sauerstoffmengen eine solche Ansicht rechtfertigen. Nämlich

46 Kieselerde	enthalten	22,8344	Sauerstoff
50 Alaunerde	—	23,0700	—
1,5 Kali	—	0,0255	—

(22,8344 ist nahe = 23,0700 + 0,0255 = 23,0955)  
 der Unterschied der Sauerstoffmengen zwischen  
 derjenigen des die Rolle des säuernden Körpers

### 13a Brandes Analyse des Andalusits

hier vertretenen Stoffe und derjenigen, welche die Basen enthalten, würde sich auch hier noch mehr der völligen Gleichheit nähern, wenn es erlaubt wäre, auch das Kali, als einen nur zufälligen Gemengtheil zu betrachten.

- 4) Ergiebt sich auf das bestimmteste, daß dieses Mineral keinesweges zum Faserquarze zu zählen sey, obschon es in seinen äusseren Verhältnissen demselben sehr nahe steht. Da nun nach der im diesem Jahre bekannt gewordenen Untersuchung des wirklichen Faserquarzes von Hartmannsdorf durch Herrn Zellner in Plafz (*Gilbert's Annales* 1818. B. 29. S. 182) die Bestandtheile dieses Minerals, welches nach jener Analyse

98,75 *Kieselerde*

0,75 *Eisenoxyd*

0,25 *Wasser*

enthält, aufs deutlichste dargethan sind; so wird es auch leicht, die gänzliche Verschiedenheit jenes wahren Faserquarzes von unserm Minerale auch in der chemischen Constitution anzuerkennen.

- 5) Sehen wir die Zusammensetzung der Alaunerdesilikat enthaltenden Mineralien durch, so finden wir, daß überhaupt bei wenigen so zu sagen neutrale Verhältnisse der Kiesel- und Alaunerde, wie bei unserm Minerale vorkommen. Sie finden sich im Lasursteine, nach der Untersuchung von *Clement* und *Desormes* (*Annales de chem.* 1806) in demselben enthält derselbe 23,2 Natron und auch *Klaproth* (*Beiträge* I. S. 196.) giebt ganz andere Verhältnisse an. Näher gränzt es an den *Pinit* und namentlich an den französischen an, welcher nach *Drappier* (*Journal d. min.* 100. 311.) 42 Alaunerde

und 46 Kieselerde mit 2,5 Eisenoxyd enthält, in-  
deß durch Glühen 7 Prozent Gewichtsverlust erlei-  
det. Noch übereinstimmender in chemischer Hin-  
sicht ist unser Mineral mit dem von *Vauquelin*  
untersuchten Nephelin (Bullet. d. scienc. de la Soc.  
philomat. an V. p. 12), welcher aus 46 Kieselerde,  
49 Alaunerde, 2 Kalk und 1 Eisenoxyd zusamen-  
gesetzt ist. Dieselben Verhältnisse der Kiesel- und  
Alaunerde, wie in unserem Minerale; dagegen im  
Naphalin Kalk, der in letzterem gänzlich fehlt.  
Indeß zeigt der Nephelin in seinen übrigen Eigen-  
schaften (*Hausmanns Mineralogie* S. 552) große  
Abweichungen. Er findet sich nämlich krystalli-  
sirt und eingesprengt, ist vor dem Löthrohre (ob-  
wohl schwer) zum Glase zu schmelzen; unser Mi-  
neral aber zeigt in diesem Falle keine Spuren von  
Schmelzbarkeit; bei den Farben des Nephelins fin-  
det sich immer Grün eingemischt; letzterer ritzt  
das Glas nur sehr schwach, unser Mineral hinge-  
gen ritzt dasselbe stark, ohne dabei eine Spur  
von Pulver seiner eigenen Substanzen zu hinter-  
lassen; so daß es demnach gar nicht mit demsel-  
ben verwechselt werden kann. Zu ähnlichen Schlüs-  
sen liefs mich die Vergleichung unsers Minerals  
mit noch andern gelangen, die demselben in che-  
mischer Hinsicht ähnlich zu seyn scheinen; so daß  
ich mich demnach berechtigt glaube, dieses Mi-  
neral als eine neue Art von Alaunerdesilikat auf-  
zustellen. Daß auch schon mehrere Mineralogen  
auf die Eigenthümlichkeit dieses Minerals aufmerk-  
sam gewesen, beweist mir ein kürzlich erhaltener  
Brief meines Freundes *Kesferstein* aus Halle, wor-  
in ich folgendes über diesen Gegenstand fand,

### 134 Brandes Analyse des Andalus. u. Bucholz

„Dafs das fasrige Fossil von Kaltigel in Tyr kein Quarz sey, war mir stets wahrscheinlich doch habe ich noch keine vollkommen charakteristische Suite desselben gesehen, um mineralogisch darüber urtheilen zu können, an den unvollkommeneren Stücken, welche ich besitze, schien es mir als gehöre dieses Fossil zum Feldspath, welches durch die plastische Tendenz des Glimmers oder dessen Einmischung eine Art von fasriger Textur erhalten hätte.“

Ich glaube, dafs dieses alles hinreichen wird meine Meinung über dieses Mineral zu rechtfertigen. Zur Ehre meines verehrten Lehrers und Freundes *Bucholz* habe ich dasselbe mit dem Namen *Bucholz* belegt. Die dankbare Wissenschaft wird es billigen also einen geringen Theil der Schuld, mit welcher sie dem Vollendeten verfallen, abzutragen.

---

Abhandlung  
über die  
Elektricität  
der Mineralkörper  
von  
H a u y.

(Aus den Annales de Chimie et de Physique T. VIII. 1818.  
S. 389. übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der physika-  
lischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen, und  
revidirt v. H.)

~~~~~

U nter allen Untersuchungen, die zur Entwicklung der mineralogischen Wissenschaft beitragen, und wovon die einen zum Zweck haben, sie mit neuen That- sachen zu bereichern, die andern ihr Gebiet dadurch zu erweitern, daß sie uns noch unbekannté Naturpro- ducte kennen lehren, giebt es keine interessanteren, als diejenigen, deren Resultate einzelne Zweige der mineralogischen Forschung mehr hervorheben und be- leuchten, während sie zu gleicher Zeit in das Ganze der Wissenschaft jene Strenge und Genauigkeit brin- gen, die weit mehr als alle zur Erweiterung ihres Ge-

biets beitragende Beobachtungen den Maasstab ihres Fortschreitens zur Vollkommenheit darbieten können. Ein Mineralog, welcher kräftig dazu mitwirken will, der Wissenschaft eine so vortheilhafte Richtung zu geben, darf nichts vernachlässigen, was eine schärfere und tiefere Kenntnisa der unorganischen Körper, ihrer Eigenthümlichkeiten und gegenseitigen Verhältnisse verschaffen kann. Er soll sie nach allen Seiten, die sie darbieten, erforschen, vergleichungsweise die Erscheinungen bis ins Einzelne verfolgen, um so die feinsten Unterschiede aufzufinden und die geheimsten Aehnlichkeiten zu enthüllen; er soll sich besonders bemühen, aus dem Innern der Wesen selbst die merkwürdigen Thatsachen über ihre Natur herauszuheben und die Merkmale zu bestimmen, die vorzüglich geeignet dieselben zu erkennen unter den veränderlichen Aeusserlichkeiten, welche sie auf so vielfache Art verhüllen und uns so oft in Gefahr setzen, sie zu verkennen. Solche Charaktere, weit entfernt eine Last für die Methode, welche sich damit befaßt, zu seyn, fügen neue Züge hinzu und geben unserm Bilde von dem Mineralreich mehr Ausdruck und Farbe.

Vorstehende Betrachtungen erzeugten in mir seit langer Zeit die Idee, in den Mineralien die Eigenschaft vermittelst des Reibens elektrische Zustände anzunehmen, aufmerksamer in Beziehung auf ihre innere Constitution zu untersuchen, da Verschiedenheiten hierin die Mittel der Unterscheidung zwischen den Arten zu vermehren geeignet sind. Ich habe geglaubt, das es nicht unwichtig seyn werde, bei einer jeden Art durch directe und genaue Versuche, die Natur der ihr eigenthümlichen Elektrizität zu bestimmen.

Der 3te Theil der Annales du Muséum d'Histoire



naturelle (pag. 309 u. f.) enthält einen ersten Versuch dieser Art, in welchem ich mich beschränkt, eine Liste von 23 metallischen Substanzen mit der einfachen Anzeige ihres elektrischen Charakters darzulegen. Ich habe nun von neuem denselben Gegenstand unter einem allgemeinem Gesichtspunkt vorgenommen, indem ich mich mit allen Arten unorganischer Körper befaßte; und meine Beobachtungen, die anfangs isolirt da zu stehen schienen, haben sich bei der Zusammenstellung merkwürdigen Gesetzen unterwürfig gezeigt, denen gemäß schon vor dem Versuch das Resultat desselben in der äussern Beschaffenheit (*facies*) des Minerals zu lesen ist.

Vielfache und vergleichende Versuche haben mir in den verschiedenen Arten, in welchen sich die Glas- und Harzelektricität mit Leitungs- und Isolirungs-Vermögen eint, vier verschiedene Abtheilungen gezeigt, nach welchen man die Gesammtheit der Mineralien in eben so viel unterschiedene und dermassen umgrenzte Klassen abtheilen kann, daß der einer jeden eigenthümliche elektrische Charakter sich an physische, allen dazu gehörigen Arten gemeinschaftliche Eigenschaften anschließt. Zufolge dieses Zusammenhangs und der Natur dieser, sich zugleich auf das Verhalten der Körper gegen das Licht beziehenden, Eigenschaften selbst nähert sich die Eintheilung, wovon es sich hier handelt, großentheils der sonst von den Mineralogen angenommenen methodischen Ordnung. Man wird wohl nicht ohne Interesse in diesem unerwarteten Verhältnisse zwischen den Phänomenen des Lichts und der Elektricität eine Bestimmtheit wahrnehmen und einen sinnigen Zusammenhang der Wirkungen, welcher zwischen den Ursachen selbst ein noch unbekanntes Band

anzukündigen, oder wenigstens einen engeren Zusammenhang und neue Aehnlichkeiten in den Substanzen, wo sich dergleichen Uebereinstimmungen zeigen, zu verrathen scheint.

Die zuletzt genannten Eigenschaften zeigen sich nicht constant bei allen Individuen einer und derselben Art und man muß daher erwarten, einer ähnlichen Abweichung bei den Resultaten der Versuche über den elektrischen Charakter zu begegnen. Die Durchsichtigkeit, um ein Beispiel anzuführen, eine der nothwendigen Bedingungen zur Entwicklung der Glaselektricität, deren Vereinigung mit der isolirenden Kraft den eigenthümlichen Charakter der Arten in der ersten Klasse bestimmt, findet sich in dem kohlen-sauren Kalk; genannt Isländischer Doppelspath; aber sie verschwindet ganz in dem, welchen ich *saccharoïde* (Statuenmarmor) nenne und in der dichten Varietät. In Fällen dieser Art vermindert sich die isolirende Kraft stufenweise, je weiter sich die Substanz von ihrem Zustand der Vollendung entfernt und wird zuletzt Null. Die Glaselektricität durchläuft eine ähnliche Stufenfolge und jenseits einer gewissen Grenze macht sie der Harzelektricität Platz.

Bei dem elektrischen Charakter ist es hinsichtlich der Veränderungen, welchen er in einer und derselben Mineralienart unterworfen, wie bei allen andern Merkmalen, welche nicht allein von dem Wesen der Grundtheile, sondern auch von der verschiedenen Art ihrer Zusammenhäufung abhängen, und worauf Veränderungen, durch zufällige Einmischung hervorgebracht, vorzüglichen Einfluß haben. Die specifische Schwere und die Härte zeigen auf dieselbe Weise größere oder kleinere Verschiedenheiten, nach den besondern Ursa-

den, welche die Textur der Substanzen verdichten oder ausdehnen konnten. Es ist bekannt, wie die Farben auch so flüchtig und betrügerisch sind, und welches Schwanken die Gegenwart fremder Stoffe in den Resultaten der Analyse hervorbringen kann. Die primitive Form bleibt allein unveränderlich unter den zahlreichen Modifikationen, welche die sie begleitenden Eigenthümlichkeiten erleiden, und ihre Wichtigkeit wird durch den Mangel der Beständigkeit der andern Charaktere noch gröfser. Diese, um entscheidend, um wirklich specifisch zu werden, müssen sich innerhalb gewisser Schranken halten, welche durch den wahren Typus der Species, oder der Substanz in ihrem höchsten Zustand, der Reinheit bestimmt werden. Man kann also nur dann hoffen die Bestimmung des elektrischen Charakters genau zu erhalten, wenn man durch eine schickliche Wahl der zum Versuche geeigneten Stücke, die Ursachen der Abweichung, welche bei den Individuen vorkommen, entfernt oder ihnen, wo sie nur äusserlich sind und die innere Natur des Minerals nicht betreffen, abhilft.

Zwei Hauptursachen tragen zu den Veränderungen des Charakters, wovon hier die Rede, vorzüglich bei. Die eine ist der Wechsel dieser physischen Eigenschaften selbst, deren Zusammenhang mit den elektrischen Eigenschaften wir bemerkt haben, wie z. B. die Schwächung der Durchsichtigkeit, die so oft getrübt wird, sey es nun durch die Zumischung einer heterogenen, in die Substanz zufällig aufgenommenen Materie, oder durch eine Verschiebung der Struktur, welche ein trübes Ansehen veranlafst. Die andere Ursache beruht auf der Textur der Oberflächen, auf dem Verlust der Politur, welche allein hinreicht dem Kör-

per die isolirende Kraft, wenn er damit begabt ist, zu entziehen, und die Harzelektricität vermittelst des Reibens hervorzubringen. Man kann dieser abhelfen, indem man die Rauheit vermindert und die Politur wieder herstellt, wenn nämlich das Innere des Körpers sonst keine Veränderung erlitten hat. So werden Quarz und Topas, welche im Zustand heller Krystalle Nichtleiter sind und Glaselektricität zeigen, zu Leitern und erhalten Harzelektricität, wenn ihre Gestalt abgerundet und ihre Oberfläche matt und rauh ist; aber diese abgerollten Fragmente nehmen, wenn man ihnen nach und nach Politur giebt, stufenweise die Zwischenzustände, durch welche sie gegangen waren, wieder an und erlangen zuletzt ihre primitiven Beschaffenheiten unter den Händen des Steinschleifers in aller Vollkommenheit wieder.

Um die auf den elektrischen Charakter sich beziehenden Versuche zu machen, isolire ich, wenn es nothwendig ist, das Stück, welches ich prüfen will, indem ich es mit gewöhnlichem Wachs an das Ende einer Gummilak- oder Siegellakstange befestige; hernach nehme ich diese Stange, reibe mehrmals das Fragment auf einem wollenen Stoff oder auf Tuch, und bringe es abwechselnd an zwei bewegliche Nadeln, deren eine positiv, die andere negativ elektrisirt ist. Diese äußerst einfachen Apparate, von denen ich im Einzelnen die Beschreibung und den Gebrauch in dem *Traité des caractères physiques des pierres précieuses* \*) gegeben habe, bestehen daseine in einem klei-

---

\*) Wir haben von dieser für ein größeres als das blos mineralogische Publicum geschriebenen Abhandlung eine schön-

nen Splitter von isländischem Doppelspath an einem Seidenfaden frei aufgehangen, und das andere in einer Siegellakstange mit einer Stahlspitze versehen, worauf eine Kupfer- oder Silbernadel sich befindet.

Man braucht das Stückchen Doppelspath nur einmal zwischen zwei Fingern zu drücken, so wird es schon eine sehr empfindliche Glaselektricität zeigen. Der Metallnadel ertheilt man die Harzelektricität durch eine Siegellakstange oder ein Stückchen Bernstein, welche man gerieben hat. Wenn trockene Witterung ist, so kann man, zu größerer Einförmigkeit statt des Doppelspaths einen dem zweiten ähnlichen Apparat anwenden, aus einem geschnittenen Glasstreifen verfertigt, welchen man mehreremal zwischen den Fingern reibt. Dieß wird selbst bei feuchter Witterung gelingen, wenn man nur vor der Anwendung den Glasstreifen einen Augenblick lang an's Feuer bringt.

So zarte Versuche erfordern von Seite desjenigen, welcher sie anstellt, eine ausgezeichnete und anhaltende Aufmerksamkeit, an welche ihr Erfolg geknüpft ist. Ich glaube, daß man mir Dank wissen wird, wenn ich hier die nützlichen oder schlechterdings nothwendigen Vorsichtsmaafsregeln angebe, um ein wahres Resultat zu erlangen. Es ist zuweilen nothwendig die Körper an verschiedenen Stellen mit dem wollenen Stoffe oder dem Tuche zu reiben, wenn sie, ohngeachtet ihrer Isolirung, nicht leicht elektrisch werden. Man muß auch die Repulsion der Attraction

---

ne Bearbeitung in deutscher Sprache durch Herrn Geheimenrath von *Leonhard* erhalten, Leipzig 1818.

*Der Uebers.*

vorziehen, um die Art der Elektrizität, welche das Mineral hat, zu bestimmen; denn es könnte seyn, daß einer der Körper, welchen man den oben beschriebenen Apparaten nähert, gar keine Elektrizität hätte, oder daß er anfangs zwar sie angenommen hat, sie aber nachgehends wieder verlor, und in seinen natürlichen Zustand zurückkehrte; und wenn er dann Attraction äussert, könnte man daraus folgern zu dürfen glauben, daß die Substanz die entgegengesetzte Elektrizität des Apparats besitze. Um sich vor dieser Täuschung zu hüten, muß man damit beginnen, den Körper an die nicht isolirte Nadel zu bringen: wenn sich Attraction zeigt, wird man gewiß seyn, daß er im elektrischen Zustande ist; und wenn er hernach die elektrisirte Nadel anzieht, so wird diese zweite Wirkung eine derselben entgegengesetzte Elektrizität anzeigen. Was die Repulsion anlangt, so ist diese so gleich entscheidend, daß die Elektrizität des Minerals die gleichnamige mit der des Apparats sey. Aber man muß den Zeitpunkt ergreifen, ehe sie wieder in Attraction übergehen kann zu Folge der Wirkung, welche die Nadel auf das natürliche Fluidum des dem Versuch ausgesetzten Körpers äussert.

Manchmal ist diese Wirkung stark genug, um augenblicklich den elektrischen Zustand, welchen das Reiben erzeugt, aufzuheben; so daß man nicht die leiseste Anzeige von Repulsion gewahr wird, wie dieses bei einigen Substanzen der ersten Klasse, welche nur eine schwache Elektrizität annehmen, vorkam. Ich habe mir für diesen Fall einen kleinen Apparat von einer ausserordentlichen Empfindlichkeit erdacht und dieser besteht blos in einem an das Ende eines dünnen Cylinders von Siegellak oder Gummilak befestigten

Katzenhaare. Dieses Haar nimmt die Glaselektricität an, wenn man es durchzieht zwischen den Fingern, und es ist hinreichend, ihm ein mit sehr kleiner Quantität von Fluidum begabtes Mineral anzunähern, um es im Augenblick nach einer oder der andern Richtung sich bewegen zu sehen, je nachdem der Körper die eine oder die andere Elektricität besitzt.

Ich will nun die Tafel meiner Resultate darlegen, gemäß der vorhin besprochenen Eintheilung, und Beobachtungen anreihen über die Arten von Mineralien, die irgend eine merkwürdige Eigenthümlichkeit zeigen.

Mineralogische Tafel aus dem Gesichtspunkte der durch Reiben hervorgebrachten Elektricität entworfen.

## E r s t e K l a s s e.

Körper, die in ihrem vollkommensten Zustande durchsichtig und farbenlos sind. Ihre Farbe, wenn sie vorhanden ist, hängt von einem zufälligen Princip ab. Sie sind Nichtleiter und erlangen durchs Reiben Glaselektricität.

### E r s t e O r d n u n g.

*Schon durch Wärme elektrische.*

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Beracit.                          | Mesotyp,                          |
| Topas (Silice fluatée aluminuse.) | Prehnit.                          |
| Axinit.                           | Galmei (Zinc oxyde).              |
| Turmalin.                         | Titanit (Titane silicéocalcaire). |

## Zweite Ordnung.

Durch Wärme nicht elektrische.

## A. Mit einer Säure verbundene.

|                                                                                    |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Doppelspath (Chaux carbonatée en-rhomboides primitifs).                            | Schwerspath (Witherit).<br>Cölestin (Strontiane sulfatée).              |
| Blättriger Bitterspath (Chaux carbonatée magnésifère, laminaire du Saint-Gothard). | Strontianit (Strontiane carbonatée).<br>Bittersalz (Magnésie sulfatée). |
| Arragonit.                                                                         | Datholith (Chaux boratée siliceuse).                                    |
| Spargelstein (Chaux phosphatée. Variété jaune verdâtre d'Espagne).                 | Salpeter (Potasse nitratée).                                            |
| Flusspath.                                                                         | Schwefelsaures Kali (Potasse sulfatée).                                 |
| Frauenis.                                                                          | Hochsalsz (Soude muriatée).                                             |
| Anhydrit (Chaux anhydrosulfatée, laminaire de Bex en Suisse).                      | Glaubersalsz (Glaubérite).                                              |

## B. Erdige.

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bergkrystall. (Quarz-hyalin). | Essonit (Éssonite).<br>Vesuvian (Idocrase).                                   |
| Zirkon.                       | Feldspath.                                                                    |
| Saphir (Corindon-hyalin).     | Ichthyophthalm (Apophyllit).                                                  |
| Chrysoberil (Cymophane).      | Hornblende (Amphibole, variétés, dites <i>actinote</i> et <i>trémolite</i> ). |
| Spinell.                      | asbestartiger Strahlstein.                                                    |
| Schmaragd.                    |                                                                               |
| Euklas.                       |                                                                               |
| Dichroit.                     |                                                                               |
| Granat.                       | Augit (Pyroxène, variété)                                                     |



aus Piemont; die *diop-* Nephelin.  
*side*). Cyanit (Disthène).  
 Epidot. Glimmer.  
 Blätterzeolith (Stilbitz). Chiasolith (Macle).  
 Analzim.

C. Brennbare.

Diamant.

D. Metallische.

Weißes Bleierz (Plomb-carbonat Kohlensaures Zink (Zinc  
 bonaté). carbonaté)  
 Bleivitriol (Plomb sulfaté). Zinnstein (Etain oxydé).  
 Tungstein (Schéelin cal-  
 caire).

Die folgenden Gattungen wurden bloß der Ana-  
 logie gemäß hierher gesetzt.

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Kohlensaure Talkerde (Mag-<br>nesie carbonatée). | Wernerit.<br>Paranthin. |
| Borax.                                           | Diallage.               |
| Salmiak.                                         | Anthophyllith.          |
| Alaun.                                           | Lomonit.                |
| Kryolith (Alumine fluatée<br>alcaline).          | Sodalit.<br>Schabasit.  |
| Wavellit.                                        | Kreuzstein (Harmotome). |
| Triphan.                                         | Pinit.                  |
| Petalit.                                         | Schmelzstein (Dipyre).  |
| Staurolith.                                      | Asbest.                 |
| Hypersthen.                                      |                         |

A n h a n g

Substanzen, deren eigenthümlicher Charakter die  
*Journ. f. Chem. u. Phys. 25. Bd. 1. Hest.* 10

## 248 Haug über die Elektrizität

Harzelektrizität ist, bei einer sich fettig anfühlenden Oberfläche; sie sind wie alle die Arten der ersten Klasse Nichtleiter, soferne sie durchsichtig und ungefärbt sind \*).

Gemeiner Talk — blättriger Bildstein? (Talc glauque?)  
Talk (Talc laminaire). que?)

Erdiger Talk? (Talc granuleux?)

## Zweite Klasse.

Körper mit einer eignen, von ihrer Natur unabhängigen Farbe begabt, welche in jedem Zustande worin sie sich befinden, Nichtleiter sind und durch Reibung negativ elektrisch werden; den Anthrazit allein muß man isoliren, um ihn elektrisch zu machen \*\*).

Schwefel.

Erdpech (Bitume),

a) zähes (glutineux),

b) erdiges (solide),

c) elastisches,

d) schlackiges (sublimant).

Retinasphalt.

Bernstein,

Honigstein.

Anthracit.

---

\*) S. die angehängten Bemerkungen;

\*\*\*) In diese Tafel wurde nicht der Gagat (Jayet) aufgenommen, der so sichtbar Spuren seines vegetabilischen Ursprungs trägt und eben so wenig die Steinkohle, welche mehr in die Geologie als streng genommen in die Mineralogie zu gehören scheinen.

## Dritte Klasse.

Ihrer Natur nach undurchsichtige Körper von Metallglanz oder fähig ihn durch Politur anzunehmen, Leiter der Elektrizität, welche aber isolirt gerieben zum Theile Glas - zum Theile Harzelektrizität annehmen \*).

### Erste Ordnung.

#### *Positiv elektrische.*

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Reines Silber.    | Reines Zink.                                         |
| Gediegen Silber.  | Messing.                                             |
| Geprägtes Silber. | Gediegen Wismuth.                                    |
| Reines Blei.      | Natürlich Amalgam. (Silberamalgam, Mercure argenté). |
| Reines Kupfer.    |                                                      |
| Gediegen Kupfer.  |                                                      |
| Geprägtes Kupfer. |                                                      |

### Zweite Ordnung.

#### *Negativ elektrische.*

#### A. Von natürlichem Metallglanz.

##### 1) *Einfache Arten.*

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Reine Platina.    | Reines Gold.    |
| Gediegen Platina. | Gediegen Gold.  |
| Palladium.        | Geprägtes Gold. |

\*) In diese Klasse wurden die vorzüglichsten Metalle zusammengefaßt, sowohl durch Läuterung in reinem Zustand dargestellt, als in mannigfaltigen Mischungen zu technischen Zwecken geeignet.

## 148 Handb. über die Elektrizität

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Reiner Nickel.           | Gediegen Arsenik.         |
| Gediegen Eisen.          | Reines Antimonium.        |
| Geschmiedetes Eisen.     | Gediegen Antimonium.      |
| Reines Zinn.             | Nagigerz (Tellure arseno- |
| Zinnamalgame zu Spiegel- | plombifere).              |
| belegen.                 |                           |

### 2) Legirung zweier Metalls.

Spiefsglanzsilber (Argent Arsenikkies (Fer arsenical).

Kupfernickel (Nickel arsenical).

### 3) Metalloxyde.

Oxydulirtes Eisen (Fer oxydulé) erz (Manganèse oxyde metalloïde).

Strahliges Graubraunstein-

### 4) Metalle mit einem verbrennlichen Stoff verbunden.

Glaserz (Argent sulfuré). Gemeiner Schwefelkies (Fer Bleiglanz (Plomb sulfuré). sulfuré commun).

Kupferkies (Cuivre pyriteux). Fer sulfuré blanc

Fahlerz (Cuivre gris \*). Magnetischer Eisenkies (Fer sulfuré magnétique).

Kupferglanz (Cuivre sulfuré). Zinnkies (Etain sulfuré).

Graphit (Fer carburé). Wismuthglanz (Bismuth sulfuré).

\*) Es ist wahrscheinlich, (dass diese Art nichts anders ist, als Kupferkies vermischt mit Arsenik und Spiefsglanz.

Manganglanz (Manganese Wasserblei (Molybdene sulfuré).  
sulfuré). (Molybdene sulfuré).

Grau Spiefsglanzerz (Antimoine sulfuré).

5) *Metalle mit einer Säure verbunden.*

Chrom Eisenstein (Fer chromaté).

**B. Von einem zum metallischen hinziehenden Glanze, den sie auch durch Politur annehmen.**

Rotheisenstein (Fer oxydé). Columbeisen (Tantale oxyde).  
Schwarzer Erdkobalt (Cobalt oxydé).

bald oxyde noir). Ytrotantal (Tantale oxyde

Uranpfecherz (Urane oxyttifere).  
dulé). Schwarzes Ceriumoxyd (Cé-

Wolfram (Schéelin ferrum oxyde noir).  
giné).

Lievrit (Fer siliceo-calcaire, yénite \*).

**V i e r t e   K l a s s e .**

Körper von einer eigenthümlichen, von ihrer Natur unabhängigen Farbe, durchsichtig in ihrem vollkommensten Zustande. Die isolirende Eigenschaft be-

---

\*) Der Jenit [Leipsig] wurde aus dem ähnlichen Grund hieher gesetzt, aus welchem in das Titan-Geschlecht die Art kam, die den Beinamen der kieselkalkigen (siliceo-calcaire) führt.

## 150 Harry über die Electricität

hauptsächlich auf die Varietäten, welche sich diesen Zustände nähern.

### Erste Ordnung

Fähig durch Reflexion metallischen Glanz zu zeigen, und durch Reflexion sowohl als Refraction eine mehr oder minder lebhaft<sup>er</sup> Farbe. Der Unterschied hängt von der Politur der Oberfläche ab \*). Alle nehmen Harzelectricität durch Reiben an.

#### Weiße Farbe bei durchgehendem Lichte:

Rothgültigerz (Argent an-Eisenglanz (Fer oligiste),  
Zinnblei (Zinc sulfuré), Rauchgelb (Arsenic sulfuré),  
Zinnober (Mercur sulfuré), Zinn (Zinc).

Emire Londale, Werners Rutil (Titane oxyde).

Rothkupfererz, und Zinnober.

#### Blaue Farbe bei durchgehendem Lichte:

Oktaëdrit (Titane anatase).

### Zweite Ordnung

Ohne metallischen Glanz. Fast alle bekommen durch Reibung Harzelectricität \*).

Quecksilberhonorerz (Mer-Braun- und grün-Bleierz  
(Mercur miriaté), Plomb phosphaté).

Roth-Bleierz, (Plomb chro-Gelb-Bleierz (Plomb molybdaté).

\*) S. d. folgenden Anmerkungen.

\*\*) Aufser dem Malachit, der öfters isolirend ist, und Glass-  
electricität zeigt.

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Malachit (Cuivre carbonaté vert.)     | Fer phosphaté, <i>Werner's</i><br>Rasen-Eisenstein, Eisen- |
| Kupferlasur (Cuivre carbonaté bleu).  | Pecherz, blaue und grüne Eisenerde.                        |
| Olivenerz (Cuivre arsenié).           | Würfelerz (Fer arsenié).<br>Eisenvitriol (Fer sulfaté).    |
| Kupferschmaragd (Cuivre dióptase).    | Blende (Zinc sulfuré).<br>Rother Erdkobalt (Cobalt)        |
| Phosphorkupfererz (Cuivre phosphaté). | arsenié).                                                  |
| Kupferhydrat (Cuivre hydraté).        | Uranglimmer (Uran oxydé).                                  |
| Kupfervitriol (Cuivre sulfaté).       |                                                            |

*Arten, deren Klassification zweifelhaft ist.*

Weiß Spießglanzerz (Antimoine oxide blanc).  
Cerium oxidé rouge.

### Anmerkungen über die verschiedenen Klassen.

#### *E r s t e K l a s s e .*

Ich habe schon gelegentlich angemerkt, daß der elektrische Charakter, auf welchen diese Klasse gegründet ist, sich nicht auf alle Varietäten einer und derselben Substanz erstreckt. Der Uebergang zur Harzelektricität findet nach Verschiedenheit der Arten mehr oder weniger schnell Statt. Bei der des Cyanits (Disthène) hält er sich, so zu sagen, nur an einzelne Nüancen; so daß von zwei Krystallen, welche Nichtleiter sind und nur einen kleinen Unterschied in der

Politur zeigen, das eine die Glas- das andere die Harzelektrizität annimmt. Ich habe selbst diese elektrische Verschiedenheit an den entgegengesetzten Seiten eines Krystals aus meiner Sammlung beobachtet und ich kann mir dieses besondere Resultat nicht anders als durch eine gewisse Abänderung in der Textur einer der Oberflächen erklären. Bei dem kohlsauren Kalk zeigt sich an Stücken, deren Durchsichtigkeit durch eine weißliche Wolke getrübt ist, das Isolationsvermögen und die Glaselektrizität zwar noch, aber um vieles schwächer. Ein Stück carrarischer Marmor, welches sich als ein Leiter zeigte, nahm auf seiner ebenen und glatten Fläche gerieben Glaselektrizität an, aber Harzelektrizität, bei Reibung der rauhen und unebenen Stellen. Ein dichtes Stück derselben Substanz, in Gestalt einer Platte geschnitten, deren große Flächen eine ziemlich schöne Politur erhalten hatten, nahm auf beiden Seiten Harzelektrizität an.

Wenn der Uebergang zur Harzelektrizität nur durch den Verlust der Politur veranlaßt ist, wie bei gewöhnlich durchsichtigen Körpern, die dann matt und abgerieben wurden, so ist bald das Isolationsvermögen an den abgeriebenen Stellen noch vorhanden, bald erscheinen das Leitungsvermögen und die Harzelektrizität zu gleicher Zeit. So giebt ein abgeriebener und durchscheinender Topas, selbst unisolirt zwischen den Fingern gehalten, vermittelst des Reibens, Zeichen von Harzelektrizität, während ein abgeriebener Bergkrystall, der noch durchsichtiger als der Topas ist, isolirt gerieben werden muß, um elektrisch zu werden.

Beim Durchlesen des Verzeichnisses der Arten in der ersten Klasse konnte man schon bemerken, daß



darin alle durch Wärme zu elektrisirenden Mineralien vorkommen. Es ist erfreulich zu sehen, wie auch von dieser Seite die Vergleichungspunkte unter den Stoffen, welche sich in elektrischer Beziehung schon so ähnlich sind, noch vermehrt werden, weßwegen die Betrachtung der durch diese Naturkraft veranlafsten Phänomene uns noch wichtiger erscheinen muß.

Der Versuch mit dem Galmei (Zinc oxidé) fordert eine besondere Aufmerksamkeit, weil dieses Mineral schon durch die Wirkung der gemeinen Temperatur elektrisch ist, und man also das aus dieser Wirkung hervorgehende Resultat nicht mit dem, welches durch das Reiben bewirkt wird, verwechseln darf. Um alle Zweideutigkeit zu vermeiden und diese letztere Wirkung einzeln zu erhalten, wählte ich ein prismatisches Stück, welches die bekannten Eigenschaften hatte, nämlich an seinen Enden die zwei entgegengesetzten Elektricitäten zu zeigen, während der mittlere Theil in seinem natürlichen Zustand ist. Dieser letztere gerieben, gab Zeichen von Glaselektricität.

Ich habe zu Ende der ersten Klasse eine gewisse Anzahl von Arten aufgeführt, deren Zusammenstellung mit den andern nur durch Analogie angezeigt wurde. Aber diese Analogie ist so stark, daß es mir nicht zweifelhaft vorkommt, daß diese Körper, sobald man sie in ihrem vollkommensten Bildungszustande auffinden wird, auf diese Klasse sich beziehende Eigenschaften zeigen werden. Diese Erwartung ist selbst während meiner Arbeit bei mehreren Arten gerechtfertigt worden, welche, nachdem sie einige Zeit diesen Versuchen sich nicht fügen wollten, sich endlich den Gesetzen derselben unterwarfen, als sie mir in ihrer größten Reinheit vorkamen.

Dieser Theil der Tabelle schließt sich mit einem Anhang, in welchem mehrere Substanzen aufgeführt sind, welche Aehnlichkeit mit den vorhergehenden haben, sich aber dadurch unterscheiden, daß ihre Oberfläche sich fettig anfühlt, worauf ohne Zweifel die Veränderung des elektrischen Charakters beruht. Man kann in der Folge, wenn ihre Anzahl sich vermehrt, eine besondere Unterabtheilung aus ihnen bilden, aber ich habe geglaubt damit noch zurückhalten zu müssen, bis weitere Entdeckungen diese neue Klassification nothwendig machen.

### Zweite Klasse.

Sie ist merkwürdig durch die Beständigkeit und Allgemeinheit der Charaktere, wodurch sie bestimmt wird und welche sich auf Varietäten erstrecken, in denen man die isolirende Eigenschaft durchaus nicht vermuthet hätte. Ich will nur z. B. das elastische Bergharz von *Derbshire* anführen, welches ohngeachtet seiner Biagsamkeit und Weichheit sich auf eine sehr bemerkbare Art durch Reiben elektrisirt, selbst dann, wenn man es zwischen den Fingern hält.

### Dritte Klasse.

Unter den Körpern dieser Klasse, welche durch Reiben Harzelektricität erhalten, zeichnet sich der größte Theil von Schwefelverbindungen, wie die mit Silber, Kupfer, Blei u. s. w. durch die Stärke dieser Eigenschaft aus. Es scheint, daß diese Kraftäusserung von dem Schwefel herrühre, welcher hier die ihm eigenthümliche Wirkung mit derjenigen der ihm beigemischten Metalle vereinigt.

*Vierte Klasse.*

Die Körper der ersten Ordnung wie das Rothgültigerz (Argent antimonie sulfuré) und der Zinnober (Mercure sulfuré) verdienen Aufmerksamkeit durch die doppelte Eigenschaft, welche sie zeigen können, bald metallischen Glanz durch Reflexion darzubieten, bald durch Reflexion und Refraction eine mehr oder minder lebhaftere Farbe, so daß man nach Willkühr die eine oder die andre Eigenschaft durch Abänderung der Politur der Oberfläche hervorbringen kann. Wenn sie von einer großen Lebhaftigkeit ist, so vereinigt der Körper den metallischen Glanz mit der Undurchsichtigkeit. Je nachdem die Politur schwächer ist, wird der Körper fähig, unter verschiedenen Gesichtspunkten denselben Glanz, nur schwächer, darzubieten, und eine meist rothe Farbe, welche durch Reflexion und Refraction zugleich Statt findet, und wenn endlich die Politur bis auf einen gewissen Punkt vermindert wurde, zeigt sich die rothe Farbe allein. Diese eben erwähnte Variation ist in dem Eisenglanz (Fer oligiste) sehr auffallend.

Der metallische Glanz hat gewöhnlich einen bläulichen Schimmer. Da die rothe Farbe \*) die ergänzende der blauen ist, so ist die besagte Wirkung von der Art derjenigen, welche verschiedene Körper hervorbringen, die fähig sind zwei einander ergänzende Farben durch Brechung und Spiegelung zu zeigen. Es bietet sich hier auch eine Analogie mit den Phänomenen der farbigen Ringe dar.

---

\*) Eigentlich die gelbrothe, wie diese aber in der That der Zinnober zeigt. *Anmerk. d. Uebers.*

Bei dem Rauschgelb (Arsenic sulfuré) tritt ein besonderer Fall ein. Die rothe Varietät, wie man sie in der Natur findet, ist gewöhnlich des metallischen Glanzes beraubt, aber man kann diesen Glanz durch's Feilen der Oberfläche hervorbringen. Bei der gelben Varietät, deren Identität mit der vorhergehenden mir erwiesen zu seyn scheint \*), nähert sich der Glanz des Bruches dem metallischen \*\*) und da übrigens ihr Unterschied von der andern nur zufällig ist, so würde die daraus hervorgehende Ausnahme den wesentlichen Charakter, welchen die rothe Varietät zeigt, nicht beeinträchtigen.

Ich habe angenommen, daß die eigentliche bei durchgehendem Lichte wahrnehmbare Farbe des Oktaedrits (Titane anatase) die blaue sey, und in der That haben die alten Mineralogen den Körper, wovon hier die Rede ist, *blauen Schörl* \*\*\*) genannt.

### N o t e

*über die elektrische Eigenschaft einiger Mineralien von Hauy.*

(Aus den Annales de Chimie et de Physique B. I. S. 442.)

Hauy wurde durch die Wahrnehmung, daß die Krystalle und lamellenartige Bruchstücke des Galmei (Zink oxydé) die er nur sehr schwach erwärmte, eine

---

\*) S. Memoires du Museum d'Histoire naturelle, Tome XVI. S. 19 399.

\*\*) Jameson, System of Mineralogy, tome III, S. 534.

\*\*\*) De l'ale Cristallogr. tome II, p. 406.

merkliche Elektricität annahmen, auf die Vermuthung geleitet, daß die Temperaturerhebung vielleicht eine überflüssige Bedingung dabei seyn könnte, und daß vielleicht diese Art von Mineralkörpern sich ihrer Natur nach im elektrischen Zustand befinde. Er fand wirklich, daß der größte Theil derselben schon unmittelbar ohne Temperaturerhöhung auf die Nadel wirkt, welcher er sich bei dieser Art von Versuchen bedient, und die den Mineralogen bekannt ist \*). Haüy wollte wissen, ob diese Art der Erregbarkeit des Galmei sich noch in niederen Temperaturen erhalten werde und setzte daher am Morgen des 30ten Januars 1816 an sein Fenster ein Stückchen dieses Galmei, befestiget an einem kleinen hölzernen Staab, während die Temperatur eines an diesem Fenster hängenden Thermometers  $6^{\circ}$  unter Null zeigte; er liefs das Stückchen in dieser Lage so lang es nöthig war, um gleiche Temperatur mit der umgebenden Luft anzunehmen. Darauf brachte er es vor die Nadel, die merklich angezogen wurde.

Bei einigen dieser Körper leidet die Elektricität Unterbrechungen für einige Augenblicke. Aber öfters darf man, um sie wieder zu erwecken, den Körper nur von einem Zimmer in das andere tragen; öfters auch erfolgt die Rückkehr des elektrischen Zustandes von selbst an demselben Orte, einen Augenblick nachdem dessen Wirkungen aufgehört haben.

Andere Bruchstücke oder Krystalle, die nicht fä-

---

\*) Diese Nadel muß sehr beweglich seyn für den Fall, wovon hier die Rede ist, weil der Galmei nur eine schwache elektrische Kraft hat.

„An dem metallenen Deckel eines cylindrischen  
 „Glases von  $2\frac{1}{4}$  par. Zollen Durchmesser und  $3\frac{1}{4}$  Zol-  
 „len Höhe sind zwei kleine trockene elektrische Sä-  
 „ulen so angeschraubt, dafs die eine mit dem positiven,  
 „die andere mit dem negativen Pol diesen Deckel be-  
 „rührt. Jede Säule besteht aus 400 Scheibchen von  
 „zusammengeleimtem Gold- und Silberpapier, die drei  
 „Linien Durchmesser haben, und in gefirnisste Glas-  
 „röhren geschichtet sind. Unten sind die Säulen mit  
 „etwas vorstehenden abgerundeten messingenen Fas-  
 „sungen versehen, die mit den Scheibchen in leiten-  
 „der Verbindung sind. Wenn der Deckel aufgesetzt  
 „ist; so laufen die Säulen mit der Oberfläche des Gla-  
 „ses parallel in einem Abstand von einigen Linien  
 „herab bis nahe an den Boden des Glases, von wel-  
 „chem ihre messingenen Fassungen  $\frac{1}{4}$  Zoll noch ab-  
 „stehen. Die Axen der Säulen stehen um 1 Zoll 7  
 „Lin. von einander ab, können aber auch einander  
 „noch näher gebracht werden. Durch den Mittelpunkt  
 „des Deckels geht eine innen und aussen gefirnisste  
 „gläserne Röhre, und durch diese ein Messingdraht,  
 „welcher mittelst eines Korks in der Mitte der Röhre  
 „befestigt ist, und sie des besseren Isolirens wegen  
 „sonst nirgends berührt. An dem unteren Ende des  
 „Drahts hängt ein  $2\frac{1}{2}$  Zolle langes und 3 Lin. breites  
 „Goldblättchen genau in der Mitte zwischen den zwei  
 „Säulen und mit ihren Axen parallel, vorausgesetzt  
 „dafs das Glas selbst gerade stehe. An dem oberen  
 „Ende des Drahts befindet sich eine kleine messingene  
 „Kugel, auf welche, wie bei dem Voltaischen Elekt-  
 „rometer, eine der Platten eines Condensators aufge-  
 „schraubt werden kann. Bei dieser Einrichtung sind  
 „also die zwei elektrischen Säulen, welche *Behrens* aus-

„serhalb des Glases angebracht hatte, welches das  
„Goldblättchen gegen die Bewegung der Luft schützt,  
„innerhalb dieses Glases angebracht, wodurch sie nicht  
„allein in ihrer Lage mehr gesichert, sondern auch  
„gegen Feuchtigkeit, Staub u. d. gl. verwahrt sind,  
„so daß sie beständig ungefähr gleich stark elektrisch  
„bleiben.

„Dieses Elektrometer wird auf folgende Art ge-  
„braucht. Der metallene Deckel wird durch einen  
„Draht mit der Erde verbunden, und durch eine Be-  
„rührung des Knopfs des Drahts, an welchem das Gold-  
„blättchen hängt, mit einem guten Leiter die etwa  
„vorhandene freie Elektricität desselben abgeleitet.  
„Ich bemerke hiebei, daß bei trockener Haut die  
„Berührung mit dem Finger nicht hinreichend ist.  
„Da das Goldblättchen in der Mitte zwischen den un-  
„ten an den Säulen angebrachten metallenen Fassun-  
„gen hängt, von welchen die eine positiv, die an-  
„dere eben so stark negativ elektrisch ist; so wird es  
„beiderseits gleich stark angezogen werden, und da-  
„her in der Mitte zwischen den Säulen mit ihren  
„Axen parallel hängen bleiben. So wie aber demsel-  
„ben mittelst des Drahts, an welchem es hängt, eine  
„nur sehr schwache Elektricität mitgetheilt wird; so  
„wird es von demjenigen Pol, welcher eine der mit-  
„getheilten entgegengesetzte Elektricität hat, angezo-  
„gen und von dem anderen abgestoßen, und es wird  
„leicht mit dem ersteren in Berührung kommen, hier-  
„auf abgestoßen und von dem anderen Pol angezo-  
„gen werden. Diese oscillirende Bewegung dauert so  
„lange fort, bis sich das Goldblättchen an eine der  
„Säulen anhängt, von welcher es leicht durch ablei-

tende Berührung seines Drats und eine kleine Erschütterung des Instruments losgemacht werden kann. Um nun die Art der Elektrizität beurtheilen zu können, sind die an dem Deckel des Instruments anliegenden Pole mit ihren zugehörigen Zeichen + und — bezeichnet. Die zu untersuchende Elektrizität wird also mit derjenigen einerlei seyn, welche das Zeichen derjenigen Säule anzeigt, deren unterem Ende sich das Goldblättchen zuerst nähert, oder welche bei stärkerer Elektrizität von dem Goldblättchen zuerst berührt wird.

Sowohl starke als schwache Elektrizitäten können mittelst dieses Elektrometers mit gleicher Bequemlichkeit untersucht werden. Im ersten Fall nähert man den elektrisirten Körper langsam der Kugel des Elektrometers, bis man deutlich die Annäherung des Goldblättchens an eine der zwei Säulen bemerkt. Wenn man z. B. eine geriebene Siegellakstange der Kugel bis auf ungefähr 3 Fufs genähert hat, so wird man schon eine Annäherung des Goldblättchens an diejenige Säule bemerken, welche oben mit — bezeichnet ist. Bei fernerer Annäherung wird es zum Anschlagen kommen, und es könnte leicht zerrissen werden, wenn man die Siegellakstange noch mehr der Kugel nähern wollte. Im zweiten Fall wird der elektrisirte Körper nach und nach der Kugel viel näher, vielleicht mit ihr in Berührung gebracht werden müssen, bis das Goldblättchen sich bewegt. Die Elektrizität wird alsdann so schwach seyn, daß sie mittelst des gewöhnlichen *Bennet'schen* Elektrometers nicht mehr wird bemerkt werden können. Ist die Elektrizität sehr schwach, so wendet man den mit dem Instrument verbundenen Condensator an.



Diejenige Platte, welche auf die Kugel des Elektrometers aufgeschraubt wird, vertritt die Stelle des sogenannten Deckels des Condensators, die andere, welche mit einem gläsernen Handgriff versehen ist, und auf die erstere gelegt wird, die Stelle der *Basis*. Die Platten sind auf denjenigen Seiten, mit welchen sie auf einander liegen, mit einer dünnen Schichte von Bernsteinfirnis überzogen. Will man nun eine sehr schwache Elektricität untersuchen, so berührt man zuerst die untere Fläche der aufgeschraubten Platte oder den an sie angeschraubten mit einem Knopf versehenen Drat ableitend, setzt die zweite Platte darauf, und berührt die untere Platte oder ihren Drat mit dem Körper, dessen Elektricität man untersuchen will, indem man zu gleicher Zeit die obere Platte ableitend berührt. Man hebe diese Verbindungen auf, nehme die obere Platte mittelst ihres gläsernen Handgriffs weg, und gebe darauf Achtung, welcher Säule sich das Goldblättchen zuerst nähert; so wird das dieser Säule beigesetzte Zeichen die Art der Elektricität angeben. Bringt man z. B. ein kleines Zinkscheibchen von ungefähr  $\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser mit der unteren Fläche der unteren Platte des Condensators in Berührung, indem man es mit dem Finger andrückt, ohne zugleich die untere Platte des Condensators unmittelbar zu berühren, berührt zu gleicher Zeit die obere Platte des Condensators ableitend, hebt diese Verbindung wieder auf, und nimmt das Zinkscheibchen weg, so wird nach abgehobener oberer Platte das Goldblättchen sich deutlich der mit — bezeichneten Säule nähern. Dasselbe wird man beobachten, wenn man ein Stückchen gewöhnliches Silberpapier mit der versilberten Seite auflegt.

„Man kann auch, was in manchen Fällen bequemer ist, den zu untersuchenden Körper mit der oberen Platte in Berührung bringen, indem man die untere Platte ableitend berührt, und übrigens wie vorhin verfährt. Die Elektrizität, welche das Instrument anzeigt, wird aber jetzt derjenigen entgegengesetzt seyn, welche man der oberen Platte mitgetheilt hatte, weil bei dieser Behandlung die mit dem Instrument verbundene Platte die Basis des Condensators ausmacht.

„Wenn der Körper, dessen Elektrizität man untersuchen will, nicht bequem mit der untern Platte des Condensators unmittelbar in Berührung gebracht werden kann, so macht man die Verbindung zwischen beiden mittelst eines mit einem isolirenden Handgriff versehenen Drats, und verfährt übrigens wie vorhin.

„Hr. Universitäts-Mechanikus *Buzengeiger* verfertigt dieses Elektrometer sehr gut, ohne Condensator für 7 Gulden, sammt Condensator für 9 Gulden.“

Ich legte auf ein solches vom Herrn Mechanikus *Buzenberger* verfertigtes Elektrometer ein großes Stück Doppelspath und drückte darauf mit einigen Fingern. Bei diesem Drucke zeigte das Elektrometer *negative* Elektrizität; aber sobald ich den Finger hinwegzog, sprang das Goldblatt auf die entgegengesetzte positive Seite über. Besonders wenn man den Doppelspath gegen die Rante der aufgeschraubten Metallplatte drückt, wird am leichtesten jene negative Elektrizität wahrgenommen werden, während, wenn der Druck (wobei der Doppelspath auch blos an den Seiten gehalten werden kann) rasch aufgehoben wird, unfehlbar jederzeit Glaselektrizität wahrzunehmen ist.

Man würde sich indess sehr täuschen, wenn man den Satz so aussprechen wollte: *der Doppelspath werde durch den Druck negativ und durch Aufhebung des Druckes positiv elektrisch.* Vielmehr geht daraus hervor, was auch schon *Hauy* angedeutet hat, daß diese Elektricität durch Druck im Grund als eine durch Reibung erregte zu betrachten und also denselben Gesetzen unterworfen sey. Daher wird der drückende (und darum zugleich reibende) Körper die entgegengesetzte Elektricität von dem gedrückten (geriebenen) zeigen. In unserm Fall ist der Rand der Elektrometerplatte der drückende Körper, der also negativ elektrisch wird, während der unisoliert gehaltene (mit den Händen angedrückte) Doppelspath die positive Elektricität annimmt, welche sich auch sogleich zeigt, sobald die Leitung, durch rasches Hinwegziehen der Hand, entfernt wird.

Man kann den eben beschriebenen Versuch auch dadurch näher beleuchten, daß man ihn, zur Controlle, mit einem andern Elektrometer anstellt, welches gleichfalls geeignet unmittelbar die Art der Elektricität anzuzeigen und das ich nun beschreiben will.

Es folgt aus den anerkanntesten elektrischen Grundsätzen, daß bei einer geladenen Franklinischen Tafel die kleinste Veränderung in dem elektrischen Zustande der einen Seite eine entsprechende im elektrischen Zustande der andern zur Folge habe. Eben darum ist eine kleine runde Franklinische Tafel von etwa 1 — 2 Zoll im Durchmesser als Deckel des bekannten Bennetschen Elektrometers, statt der sonst gewöhnlichen Metallplatte, brauchbar. Die Goldblättchen sind an dem untern Beleg angebracht, oder stellen dieses untere Belege selbst vor. Nur wird hier

die Ladung dieser Goldblättchen mit Elektrizität nicht durch Mittheilung, sondern lediglich durch Vertheilung möglich seyn, indem man nämlich z. B. mit einer geriebenen Siegellackstange das obere Beleg berührt, diese aber in demselben Augenblicke zurückzieht, wo die Goldblättchen zum Anschlagen kommen. Unmittelbar darauf berührt man auch das obere Beleg, um aus diesem alle freie Elektrizität zu entfernen. Die Goldblättchen divergiren nun mit positiver Elektrizität und bleiben, unter günstigen Umständen, sehr lang auf demselben Grade der Divergenz. Ja selbst feuchte Witterung scheint auf dieses Elektrometer weniger Einfluß, als auf andere zu haben.

Divergiren die Goldblätter positiv, so wird natürlich ein positiv elektrisirter Körper dem äussern Beleg der als Elektrometerdeckel dienenden Fräncklin'schen Tafel genähert, die Divergenz vermehren, während ein negativ elektrisirter sie vermindert.

Ich gebrauche solche Elektrometer schon seit einigen Jahren; und wie sie leichter zu construiren sind, als das vorhin von *Bohnenberger* beschriebene, so scheinen sie mir dasselbe noch an Empfindlichkeit zu übertreffen.

Uebrigens darf ich nicht unerwähnt lassen, daß schon früher mein Freund Herr Doctor *Seebeck* sich eines auf ähnliche Art construirten Elektrometers bediente, welches in Beziehung auf die Leichtigkeit, womit es zu rechtfertigen, noch Verzüge vor dem eben beschriebenen hat. Bekanntlich werden, gemäß der ursprünglichen Einrichtung des *Bennet'schen* Elektrometers, die Goldblättchen an einem keilförmig zugeschnittenen Holze befestigt und der Vortheil, welchen dieser Halbleiter gewährt, um die Goldblättchen

länger in Divergenz zu erhalten, ist leicht einzusehen. *Seebeck* befestiget nun dieses keilförmig geschnittene Holz am Elektrometerdeckel vermittelst Siegellack, und elektrisirt dann durch Vertheilung. In der That ist die Wirkungsart dieses äusserst empfindlichen Elektrometers ganz so zu erklären, wie die des vorhin beschriebenen. Ja ich kann beifügen, dafs ich wirklich schon vor fünf bis sechs Jahren einmal diesen meinen gelehrten Freund, welchem die Naturwissenschaft schon so viel verdankt, mit Versuchen beschäftigt fand über die bei dem Doppelspath durch Druck entstehende Elektrizität. Ich musz solches der Wahrheit gemäß anführen, ohne dadurch dem Verdienste des berühmten französischen Naturforschers, welcher von diesen bis jetzt von *Seebeck* noch nicht publicirten Versuchen keine Kunde hatte, etwas entziehen zu wollen.

Unpassend kann es nicht seyn, hiebei auch an *Bartholin's* Versuche mit dem isländischen Kalkspath zu erinnern, wobei er will gefunden haben, dafs derselbe erwärmt leichte Körper anziehe \*). Wahrscheinlich war es nicht die blose Wärme, sondern der Druck mit der Hand, welcher *Bartholin's* Doppelspath elektrisch machte.

Wird dieser Doppelspath auf das Bennet'sche Elektrometer in der von *Seebeck* ihm gegebenen Gestalt so angehalten, dafs besonders die Kante der Metallplatte einen Druck auf ihn ausübt: so werden wahrscheinlich die Goldblättchen negativ afficirt werden. Jedoch bei einem Elektrometer, wo eine förmliche Franklinische Tafel als Elektrometerdeckel dient, kann unmöglich das Stanniolblättchen einen Druck auf den Doppelspath ausüben, wie man denselben auch mit

\*) s. *Philos. Transact.* B. V. vom Jahre 1670.

der Hand drücken mag und es ist daher keine Spur von negativer Elektricität wahrzunehmen. Demnach kann die Art ihrer Entstehung nicht mehr zweideutig seyn, und die Richtigkeit der vorhin gegebenen Erklärung bewährt sich hierdurch augenscheinlich. Im Augenblick aber, wo die Hand vom Doppelspathe weggezogen wird, wird die positive Divergenz der, auf die vorhin angegebene Art, durch Vertheilung geladenen Goldblättchen vermehrt,

Das Elektrometer, welches ich vorhin beschrieben habe, ist noch einer wesentlichen Vervollkommnung fähig, wovon bei anderer Gelegenheit die Rede seyn soll. Hier bemerke ich blos, daß es allerdings, eben so wie das von *Bohnenberger* beschriebene, auch bei Messung der Elektricität des Turmalins, so wie anderer durch Wärme elektrischer Körper, bequem zu benützen. Indefs ist zu Versuchen der Art immer die von *Havy* angewandte schwebende Nadel bequemer. Der einzige schlimme Umstand tritt dabei ein, daß es bei dem gewöhnlichen Verfahren diese Nadel zu elektrisiren, nicht möglich dieselbe anhaltend im gleichmäßig elektrischen Zustande zu erhalten. Man könnte auf die Idee kommen eine auf metallnem Stativ schwebende Nadel auf eine Zambonische Säule zu setzen. Kein Zweifel, daß sie die Elektricität des Pols, worauf sie gesetzt, annehmen werde; und da diese eine constante ist; so kann keine Vorrichtung zu Versuchen mit dem Turmalin, oder andern elektrischen Krystallen bequemer scheinen. Und dennoch möchten manche, welche den Versuch auf diese Art anstellen wollen, sich getäuscht finden. Denn bei den gewöhnlichen, nicht sehr starken Zambonischen Säulen wird man wohl deutliche Anziehung der Nadel, aber oft kaum eine Spur

von Abstofsung (welche fast einzig entscheidend bei dieser Art von Versuchen) wahrnehmen können, der Turmalin mag noch so gut elektrisch seyn. Eben so wenig ist dann eine Spur von Abstofsung wahrzunehmen, wenn man die Nadel z. B. auf den negativen Pol der Säule setzt und eine geriebene Siegellackstange auch noch so behutsam nähert, so deutlich auch die Anziehung der Nadel gegen unelektrische Körper sich darstellen mag. Und woher dieß? Offenbar daher, weil selbst die sogenannte trockene Säule als Leiter zu betrachten für die in ihr auftretende Elektrizität. Statt daß also die z. B. auf dem negativen Pol stehende Nadel zurückgestoßen wird, wird vielmehr durch Annäherung eines gleichnamig elektrischen Körpers die Elektrizität in die Säule zurückgedrängt, wenigstens zum Theil; und der noch übrig bleibende Theil ist bei schwachen Zambonischen Säulen zu klein, um durch seine Abstofsung ein Drehen auch einer sehr empfindlichen Nadel zu bewirken. Entweder ist also diese Nadel auf eine sehr kräftige Säule zu setzen, oder es sind sehr zarte durch Verbindung mit der Säule elektrisirte Fäden statt jener Haüy'schen Nadel anzuwenden.

Bekanntlich zeigt sich nicht dasselbe, wenn man statt der Zambonischen Säule, als Prüfungsmittel für Krystallelektrizität, einen erwärmten Turmalin als schwebende polarische Nadel anwendet, sondern Abstofsung und Anziehung erfolgen hier mit gleicher Leichtigkeit.

Werden der Turmalin und die Zambonische Säule als ihrem Wesen nach verwandt betrachtet, so mag solches wohl in so ferne gelten, als überhaupt alle Erscheinungen der Elektrizität und der Elektrochemie auf Krystallelektrizität zu beruhen scheinen, wofür ich vielfache Gründe, zerstreut an mehreren Stellen dieser Zeitschrift, angeführt habe.

Jäger aber (in *Gilberts Annalen der Phys.* B. 49. S. 66. und B. 55. S. 374) geht in seiner Vergleichung des Turmalins mit dieser sogenannten trockenen Säule \*) so weit, daß sogar die gewöhnliche Undurchsichtigkeit der Turmaline nach der Richtung der Axe als Beweis einer blätterartigen Schichtung betrachtet

\*) Ich habe B. 20. S. 96 d. J. noch einen Vergleichpunkt beigefügt, der, wenn es blos um Zusammenstellung zufälliger Aehnlichkeiten zu thun, nicht unwichtig scheinen kann, nämlich daß sich die Polarität der Säule umkehrt unter gewissen Bedingungen. Dafs die Abhandlung, welche ich hierüber schon vor anderthalb Jahren schrieb, bis jetzt noch nicht erschien, beruht auf von mir unabhängigen Zufälligkeiten, welche sich ja wohl selbst in wichtigere Dinge zuweilen störend einmischen. Uebrigens sind durch diese Verpöthung sonderbare Mißverständnisse veranlaßt worden. Weil ich nämlich zufällig, aber in ganz anderer Beziehung, auch Untersuchungen angestellt hatte, ob nicht ein Winkelverhältniß eben so bei dem Durchgange der Electricität durch Leiter, wie bei dem Licht, in Betrachtung komme: so gab dieß wohl dem Hrn. *Le Franc* Veranlassung noch weiter zu gehen, und er äußert nun geradezu im *Journ. de Physique*, man werde die Polarität gewisser elektrischer Combinationen umkehren können, wenn man blos ihre Richtung nach Ost oder West verändere, „avec le degré d'inclinaison le plus favorable à la polarisation de la lumière par transmission.“ Das Nöthige hat darauf schon *Cay-Lussac* in seinen trefflichen *Annales de Chemie et Physique* B. 6. S. 384. ihm geantwortet. Dafs Hr. *Le Franc* sich nicht sonderlich um die neuere physikalische Literatur bekümmert, geht daraus hervor, daß er in der Uebersetzung meiner obenerwähnten Notiz den von mir gebrauchten Ausdruck „*Becher-Apparat*“ nicht ersetzte: „l'appareil de Becher“ (wohl an den alten Chemiker *Becher* denkend) und dann nachher sogar, wo ich „*Voltaischer Bächerapparat*“ geschrieben hatte: „l'appareil Voltaïque de Becher.“



Theile nach Art einer Zambonischen Säule angeführt wird. „Dafs übrigens, fügt er in einer Note bei, die undurchsichtigen Theile nicht immer gleichförmig auf der ganzen Fläche der Queerdurchschnitte des Turmalins vertheilt sind; sehe ich an einem rundlich - dreiseitigen, rosenrothen Krystalle, in dessen Mitte gleichsam ein anderer grüner zu stecken scheint; nur dieser Kern ist in der Richtung der Axe undurchsichtig, und rings um ihn ist ein breiter Saum des rosenrothen Krystalls, der auch in der Richtung der Axe durchsichtig ist; in der Quere aber ist der ganze Krystall durchsichtig.“

Der Fall, dafs rosenrothe Turmaline nicht blos zum Theil („weil die undurchsichtigen Theile nicht gleichförmig vertheilt sind“) sondern ganz und gar durchsichtig sind in der Richtung der Axe, ist so gar selten nicht. Ich sah solche Turmaline mehrere in dem vortreflichen mineralogischen Cabinet unsers Landsmannes Herrn *Heuland* in London, dessen Gefälligkeit ich sehr zu rühmen habe. In *Hany's* Cabinet sah ich nicht blos einen nach jeder Richtung vollkommen durchsichtigen rosenrothen, sondern auch einen nach der Axe ganz so wie nach der Seite durchsichtigen grünen Turmelin, welcher dennoch vollkommen elektrisch war. Beide sowohl jener rosenrothe, als jener grüne Turmalin sind geschliffen. Ausserdem ist noch ein anderes perpendicular auf die Axe geschnittenes Stückchen elektrischen Turmalins vorhanden, welches gleichfalls nach der Axe vollkommen durchsichtig. Gewifs hängt also die Elektricität des Turmelins nicht von der Undurchsichtigkeit in der Richtung der Axe ab.

Uebrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit auch an die merkwürdige durch Kunst erzeugte, pola-

risch, vermittelt der Wärme, elektrische Substanz erinnern, welche ich im Cabinet jenes berühmten Naturforschers sah. Ich meine nämlich das Stückchen phosphorgesauerten Kalks, welches der jüngere *Saussure* erhielt bei Zersetzung des Gipses durch concrete Phosphorsäure im heftigen Schmelzfeuer. Seitdem hat niemand etwas ähnliches bemerkt und ich weiß auch nicht, ob jemand sich bemüht, diese merkwürdige Beobachtung am künstlichen phosphorgesäuerten Kalk zum Versuche zu erheben. Der natürliche phosphorsaure Kalk zeigt bekanntlich keine Spur von durch Wärme erregbarer Electricität. Das äussere Ansehen jener phosphorsauren Masse in *Hauy's* Cabinet, von der Grösse einer Haselnuss ohngefähr, zeigt übrigens keine Spur von Krystallisation und überhaupt nichts, wodurch man veranlaßt werden könnte, die Eigenschaft durch Wärme an zwei entgegengesetzten Punkten Glas- und Harzelectricität zu zeigen in ihm zu vermuthen. Um so mehr sollte man daher bei den durch Kunst erhaltenen chemischen Producten aufmerksam auf diese merkwürdige Eigenschaft seyn, da sich dieselbe höchst wahrscheinlich viel häufiger finden wird, als man bis jetzt zu glauben geneigt seyn möchte. Auf diesem Wege wär es vielleicht möglich über jene merkwürdige Krystallelectricität (ich gebrauche diesen Ausdruck allgemein, da diese Gattung von Electricität bekanntlich an gewisse Krystallformen, aber natürlich der Begriff der Krystallisation nicht an den äussern Umriss der Masse, welcher zufällig unregelmässig seyn kann, gebunden ist) genüendere Aufschlüsse zu erhalten; über jene Krystallelectricität, von welcher *Hauy* zum Schlusse seiner Physik eben so wahr als schön sagt:

„Man könnte fragen, ob mitten unter dem Reichthum unserer künstlichen Apparate und den mannigfachen Erscheinungen, welche sie dem erstaunten Auge darbieten, es etwas des Interesses der Physiker würdigeres giebt, als diese kleinen durch Krystallisation hervorgebrachten elektrischen Instrumente, als diese Vereinigung scharf hervortretender entgegengesetzter Wirkungen in einen einzigen Krystall zusammengedrängt, der kaum einige Linien dick ist; und auch hier begegnen wir der schon oft gemachten Bemerkung, daß diejenigen Naturerzeugnisse, welche am meisten unsern Blicken sich entziehen zu wollen scheinen, öfters diejenigen sind, die uns am meisten zu zeigen hätten.“

Ich kann nicht umhin, diesem ausgezeichneten Naturforscher (ausgezeichnet gleich sehr als Mensch und als Gelehrter) für die freundliche Aufnahme, die ich bei ihm fand, und die interessanten Stunden, die ich in seinem so belehrenden Umgange verlebte, bei dieser Gelegenheit öffentlich meinen Dank auszudrücken.

## A u s z u g

aus zwei kleinen Schriften.

- 1) *Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterreich; vom Dr. Carl Schenk.* gr. 8. 189 Seit. Baden, 1817.
- 2) *Charakteristik der Mineralquellen in physischer und medicinischer Hinsicht, und in Bezug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr. W. L. Köhreuter.* 12. 167 Seit. Pforzheim, 1818.

Vom

Dr. H o f f m a n n.

---

**D**a beide Werkchen nicht bloß für Naturforscher und Aerzte, sondern auch zur belehrenden Unterhaltung der Badgäste bestimmt sind, so eilen wir bei herannahendem Frühlinge das Publicum mit dem Inhalte derselben näher bekannt zu machen.

Nr. 1. zerfällt in neun Abschnitte, wovon die drei ersten von der Entstehung und dem Alterthum, der Topographie und der Geschichte der Stadt Baden, seiner Heilquellen und Umgebungen handeln. Der vierte und größte Abschnitt enthält die naturhistori-

sche und die von dem Verf. mit der größten Sorgfalt angestellte chemische Untersuchung der Badner Schwefelwasser. Sämmtliche Schwefelquellen, von denen eckszehn benutzt werden, gaben bei der chemischen Zergliederung dieselben Bestandtheile: alle haben denselben Geruch (wie faule Eier), Geschmack (etwas ätzig und unangenehm) und dieselbe specifische Schwere (bei 13° — 14° Reaumur auf 1004); allein sie unterscheiden sich vorzüglich in dem Wärmegrade, welcher von 25° bis 50° Reaumur steigt, und in der Klarheit, die jedoch bloß von der verschiedenen Bauart der Bäder abhängt.

Der Verf. liefert nun zuerst die Untersuchung der natürlichen Producte dieser Mineralwässer, und findet, daß die aus der Schwefelquelle häufig sich entwendende Luft aus Kohlensäure, Stickgas, Sauerstoff und geschwefeltem Wasserstoffgas bestehe. Die durch die Dünste des Bades erzeugte, von den Wänden herabtropfende Flüssigkeit enthält in 20 Kubikzollen:

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| a. in Wasser verdünnte Schwefelsäure | 21,35. |
| b. Bittererde                        | 3,00.  |
| c. Kalkerde                          | 3,25.  |
| d. Natron                            | 1,8.   |

was am Fußboden überall sich anlegende Salz- oder Badner Salz besteht aus:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| a. Schwefelsaurer Bittererde | 199,2 Gran. |
| b. Schwefelsaurer Kalkerde   | 10,4 —      |
| c. Schwefelsaures Natron     | 30,4 —      |
|                              | <hr/>       |
|                              | = 240 Gran  |

überall, wo die Badner Schwefelquellen unter oder ober der Erde längere Zeit durchfließen, setzen sie einen sogenannten Schwefel- oder Badschlamm ab. Ein Theil des unterirdischen Schlammes besteht aus:

## 176 Schenk über die Schwefelquellen

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| 1) Salzsaurer Kalkerde       | 11,00  | Gran |
| 2) Schwefelsaurem Natron     | 4,88   | —    |
| 3) Schwefelsaurer Bittererde | 3,72   | —    |
| 4) Kohlensäurer Kalkerde     | 2,68   | —    |
| 5) Kohlensäurer Bittererde   | 1,92   | —    |
| 6) Reinem Schwefel           | 215,80 | —    |

— 240 Gran

Die Bestandtheile der natürlichen Producte dieses Mineralwassers sind demnach: geschwefeltes Wasserstoffgas, Kohlensäure, schwefelsaures Natron, schwefelsäure Bittererde und salzsaure Kalkerde, während der kohlen saure Kalk, der schwefelsaure Kalk, die Bittererde, das Stickgas und das Sauerstoffgas nur als zugesetzte Theile, als *Producte*, angesehen werden müssen.

Das Schwefelwasser selbst aber zeigt bei der chemischen Zergliederung durch Gegenmittel und Destillation in 1000 Wiener H. Z. 26 Kubikzoll *luftförmige* und 500 Gran *fixe* oder *salzige Bestandtheile* nämlich:

|                                 |         |       |
|---------------------------------|---------|-------|
| 1) Geschwefeltes Wasserstoffgas | 16,5    | H. Z. |
| 2) Kohlensäures Gas             | 9,5     | —     |
|                                 | 26      | H. Z. |
| 3) Salzsäure Bittererde         | 57,470  | Gran  |
| 4) Salzsäures Natron            | 93,710  | —     |
| 5) Schwefelsäure Bittererde     | 68,39   | —     |
| 6) Schwefelsäure Kalkerde       | 169,295 | —     |
| 7) Kohlensäure Bittererde       | 46,000  | —     |
| 8) Kohlensäure Kalkerde         | 62,125  | —     |
| 9) Unauflösbare Erde            | 3,010   | —     |
|                                 | 500     | Gran  |

Der Verf. hat aber auf eine überzeugende Weise dargethan, daß diese Verbindungen erst durch die Kräfte

des angewandten Feuers entstanden und als wahre Producte der chemischen Analyse zu betrachten seyen; daß in den schwefelichten Mineralquellen zu Baden der Kalk mit der Salzsäure, als salzsaurer Kalk, neben der schwefelsauren Verbindung mit Natron und Bittererde, sich vereinigt befinde und daß daher die fixen Bestandtheile dieses Mineralwassers als wahre im natürlichen Zustande desselben enthaltene Educte bei 1000 R. Z. in folgenden Verhältnissen anzunehmen seyen:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1) Salzsaurer Kalkerde       | 157,575 Gran. |
| 2) Schwefelsaurer Bittererde | 150,860 —     |
| 3) Schwefelsaures Natron     | 100,450 —     |
| 4) Kohlensäurer Bittererde   | 46,000 —      |
| 5) Kohlensäurer Kalkerde     | 62,125 —      |
| 6) Unauflösbare Erde         | 3,000 —       |
|                              | <hr/>         |
|                              | 500 Gran.     |

Der fünfte Abschnitt enthält eine Beschreibung der einzelnen warmen Bäder von Baden und ihrer Quellen, und der sechste handelt von der Wirkung dieser Bäder. Ihre heilkräftigen Wirkungen sind nach dem Verf. vorzüglich dem mächtigen elektrochemischen Prozesse zuzuschreiben, welcher in diesem Wasser waltet. Die chemischen Potenzen desselben, vorzüglich das geschwefelte Wasserstoffgas und die Kohlensäure, fangen, wenn sie mit dem Badewasser an den Tag treten, durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft und ihres Wärmestoffes, als des wesentlichen Agens, sogleich an chemisch auf einander zu wirken, und regen somit auch in dem Badewasser hydrogalvanische Kräfte auf, welche auf den kranken menschlichen Organismus, der durch das Baden mit

denselben in Verbindung tritt, so heilsame Wirkung hervorzubringen vermögen.

Da die Badner Quellen in Nieder-Oesterreich gleich so wie sie zu Tage kommen, zum Bade gebraucht werden können, so müssen sie kräftiger wirken, als solche Schwefelquellen, welche wegen ihrer zu grossen Hitze zuvor erst abgekühlt, so wie auch als diejenigen, welche wegen zu geringer Wärme erwärmt werden müssen, indem durch beide Prozesse ihre elektrochemische Wirkungskraft bedeutend vermindert wird. — Siebenter Abschnitt: verschiedener Gebrauch der Badner Quellen. Aeusserlich als Bäd-Tausch- und Tropfbad, als Dunstbad; der Badeschlaufe als Umschlag; innerlich wird das Wasser entweder getrunken oder als Klystier angewandt. Der achte Abschnitt handelt von den Zufällen der Badenden und deren Heilmittel, und der neunte von der Diät beim Bade. Wir empfehlen dieses Werkchen sowohl Physikern, als denen, die diese Heilquellen zu besuchen gedenken, mit Vergnügen, indem nicht nur die physisch-chemischen Untersuchungen mit Genauigkeit angegeben sind, sondern auch die Badgäste noch vieles andere darin finden werden, was sie interessieren kann.

Nr. 2. zerfällt in fünf Abschnitte. 1. Abschnitt über den Ursprung der Mineralquellen überhaupt sowohl der kalten als warmen in physisch-chemischen Bezüge. Die Bildung der Mineralwasser ist zu betrachten als das Resultat der Wirkung der Erdelektrocität auf das Wasser. In den heissen Mineralquellen prävalirt der Charakter des Hydrogens = - E, in den kalten der des Oxygens = + E; beinahe immer sind in der Nähe heisser Mineralquellen mehrere sel



reichhaltige kohlen-saure und eisenhaltige Wasser. Je niedriger die eigenthümliche constante Temperatur der kalten Mineralquellen gegen die mittlere Temperatur der Erde sich verhält, desto höher ist die der heissen und in den Abstufungen, auch die der lauen und warmen Mineralquellen. Auf diesen Satz wurde der Verf. durch eigene Forschungen geleitet, von denen wir wünschten, daß er sie fortsetzen möge. Am Ende dieses Abschnitts empfiehlt der Verf. die Einathmung der dunst- und gasförmigen Ausströmungen heißer Mineralquellen für Lungenkranke, um die Lungenausdünstung sanft zu befördern und zu vermehren, wobei dann die kalten Mineralquellen, welche kohlen-saures Gas ausströmen, in andern Arten von Brust-leiden und als stärkende Nachkur angewandt werden könnten. 2. Abschnitt. Ueber die Wirkungen der warmen und kalten Mineralwasser auf den menschlichen Organismus, zur Herstellung der Gesundheit. Der Verf. sucht diese Wirkungen aus elektrisch-chemischen Grundsätzen zu erklären. Die warmen mit dem Charakter des — E begabten Mineralwasser zeigen sich vorzüglich in solchen Krankheiten heilsam, welche den Charakter des + E an sich tragen, daher besonders in der Gicht, der vorzüglich zu starke Oxydation und Mangel an Desoxydationskraft zu Grunde liegt. 5. Abschnitt. Ueber die Benutzung des warmen Mineralwassers zu Baden im Großherzogthum zu Brunnenkuren, durch Natur und Nachhülfe der Kunst den Bestandtheilen des Karlsbader Mineralwassers entsprechend. Das Eigenthümliche und Charakteristische, was die heißen Mineralquellen, die kein Schwefelwasserstoffgas enthalten, mit einander gemein haben, hatte den Verf. auf die Idee geleitet, das Badner heisse

Quellwasser durch Nachhülfe der Kunst auch mit den fixen Bestandtheilen des Karlsbader zu versehen. Der Verf. setzt nämlich dem Badner Wasser kohlen-saures und schwefel-saures Natron zu, so daß sich dann bei dem Wasser auf folgende Weise verhalten:

*Karlsbader Wasser.*

Wärmegrad nach Reaumur  $50^{\circ}$  —  $54^{\circ}$ .

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) Ueberkohlen-saures Natron | 17 Gran          |
| 2) Kohlen-saures Eisen       | $\frac{1}{10}$ — |
| 3) Kohlen-saure Kalkerde     | 2 —              |
| 4) Schwefel-saures Natron    | 26 —             |
| 5) Salz-saures Natron        | 5 —              |
| 6) Kieselerde                | $\frac{1}{4}$ —  |

*Badner Wasser.*

Wärmegrad nach Reaumur  $50^{\circ}$  —  $54^{\circ}$ .

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) Ueberkohlen-saures Natron | 17 Gran          |
| 2) Kohlen-saures Eisen       | $\frac{1}{10}$ — |
| 3) Kohlen-saure Kalkerde     | 2 —              |
| 4) Schwefel-saures Natron    | 26 —             |
| 5) Salz-saures Natron        | 17 —             |
| 6) Kieselerde                | $\frac{1}{4}$ —  |

Durch jenen Zusatz wurde die salz-saure Kalkerde und Bittererde, so wie auch die schwefel-saure Kalkerde des Badner Wassers zersetzt, die nun entstehende Verbindung entspricht den fixen Bestandtheilen des Karlsbader Wassers. Auch will der Verf. von diesem natürlich-künstlichen Mineralwasser ganz dieselben Wirkungen gesehen haben, wie von dem Karlsbader. 4. Abschnitt. Ueber Dampfbäder im Allgemeinen und über die Dampfbadanstalt an der heißen Mineralquelle zu Baden im Großherzogthum. Der Verf. hat eine kleine Dampfbadanstalt, wobei die Dämpfe des Mineralwassers durch eine horizontal-laterale Dampfleitung

in eigene Kabinetchen geführt werden, eingerichtet; da diese aber für den zahlreichen Besuch dieses Badeorts zu beschränkt ist, so liefs auf seinen Antrag eine großherzogliche Commission unter seiner Anleitung den Plan zu einem dreistöckigen Dampfbadgebäude, womit in der Folge noch ein großes Wirthschaftsgebäude in Verbindung gesetzt werden soll, entwerfen, und die Gebäude sollen demnächst aufgeführt werden. Auch hat der Verf. viele Beobachtungen über den ausgezeichneten Nutzen dieser Dampfbäder beigebracht.

5. Abschnitt. Berichtigung über die Natur der Bestandtheile der heißen Mineralquellen zu Baden im Großherzogthum. Der Verf. theilt in einer kleinen Tabelle alle bisher bekannten Analysen des Badener Schwefelwassers, so wie die von ihm selbst angestellte Analyse mit; nach welcher dasselbe enthält in einem Pfund zu 16 Unzen:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Kohlensaures Gas       | $\frac{1}{2}$ Kubikzoll. |
| 2) Salzsäures Natron      | 16 Gran                  |
| 3) Salzsäure Kalkerde     | $1\frac{1}{2}$ —         |
| 4) Salzsäure Bittererde   | $\frac{1}{2}$ —          |
| 5) Schwefelsäure Kalkerde | 3 —                      |
| 6) Kohlensäure Kalkerde   | $1\frac{1}{2}$ —         |
| 7) Kohlensäures Eisen     | $\frac{1}{10}$ —         |
| 8) Kieselerde             | $\frac{1}{2}$ —          |
| 9) Extractivstoff         | $\frac{1}{20}$ —         |
| also fixe Bestandtheile   | $25\frac{1}{10}$ Gran.   |

Herr von *Gimbernat*, ein spanischer Mineralog, wollte in den Dünsten der heißen Mineralquellen zu Baden kein kohlensaures Gas, wie man bisher geglaubt, sondern Stickluft gefunden haben; aber der Verf. konnte bei seinen sorgfältigsten Untersuchungen keine Spur von Stickgas finden und glaubt, der Irrthum des Herrn

von Gimbernat rühre daher, daß derselbe die Dünste des heißen Wassers untersuchte, nachdem dieselben schon mit atmosphärischer Luft sich vermischet hatten. Angehängt ist noch ein Verzeichniß von den geeignetsten innern und äußern Arzneimitteln, welche theils die Wirkung der Heilquellen unterstützen, theils zu Vorbereitungskuren, so wie zu Nachkuren sich als besonders wirksam empfehlen; und endlich ein Grund- und Aufriß des neu zu errichtenden Dampfbadgebäudes neben der Ursprungsquelle.

Dieses Gebäude durchschneidet horizontal ein Dampfleitungskanal, der über 50 Schuh in der Länge und einen Schuh im Durchmesser hat und durch die Dampfbadkabinetchen auf dem Boden an der einen Seite derselben hindurchläuft. In jedem dieser Kabinetchen ist eine Vorrichtung angebracht sowohl zur lateral-horizontalen als verticalen Ausleitung des Dampfes in alle mögliche noch so sehr zusammengesetzte Apparate, durch welche Vorrichtung beständig frischer Dampf von der Quelle mit Macht ausströmet und keine Rückströmung desselben möglich ist. Diese von dem Verf. so sinnreich ausgeführte Anordnung hat noch einen besondern Vorzug, indem die so äußerst wichtigen Abstufungen der Temperatur des Dampfes nur durch eine solche laterale Dampfleitung zu erreichen sind; so zeigt der Dampf in dem der Quelle zunächst liegenden Kabinetchen  $42^{\circ}$  R., während er in dem entferntesten nur noch  $28^{\circ}$  R. zeigt.

Die Leidenden, welche die Badner Heilquellen besuchen, werden es dem für das Wohl seiner kranken Mitmenschen unermüdlich thätigen Verfasser nicht genug danken können, daß er sowohl durch Bildung

eines natürlich-künstlichen Karlsbader Wassers, als auch durch Einrichtung von so zweckmäßigen schon längst vermifsten Dampfbadanstalten den Kreis der Nutzbarkeit dieser Heilquellen auf eine so ausgezeichnete Weise erweitert hat.

---



Syrup ablaufen zu lassen; und um ihn vollkommener zu scheiden, gieße man concentrirte Zuckerauflösung auf die in diesen Töpfen enthaltene Masse: auf diese Weise scheidet man ohngefähr 10 Pf. Syrup von jedem Centner Zucker. Die gewöhnlichen Raffinirer erhalten 10 Pf. von derselben Menge.

Der so vom Syrup geschiedene Zucker wird mittelst des Dampfes im Wasser aufgelöst; allein man hat Sorge, ihn vorher mit einer Auflösung von Alaun zu vermischen, der man so viel reinen Kalk zusetzt, als zur Sättigung der vorstehenden Säure dieses Salzes nöthig ist, so daß der weißse Niederschlag, der dabei entsteht, die Farbe des Curcuma-Papiers nicht verändert. Auf einen Centner-Zucker sind 10 Pf. Alaun nöthig.

Man filtrirt in der Folge die noch warme Auflösung, um die Unreinigkeiten davon zu entfernen. Vor dem Filtriren ist der Syrup schwarz und undurchsichtig, aber nach diesem ist er durchsichtig und ambrafarben. Die Filtrirmaschinen bestehen aus kupfernen Zylindern, welche unten mit Löchern versehen sind, woran starker russischer Kanevas befestigt wird. Es sind deren 50 in einem Filtrirgefäß, weil es nöthig ist, daß diese Operation mit Sorgfalt vorgenommen wird.

Man bringt sodann den Syrup in Kessel, um ihn den gehörigen Grad der Concentration zu geben. Es scheint, daß bei dem gewöhnlichen Verfahren die Temperatur, welcher die Zuckerauflösung während des Abdampfens ausgesetzt ist, einen Theil des Zuckers in Syrup verwandelt. Bei dem Verfahren des Herrn Howard sind die Abrauchkessel kupferne Sphäroide, welche mit einer Luftpumpe in Verbindung stehen,

die während der ganzen Operation in Gang erhalten wird. Auf diese Art kann man jeden einzelnen Kessel luftleer machen, und die darin enthaltene Flüssigkeit kann bei so niederm Grade der Temperatur ins Hoche gebracht werden, daß man nicht den geringsten Zuckerverlust zu besorgen hat. Das innere elastische Fluidum ist so sehr verdünnt, daß sie nur eine verhältnißmäßige Spannung von 1 zu 4 Zoll Barometerhöhe behält. Jeder Kessel ist mit einem Thermometer und einer Quecksilberprobe versehen, wonach man den Fortgang der Arbeit beurtheilen kann; auch hat man dabei einen besondern Mechanismus angebracht, durch den man Proben herausnehmen kann, um sich wie gewöhnlich durch die Beschaffenheit des Syrups zu überzeugen, ob er hinreichend gekocht ist.

Der concentrirte Syrup kommt hierauf in ein offenes kupfernes Gefäß, um körnig zu werden. Diese Wirkung erfolgt dadurch, daß man zuerst seine Temperatur durch das Dampfbad bis zu 82° erhöht, und ihn hernach wieder bis auf 65° erkalten läßt \*). Man gießt ihn nun in gewöhnliche irdene Formen, um ihn in Brode zu bringen. Wenn er erkaltet ist, läßt man die unkrystallisirbare Flüssigkeit ablaufen, und gießt oben darauf eine neue Quantität von concentrirter Zuckerauflösung. Auf diese Weise scheidet man den gelben Syrup vollkommen ab; es bleibt nur wenig an der Spitze des Brodes zurück. Dieser Theil ist leicht durch ein zu diesem Zweck vorgerichtetes Instrument abzusondern. Der Zucker kann alsdann in den Handel gegeben werden.

---

\*) Obige Grade sind nach 100theiliger Scale.



*Nachschreiben des Herausgebers.*

Was ich bei meinem Aufenthalte zu London im Jahr 1816 über den hier erwähnten Gegenstand erfuhr, obwohl ich nicht Gelegenheit hatte, Herrn *Howard* (der krank war) zu sprechen, oder jene Fabrik zu besuchen, ist folgendes:

Zwei Vortheile sind es, welche man bei dieser Verfahrungsart zu erreichen trachtet:

- a) daß so wenig als möglich unkrystallisirbarer Zucker sich bei dem Kochen der Zuckerauflösung bilde. Zu diesem Zwecke sucht man
  - α. die ungleichmäßige Erhitzung der Masse zu vermeiden.

Dies ist der Grund, weswegen in Kesseln mit doppeltem Boden durch Hülfe einströmender Dämpfe gekocht wird. In einer Zuckerraffinerie zu London, bei welcher schon früher (ehe *Howard* sich für diesen Gegenstand interessirte) auf diese Art gearbeitet wurde, ist jedoch auf solche Art großes Unglück entstanden, indem der Dampfkessel zersprang und die Mauer des Hauses hinauswarf auf die Gasse. Eben daher kann bei Fabriken, wo man mit unvorsichtigen gemeinen Arbeiten zu thun hat, diese Verfahrungsart nicht empfehlungswerth scheinen. Bedient man sich aber eines auf die *Reichenbach'sche* Art (wovon B. 18. S. 279 die Rede war) eingerichteten Dampfkessels: so ist die Arbeit ganz gefahrlos und gewährt sehr große Vortheile. Wie mannigfache Operationen auf die leichteste Art durch die Heitzung der Kessel mit Dampf in dem kleinsten Raum ausgeführt werden können, ist besonders in der *Apothecaries Hall* zu London recht schön zu sehen, wovon bei einer andern Gelegenheit die

Rede seyn soll. Der Dampf braucht nicht viele Grade heisser als bei dem gewöhnlichen Luftdrucke kochendes Wasser zu seyn, und doch werden dadurch die größten Kessel in der kürzesten Zeit zum Sieden gebracht. Vom Anbrennen irgend eines Stoffes kann natürlich nie die Rede hiebei seyn. Daher eignet sich dieses Verfahren vorzüglich zur Bereitung destillirter Wasser, so wie es eben darum bei Zuckerraffinerien großen Vortheil gewährt.

Außerdem aber sucht man bei diesen Zuckerraffinerien, eben weil gefunden wurde, daß dadurch mehr krystallisirbarer Zucker zu gewinnen ist,

β die Abdampfung theils zu beschleunigen, theils sie bei einem möglich niedrigen Hitzgrade vorzunehmen.

Hierzu nun dient eine beständig in Bewegung erhaltene Luftpumpe vortreflich. Denn man weiß, bei welchen geringen Wärmegraden unter vermindertem Luftdrucke das Kochen beginnt.

Während ich in London war, suchte ein Techniker Herr *Dodd* den Gebrauch der Luftpumpe auch bei dem Abziehen des Weingeistes nützlich zu machen. Natürlich kann aber hiebei die Luftpumpe nicht beständig in Gang erhalten werden, weil man sonst gerade den Weingeist, welchen man zu gewinnen wünscht, hinwegsaugen würde. Es ist bloß thunlich anfänglich, ehe man Feuer giebt, die Luft in der Destillirblase und in dem Gefäß, in welches überdestillirt wird (das natürlich geschlossen seyn muß und mit umgelegten nassen Tüchern leicht kühl erhalten werden kann) sehr zu verdünnen. Herr *Dodd* versichert dadurch einen weit reineren und stärkeren Alkohol als bei der gewöhnlichen einfachen Destillation, und zwar

der kürzesten Zeit zu erhalten. Indefs uns dünkt, es aller Vortheil, den Herr *Dodd* erreichen kann, auch das von *Tennant* (B. XI. S. 467 d. J.) angegebene bequemere Verfahren schon erhalten werden kann.

Doch diess nur im Vorbeigehen; ich komme wieder auf die Raffinirung des Zuckers zurück. Noch in anderer Gesichtspunct wird bei dem von *Howard* empfohlenen Verfahren ins Auge gefasst, nämlich:

b) den Syrup so schnell als möglich von dem in den Formen krystallisirten Zucker zu trennen.

Bekanntlich bedient man sich zu diesem Zwecke der Deckung mit Thon. Indefs diese Arbeit ist ziemlich langweilig. Sie abzukürzen kann man sich einer Zuckerauflösung bedienen, nämlich einer die mit krystallisirbarem Zucker gesättigt ist. Wird diese durch eine hiezu zweckmäßige Vorrichtung auf den in den Formen krystallisirten Zucker, zwischen dessen Theilen sich noch Syrup befindet, getropfelt: so wird in kurzer Zeit aller Syrup ausgewaschen, indem dafür das Wasser den krystallisirbaren Zucker, der darin aufgelöst war, absetzt.

Ich hatte Gelegenheit, eine unserer deutschen Zuckerraffinerien zur Wiederholung dieses Verfahrens zu veranlassen. Es gelang vollkommen. Doch wurde die Bemerkung gemacht, daß der krystallisirende Zucker bei dieser schnelleren Auswaschung des Syrups mindere Festigkeit erhalte, als bei der langsameren Auswaschung durch die Deckung mit Thon. Diess scheint auch anderen bei der Krystallisation gemachten Wahrnehmungen ganz entsprechend zu seyn.

Bei dieser Gelegenheit will ich noch eine Bemerkung anderer Art hier anreihen. Es wird bei dem

Rede seyn  
de heifser  
chendes Was  
die größten  
gebracht.  
natürlich  
dieses  
Wasser  
grofser

finer  
kr

... Schweigger über die vortergende  
... vor mit Kalkwasser  
... wieder neues Kalk  
... Säure soll denn dadurch  
... In dieser Hinsicht wird  
... welche Säure soll denn dadurch  
... In dieser Hinsicht wird  
... als werde durch des  
... selbst eine Säure gebil-  
... wohl auch seyn, daß man  
... Zusatz von Kalkwasser zur  
... in der Kochhitze Flocken ausgeschie-  
... den Zusatz des Kalkwassers für nötig  
... den werden, den Zusatz des Kalkwassers für nötig  
... hält in den Zuckerraffinerien, um eine noch etwa vor-  
... handene vegetabilische Säure zu entfernen. Jedoch  
... im reinsten Zuckerwasser entsteht durch Kalk

... die Säure, welche ursprünglich in dem Saft der  
... enthalten ist, nur sehr wenig beträgt, so  
... der oft wiederholte Zusatz von Kalk und alkali-  
... Substanzen beim Versieden des Zuckersaftes und Läu-  
... des Zuckers unmöglich den Zweck haben, die Säure  
... zu sättigen. De Trés meinet daher, daß diese Substanzen  
... sich mit den Rückbleibseln des leimigen Setzmehles ver-  
... binden und sie dadurch unauflöslich machen. Diese Er-  
... klärung scheint jedoch auch nicht zu genügen, um den  
... Nutzen jener Zusätze in das nöthige Licht zu setzen, in-  
... dem der angeführte Bestandtheil nicht in so großer Menge  
... vorhanden zu seyn scheint, um den so oft wiederholten  
... Zusatz jener Substanzen notwendig zu machen. Es ist  
... vielleicht nicht unwahrscheinlich, daß während der ganzen  
... Zeit, da jene Operationen dauern, durch die Einwirkung  
... des Feuers eine Säure erzeugt werde, welche wieder hin-  
... weggeschafft werden muß, wenn die Arbeit gelingen soll.“  
(Chemisches Wörterbuch von Klaproth und Wolf, Bd. 5,  
S. 800.)

er bei Kochhitze ein Niederschlag, indem nämlich Kalkzucker zu den Körpern gehört, welche durch Hitze in den festen Zustand übergehen (gerinnen) und durch Erkältung wieder schmelzen, von denen ich in der Abhandlung „über einige noch unerklärte chemische Erscheinungen“ (B. 5. S. 49.) mehrere anführte. Noch mehrere andere Körper aber, aufser den dort angeführten, reihen sich an diese Zahl; und so eben ist ein junger Mann, Herr *Osann* aus Weimar, dessen Talente zu schönen Hoffnungen für die Wissenschaft berechtigen, auf meine Veranlassung beschäftigt, über diese ganze Reihe von Körper eine grössere Arbeit in meinem Laboratorio auszuführen. Es ist fast unbegreiflich, das man aus Vorliebe für die gewöhnliche Wärmetheorie diese anomalen Erscheinungen so lang unbeachtet lassen konnte, so das man sie in unsern Lehrbüchern der Naturwissenschaft nirgends erwähnt findet.

In der vorhinangeführten kleinen Abhandlung habe ich auch schon der Eigenschaft des Kalkzuckers in heißer Auflösung zu gerinnen erwähnt. Es scheint sonach diese Eigenschaft Beachtung zu verdienen in den Zuckerraffinerien. Und wir könnten also zur Untersuchung dieser Erscheinung selbst anlocken durch einen praktischen Zweck. Wer indess die Wissenschaft liebt, verlangt solchen Nebengewinn nicht, sondern weifs, das dergleichen Vortheile, wenn wir nur dem Wahren überhaupt nachstreben, wohl am Ende von selbst zufallen.

Ueber die  
bei Ausdehnung der Gase  
entstehende Kälte

Gay-Lussac.

(Uebersetzt aus den Annales de Chimie et de Physique, Tom. IX, No. 7, 1818, Seite 505, von F. Helmholtz, Mitglied der physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen \*).

Wenn dichte Körper zu flüssigen werden, und diese zu luftförmigen, so verschlucken sie eine Menge thermometrisch nicht wahrnehmbarer Wärme, welche daher latente Wärme genannt wird. Ihre Temperatur steigt nicht, so lange die Zustandsveränderung fortanert, weil alle mitgetheilte Wärme blos darauf verwandt wird, neue Theile dieser Körper entweder zu zerschmelzen oder zu verflüchtigen.

Darauf daß Wärme durch Zerschmelzung oder Verdunstung latent gemacht wird, beruht jede Erzeu-

\*) Durchgesehen v. H.

gung der künstlichen Kälte. Das Eis z. B. absorbiert beim Zerschmelzen eine Menge Wärme, welche derselben Masse Wasser mitgetheilt, sie bis zu einer Temperatur von  $75^{\circ}$  erheben würde, oder was eben soviel ist, Eis ist Wasser weniger  $75^{\circ}$  Wärme; gesetzt, es könnte eine Masse Eis mit einmal zerfließen, so müßte, vorausgesetzt daß die Wärmecapacität des Wassers constant bliebe, nothwendig die dadurch entstehende Temperatur des Wassers  $75^{\circ}$  unter den Eispunct hinabfallen. Dies ist die Gränze der größten Kälte, welche man durch die Zerschmelzung des Eises hervorbringen könnte, so wie auch durch Schmelzung anderer fester Körper, welche sich auf der Temperatur Null befinden. Diese Gränze wäre selbst nie zu erreichen, weil man um Eis zu schmelzen, einen andern Körper dazu bringen muß, der dem Wasser Wärme mittheilt, und welcher also dessen Temperatur nicht bis zu  $-75^{\circ}$  sinken läßt. Erkältet man vorher die Körper, welche man zu der Kälte erzeugenden Mischung brauchen will, so würde die Gränze der hervorgebrachten Kälte weit unter  $75^{\circ}$  seyn können; allein sie ist in jedem einzelnen Falle durch die gegenseitige Verwandtschaft der zur Kälte erzeugenden Mischung angewandten Stoffe begränzt, deren Mischung daher nicht mehr wirkt, so bald die Temperatur bis auf einen gewissen Punkt herabgesunken ist. Daher kommt es auch, daß eine Mischung von Eis und Meersalz nur ein Sinken von 20 Grad unter Null hervorbringt, und daß wenn man diese beiden Körper in einer Temperatur von  $-20$  Grad anwenden wollte, kein größeres Fallen erhalten werden könnte.

Die Wärme, welche im Wasser bei dessen Ueber-

gang zum Dampfe latent wird, könnte auf ein gleiches Gewicht Wasser einwirkend seine Temperatur bis  $550^{\circ}$  erheben. Wenn nun eine Masse Wasser auf dem Eispunkte zugleich mit einmal zu Dunst werden könnte, so müßte die Temperatur dieses Wasserdunstes bis zu  $-550^{\circ}$  herabsinken. Wasser aber kann sich in Dunst verwandeln ohne Einwirkung eines fremden Körpers, und in dieser Beziehung liegt die Gränze der Kälte viel weiter hinaus, als sie durch Schmelzung fester Körper zu erreichen; allein ein sehr mächtig wirkender Grund läßt die Kälte nicht sehr beträchtlich werden, nämlich der, daß die Verdunstung allmählich geschieht, und sich sehr schnell mindert, indem die Temperatur abnimmt, während im Gegentheil die Wärmeausstrahlung der umgebenden Körper sich vermehrt.

So bekannt es war, daß die Verdunstung der Körper Kälte hervorbringe, und daß Wasser durch verdunstenden Aether zum Gefrieren gebracht werden könne, so hat doch Herr *Leslie* diesem Mittel eine ganz neue Wirksamkeit verschafft, indem er eine Verfahrensart angab, den Raum über den sich in Dunst verwandelnden Körper beständig leer zu erhalten. Allgemein bekannt ist jetzt sein sinnreiches Verfahren, um Wasser unter der Luftpumpe mit Hülfe der Schwefelsäure, welche den wässerigen Dunst im Augenblick der Entstehung verdichtet, zum Gefrieren zu bringen. Die durch Verdunstung des Wassers hervorgebrachte Kälte geht ohngefähr bis zu  $-40^{\circ}$ , und wenn man den Schwefelkohlenstoff anwendet, wie es Dr. *Marcel* that, so kann leicht mitten im Sommer Quecksilber zum Gefrieren gebracht werden.

Nichtsdestoweniger haben auch diese verschiede-



nen Mittel eine Gränze, und nur mit der größten Schwierigkeit würde man eine Kälte von  $-180^{\circ}$  erhalten können. Das Mittel, welches ich vorschlagen will, bringt eine weit bedeutendere Kälte hervor, deren mögliche GröÙe schwer zu bestimmen seyn möchte.

Es ist eine allen Physikern bekannte Thatsache, daß so oft man die Ausdehnung der Körper verändert, eine Veränderung in der Temperatur entsteht; sie steigt nämlich, wenn die Körper zusammengepreÙt, und sie fällt wenn sie ausgedehnt werden.

Man hat noch keine bestimmten Angaben über die durch Zusammenpressung der Luft entwickelte Wärme, aber man weiß, daß diese Wärme sehr stark ist. Wenn man die Luft auf das Fünftel des Raums in einem pneumatischen Feuerzeuge zusammenpreÙt, so kann man sehr leicht Feuerschwamm anzünden, der in freier Luft auf schmelzendem Blei, aber nicht auf schmelzendem Wismuth Feuer fängt, das heißt zwischen  $223$  und  $285$  Grad, oder ohngefähr bei  $300^{\circ}$ . Die Temperatur der auf ihren fünften Theil zusammengepreÙten Luft muß sich also wenigstens um  $300^{\circ}$  erheben, und nichts streitet gegen die Annahme, daß sie zu  $1000^{\circ}$  ja  $3000^{\circ}$  steigen könne, wenn die Zusammenpressung der Luft sehr stark und plötzlich Statt fände.

Demnach wird eine von 5 Atmosphären zusammengepreÙte Luftmasse von der nämlichen Temperatur, wie die sie umgebenden Körper, wenn man sie frei und plötzlich sich ausdehnen läÙt, eben so viel Wärme in sich aufnehmen, als sie während der Zusammenpressung entweichen ließ, und ihre Temperatur wird also um  $300$  Grad fallen, vorausgesetzt daß die Wärmecapacität der Luft constant bleibt. Wenn man

man eine von 50, 100 u. s. w. Atmosphären zusammengepresste Luft nimmt, so wird die durch plötzliche Ausdehnung hervorgebrachte Kälte keine Gränzen haben, das heisst, man kann durch Ausdehnung der Luft eben so grosse Kälte hervorbringen, als Wärme durch ihre Zusammenpressung.

Seit mehreren Jahren zeige ich in meinen Vorlesungen über Physik einen Versuch, welcher eine Nachahmung von dem ist, den man in den Bergwerken von Chemnitz in Ungarn gemacht hat, und welcher sich ganz dazu eignet, die erzeugte Kälte durch die Ausdehnung der Luft bemerkbar zu machen. Ich nehme ein kupfernes Gefäss, das ohngefähr 5 Litres faßt, presse darin die Luft von 2 oder 3 Atmosphären zusammen, und lasse dann dieselbe durch ein kleines mit einem Hahn versehenes Röhrchen hinaus, so daß die Zeit des Hinausströmens ohngefähr 4 bis 5 Secunden dauert, und richte den Strom auf eine sehr dünne ohngefähr  $\frac{1}{2}$  Centimètre von der Mündung des Röhrchens entfernte Glaskugel. Hierdurch stelle ich selbst mitten im Sommer Eis dar. Man könnte dieses Verfahren, um das Wasser zum Gefrieren zu bringen, im Großen anwenden, allein es würde weit kostspieliger seyn, als das von Herrn Leslie.

In dem eben angeführten Versuch ist es das Wasser, welches aufgelöst in der zusammengepressten Luft, durch die bei deren Ausdehnung entstehende Kälte gefriert. Man würde einen größern Grad von Kälte erhalten, wenn man trockne Luft dazu nehmen wollte, weil der Wasserdunst vor dem Gefrieren seine gebundene Wärme frei läßt.

Die Ausdehnung der Luft, als ein Kälte erzeugendes Mittel, wirkt offenbar weit kräftiger, als die

Zustandsveränderung fester und flüssiger Körper; aber es ist zu bedauern, daß wegen der geringen Masse der Luft die Kälte so zu sagen nur augenblicklich ist. Dem ungeachtet wenn man Gasarten nehmen wollte von größerer Wärmecapacität als die Luft, sie stark in einem geräumigen Gefäß zusammenprefste, und nur kleine Körpermassen der entstehenden Kälte aussetzte, ferner flüchtige Substanzen den Gasarten beimischte, um sie darin in Dünste zu verwandeln, so könnte man eine große Anzahl von belehrenden Versuchen anstellen.

Wenn nun unläugbar durch Ausdehnung der Gasarten eine unbegrenzte Kälte hervorgebracht werden kann, so wird die Bestimmung des absoluten Nulls der Wärme als eine durchaus nichtige Frage erscheinen.

#### *Nachschreiben des Herausgebers.*

So richtig es ist, was der Hr. Verf. des vorhergehenden Aufsatzes am Schlusse desselben bemerkt, daß es keine absolute Kälte geben könne: so scheint mir doch die durch Ausdehnung der Gasarten hervorzubringende Kälte sehr begrenzt. Es ist nämlich nicht möglich, zusammengeprefste Gasarten sich heftig ausdehnen zu lassen, ohne daß eine Zusammenpressung der zuerst herausfahrenden Luftportionen durch die unmittelbar nachfolgenden veranlaßt werden. Eben auf dieser Zusammenpressung der Luft durch den aus der Windbüchse herausfahrenden Strom beruht ja die bekannte Erscheinung des Windbüchsenlichtes.

Bei Erklärung dieser Licht- und Wärme-Erscheinung durch heftige Zusammenpressung der Luft kommen aber die Physiker in einen eigenthümlichen

180 Schweigger's Zusätze z. vorherg. Abh.

Abhandlung von *Hutton* B. VIII. S. 150 über das Gelfrieren des Alkohols durch künstliche Kälte. Ein so glaubwürdiger Mann schrieb mir damals, dass, da Vernehmen nach, sich *Hutton* hierbei der comprimierten Luft bedient habe, die zugleich mit dem Alkohol zuvor auf das Äusserste durch die bekannten Mittel kaltet war. Die Ausdehnung jener comprimierten Luft soll dann die angegebenen unglaublichen Kältegrade hervorgebracht haben. Ich habe seit der Zeit nichts gehört, was zur Bestätigung jener Versuche *Hutton's* hätte dienen können, oder sonst darüber Aufklärung gegeben hätte.

Um übrigens diese Versuche weiter zu verfolgen scheint mir, unter den von *Gay-Lussac* angegebenen Gesichtspuncten, einer der interessantesten, die Wirkung flüchtiger der Luft beigemischter Stoffe zu prüfen. Man weiss, dass, so leicht es ist einen trockenen Feuerschwamm durch heftig comprimirte Luft zu entzünden, doch niemand noch einen mit Alkohol oder Aether befeuchteten Schwamm entzünden konnte. So wie also die Beimischung von Dunst zur Luft nicht gleichgültig für die Feuererscheinung bei Compression ist: so ist sie gewiss eben so wichtig für die Kälteerzeugung durch Ausdehnung der Luft.

---

Naturwissenschaftliche  
 Verhandlungen  
 der  
 Göttinger Societät der Wissenschaften.

Im Jahr 1817 und 1818.

(Zur Ergänzung des B. 19. S. 325 und B. 22. S. 360 Mit-  
 getheilten.)

In der Versammlung der Königl. Societät der Wissenschaften am 17. Mai hielt der Herr Professor *Hausmann* die Vorlesung, deren Inhalt ein *Specimen crystallographiae metallurgicae* war. Die metallurgischen Prozesse bieten treffliche Gelegenheiten dar, um die Wirkungsarten der Kräfte, die bei der Bildung unorganisirter Körper thätig sind, zu beobachten. Oftmals kann uns die Art und Weise der Entstehung gewisser Hüttenprodukte Aufschlüsse über die Bildung gewisser Naturprodukte verschaffen, deren Entstehung unserm Auge verborgen blieb. Freilich werden wir dabei auch nicht selten die Ueberzeugung erlangen, daß die Natur ähnliche Körper auf sehr verschiedenen Wegen hervorzubringen vermag. In den Oefen der Oberharzischen Silberhütten bildet sich durch Sublimation zuweilen *Bleiglanz* und *Zinkblende*, dem Bleiglanze und der Zinkblende, die auf den Erzgängen vorkommen, zum Täuschen ähnlich. Es ist aber kein

Grund vorhanden, die letzteren für Feuerproducte anzusehen. In dem oberem Theile des Ganges der Grube *Katharina Neufang* zu St. Andreasberg, hat sich ein Gemenge aus *Gediegen-Arsnik*, *Silberschwärze*, *schlackigem Rauschgelb*, *schlackiger Arsenikblüthe* und einigen andern Fossilien gefunden, welches auf den ersten Blick größte Aehnlichkeit mit gewissen Erzeugnissen bei dem Rösten des Steins arsenikalischer Blei- und Silbererze hat, doch aber offenbar durch eine auf dem nassen Wege bewirkte Zersetzung der Gangmasse hervorgegangen ist. — Um zu zeigen, welch' ein bedeutender Gewinn für das Studium der Geschichte der unorganisirten Natur aus der genaueren, bisher sehr vernachlässigten Beachtung der Hüttenproducte zu ziehen sey, wählte der Herr Professor *Hausmann* zunächst eine Reihe vorzüglich merkwürdiger, bei verschiedenen metallurgischen Processen erzeugter krystallisirter Körper, an deren Beschreibung die weiteren Betrachtungen über ihre Entstehung von ihm geknüpft wurden. Da bei den Krystallisationen die bildenden Kräfte in einer mathematischen Gesetzen folgenden Regelmäßigkeit wirken, so darf man sich von den Beobachtungen über ihre Entstehung gewiss die interessantesten Aufschlüsse für die Anorganogenie versprechen. Zugleich können sich aber auch aus solchen Untersuchungen nützliche Erfahrungen für die Metallurgie ergeben.

1. *Metallische Krystallisationen.* Die metallischen Substanzen zeigen in ihren Krystallisationen eine weit größere Einförmigkeit als andere krystallinische Körper. Allen Metallen scheint das *reguläre Octaeder* als Grundform eigenthümlich zu seyn. Dieses zuerst aus den Beobachtungen der in der Natur vorkommenden

ediegenen Metalle gezogene Resultat erhält durch die  
 Untersuchung der Krystallisationen der künstlich er-  
 zeugten Metalle vollkommene Bestätigung. a. *Eisen.*  
 Das ductile Eisen, welches als so genanntes *Frischeisen*  
 sich in den Eisenhöfen ansetzt, zeigt zuweilen  
 octaedrische Krystallisation. Auch ist diese Form dann  
 und wann in dem Bruche des grobkörnigen Stabeisens  
 nicht zu verkennen. Vom Roheisen sind bekanntlich  
 drei Hauptabänderungen zu unterscheiden: das gemei-  
 ne und das stahlartige. Das erstere hat die Eigen-  
 schaft, wenn es gahr geblasen worden, mit Graphit  
 sehr und weniger gemengt zu seyn. Das letztere ent-  
 hält dagegen den Kohlenstoff durch die ganze Masse  
 gleichmäßig vertheilt, und pflegt, wenn es, wie ge-  
 wöhnlich, aus Braunsteinhaltigen Eisensteinen erzeugt  
 worden, einen geringen Gehalt von Magnesium zu be-  
 sitzen. Das letztere hat eine ungleich grössere Ten-  
 denz zur Krystallisation als das erstere, und dieses  
 nur um so geringere, je mehr es von Graphit erfüllt  
 ist. Doch bilden sich zuweilen bei diesem, bei lang-  
 samem Erkalten, gleichsam die Gerippe octaedrischer  
 Krystalle, eine unvollkommene Ausbildung, die auf  
 ähnliche Weise auch bei anderen Metallen vorkommt.  
 Das stahlartige Roheisen zeigt oft eine ausgezeichnet  
 fächerreiche Textur, und die nicht selten an der Ober-  
 fläche zu vorstehenden Zellen sich erhebenden Kry-  
 stallblätter lassen zuweilen einen dem regulären Octä-  
 der entsprechenden Durchgang erkennen. Die grosse  
 Anlage zur Krystallisation, welche das stahlartige Roh-  
 eisen zu besitzen pflegt, dürfte theils darin ihren  
 Grund haben, daß sich in diesem niemals Graphit  
 auszubilden pflegt, dessen grössere Krystallisationsten-  
 denz die krystallinische Ausbildung des Eisens verhin-

dert; theils aber auch in der Verbindung des Eisens mit etwas Magnesium. Denn aus mehreren Erfahrungen scheint sich zu ergeben: daß Metallgemische eine größere Neigung zur Krystallisirung besitzen als die einfachen Metalle, aus denen sie bestehen; so wie es wahrscheinlich ein allgemeines Gesetz in der unorganisirten Natur ist, daß die Körper eine um so größere Tendenz besitzen sich krystallinisch auszubilden, je zusammengesetzter ihre Mischung ist. *v. Kupfer.* Die krystallinische Form des Kupfers ist bei dem natürlichen, so wie bei dem künstlich durch sogenannte Cämentation gebildeten, bekannt. Das reguläre Octaeder ist vorherrschend. Dieselbe Krystallform zeigt sich auch zuweilen bei dem unreinen Kupfer, welches auf den Hütten unter dem Namen des *Schwarzkupfers* bekannt ist. Der Hr. Prof. *Hausmann* erhielt schöne Stücke octaedrisch krystallisirten Schwarzkupfers von *Riegelsdorf* durch seinen eifrigen ehemahligen Zuhörer, den Kurfürstlich Hessischen Bergwerkseleven Hrn. *Heuser*. Bei dieser Gelegenheit sind von ihm auch über die so genannten *Kupferhaare*; genauere Untersuchungen mitgetheilt. Sie bilden sich auf der Oberfläche und in den Höhlungen des Kupfersteins, zumahl wenn solcher mit Wasser abgelöscht wird, und sind nicht, wie man wohl glauben sollte, Producte der Krystallisation, daher sie auch nicht in Ansehung ihrer Bildung den natürlichen haarförmigen Metallen analog zu seyn scheinen, deren Entstehung eher von einer gehemmten Krystallisation abzuleiten seyn dürfte. Die Kupferhaare bilden sich, wenn der Kupferstein, aufser dem geschwefelten Kupfer auch Kupfer enthält. Das erstere erstarrt schneller als das letztere; Indem jenes sich zusammenzieht, wird das noch flüssige Kupfer



fer durch die in der Oberfläche des Steins entstandenen Poren geprefst, und nimmt daan die Form an, welche die kleinen Oeffnungen vorschreiben. c. *Messing*. Das Messing der ersten Schmelzung, die so genannte Mengepresse zeigt, wenn sie glühend zerstückt wird, eine Anlage zur Krystallisation, die ebenfalls den octaedrischen Typus nicht verkennen läßt. d. *Speise*. Dieses bei der Fabrikation des Kobaltglases oder der Smalte sich bildende metallische Product, welches hauptsächlich aus Arsenik-Nickel zu bestehen pflegt, aber gemeinlich auch Kobalt und verschiedene andere Metalle enthält, erlangt bei gewöhnlichem Erkalten nur gefiederte Krystallisations-Anlagen auf der Oberfläche; krystallisirt aber bei langsamerem Erkalten zwischen Kohlen zuweilen vollkommen aus. Der Hr. Prof. *Hausmann* verdankt der Güte des Hrn. Inspectors *Bernstein* auf dem Carlshavener Blaufarbenwerke überaus instructive Stücke dieser Art, die ihn in den Stand setzten, die Krystallisationen der Speise genauer zu untersuchen, die sich ebenfalls auf das reguläre Octaëder zurückführen lassen. Durch diese Untersuchung ist zugleich ein neues Licht auf die bisher sehr wenig gekannte Krystallisation des natürlichen Arseniknickels oder so genannten *Kupfernicksels* geworfen.

2. *Graphit*. Diese krystallinische Verbindung von wenig Eisen mit vielem Kohlenstoff erzeugt sich in Menge bei dem Schmelzen des Roheisens, wenn dieses aus nicht Braunsteinhaltigen Eisensteinen mit vielen Kohlen geblasen wird. In kleinen Schuppen macht er einen Gemengtheil des Roheisens aus; bildet aber in den Höhlungen und auf der Oberfläche desselben, so wie zwischen den das Roheisen deckenden

Schlacken nicht selten Krystalle, die wohl einen Durchmesser von  $\frac{1}{4}$  Zoll haben, und eben so wie die, gemeinlich unvollkommenen Krystalle des natürlichen, in Grönland gefundenen blätterichen Graphits, in sehr dünnen regulär-sechseitigen Tafeln erscheinen.

3. *Geschwefelte Metalle.* a. *Geschwefeltes Kupfer.* Der bei der ersten Schmelzung der gerösteten Kupfererze gewonnene so genannte *Kupferstein*, dessen Hauptbestandtheil geschwefeltes Kupfer ist, zeigt sich zuweilen krystallisirt, und kommt dann in denselben Formen vor, wie das natürliche geschwefelte Kupfer, der *Kupferglanz*. Unter den Schätzen der *Aschischen* Schenkungen des akademischen Museums befindet sich ein krystallisirter Kupferstein von einer Werchoturischen Hütte, woran der Hr. Prof. *Hausmann* nicht allein mehrere der bekannten Krystallisationen des Kupferglanzes, sondern außerdem auch einige neue beobachtete, wodurch er zur genaueren Bestimmung der Krystallisationen des geschwefelten Kupfers in den Stand gesetzt wurde. b. *Geschwefeltes Blei.* Der in den Bleierz-Schmelzöfen regenerirte Bleiglanz kommt oft ausgezeichnet krystallisirt vor. Die Krystalle pflegen würflicht aber selten vollkommen ausgebildet, sondern ähnlich den Krystallen des auf gewöhnliche Weise im Großen bereiteten Kochsalzes, wie aus sechs hohlen vierseitigen Pyramiden mit treppenförmigen Seitenwänden zusammengesetzt zu erscheinen. c. *Geschwefelter Spießglanz.* In Verbindung mit dem regenerirten Bleiglanz, der gemeinlich einen geringen Antheil von geschwefeltem Spießglanz enthält, bildet sich dieses Schwefelmetall auch dann und wann rein durch Sublimation in den Schmelzöfen der Oberharzischen Silberhütten, und kommt in überaus schönen nadelförmigen

gen Krystallen vor, die denen des natürlichen Graupfiesglanzerzes ähnlich sind.

4. *Oxyde. a. Zinkoxyd.* Wenn mit dem Eisenstein Zinkminern zufällig verbunden sind, so setzt sich in den Schachten der Hohöfen ein Ofenbruch an, der größtentheils aus kohlensaurem Zinkoxyd zu bestehen pflegt. Seltner ist die Erscheinung von krystallisirtem Zinkoxyd in Spalten der Gestellsteine, wie sie hin und wieder in den Hohöfen der Eisenhütten am Harze vorkommen. Die kleinen Krystalle sind regulär sechsseitige Prismen, und haben gemeiniglich eine olivengrüne Farbe. Sie zeigen sich mithin manchem krystallisirten phosphorsauren Bleie sehr ähnlich, mit welchem sie am so leichter verwechselt werden könnten, da Mennige zuweilen in ihrer Begleitung vorkommt. Unser Herr Professor *Stromeyer* entschied zuerst durch eine chemische Untersuchung über ihre wahre Natur, indem von ihm Zinkoxyd mit einer Spur von Eisenöxyd darin aufgefunden wurde. Der Hr. Prof. *Hausmann* hat zu zeigen sich bemühet, wie das regulär sechsseitige Prisma dieser Substanz sich von der Grundkrystallgestalt des natürlichen Zinkglases ableiten läßt, zu welcher Untersuchung er ausgezeichnete Stücke von der Rothenhütte am Harz durch die Güte des Hrn. Vicebergcommissairs *Itseman* zu Clausthal erhielt. b. *Kupferglimmer.* Dieser Körper gehört unstreitig zu den merkwürdigsten Hüttenproducten. Seine genauere Untersuchung bietet manche interessante Aufschlüsse für Metallurgie und Krystallogenie dar. Er war am Harz längst als eine schädliche Beimengung der so genannten Krätzkupfer bekannt, die, wenn Kupferglimmer in ihnen vorkommt, hart, spröde und zu manchen Verarbeitungen, namentlich zur Messingfabrika-

tion unbrauchbar sich zeigen; aber die Bestandtheile dieses in dünnen, regulär sechsseitigen Tafeln krystallisirten, goldgelben, stark glänzenden, theils an der Oberfläche, theils im Innern des Kupfers sich befindenden Körpers, waren verborgen, bis nun durch eine mühsame Untersuchung des Hrn. Prof. *Stromeyer* sich ergeben hat, daß er aus Kupferoxyd, Antimoniumoxyd, etwas Bleioxyd, alauerdehaltiger Kieselerde und sehr kleinen Antheilen von Silberoxyd, Eisenoxyd und Schwefel zusammengesetzt ist. Dem Antimoniumgehalte der Hüttenproducte, woraus die Krätzkupfer dargestellt werden, ganz besonders aber dem Antimoniumgehalte der Bleie, womit diese Kupfer gesaigert werden, ist die Bildung des Kupferglimmers vornehmlich zuzuschreiben. Durch die genauere Kunde der Natur dieses Körpers wird man in den Stand gesetzt werden, zweckmäßige Mittel zur Verhütung seiner Erzeugung anzuwenden, worüber der Herr Prof. *Hausmann* an einem andern Orte ausführlicher seine Meinung äußern wird. c. *Krystallisirte Schlacken*. Den Schlacken hat man bisher geringe Aufmerksamkeit geschenkt, und doch ist es nicht möglich die metallurgischen Prozesse genau zu kennen, wenn man nicht die Abfälle mit derselben Sorgfalt als die nutzbaren Producte untersucht. Durch die in dieser Abhandlung mitgetheilten Beobachtungen wird es klar, daß auch bei der Bildung verschiedenartiger Schlacken Verbindungen in bestimmten Proportionen der Bestandtheile vorkommen, die sich an gewissen Krystallisationen erkennen lassen; daß sogar mitunter bei ganz verschiedenartigen Hüttenprocessen Schlacken von derselben Art erzeugt werden. Anlagen zur krystallinischen Bildung werden nicht selten bemerkt bei Schlacken mit *faseriger*, *Textur*.

Unser Verfasser fand dieses Gefüge unter andern an Schlacken von dem Kupfersteinschmelzen und an Eisenhohofen-Schlacken. Aber auch vollkommen krystallisirte Schlacken kommen hin und wieder vor. Besonders merkwürdig ist eine in Rectangulär-Octaedern krystallisirte, hauptsächlich aus Eisenoxyd und Kiesel-erde bestehende und außerdem gemeiniglich auch Alaunerde, Kalk und Kali enthaltende Schlacke, die vormals von *Karsten* unter dem irrigen Namen von *vulcanischem Eisenglase* beschrieben, und dann von *Klaproth* analysirt worden ist, und von welcher Herr Prof. *Hausmann* früher bereits in von *Moll's* neuen Jahrbüchern der Berg- und Hüttenkunde einige Nachrichten mitgetheilt hat. Zuerst fand derselbe dieses krystallisirte Glas in Eisenfrisch- und Rohstahlschlacken der Königshütte am Harz; ein besonders ausgezeichnetes Stück davon erhielt er darauf durch die Güte des Hrn. Obermedicinalraths *Ritters Blumenbach* von einem Eisenwerke in den Pyrenäen. Später entdeckte er dasselbe krystallisirte Glas unter den Schlacken von einer alten Schwarzkupferarbeit zu *Fahlun* in Schweden, und von einem vor Jahren zu *Lautenthal* am Harz betriebenen Kupferfließschmelzen; endlich noch erhielt er dasselbe vor Kurzem durch seinen eifrigen Zuhörer, Hrn. *Wolf* aus Schmalkalden, der diesen Körper in den Schlacken vom Ausblasen eines Blaufens gefunden hatte. Die rectanguläroctaëdrische Krystallform dieser Schlacke hat Grundkanten von  $75^{\circ} 31' 40''$  und  $124^{\circ} 24' 58''$ . Die secundären Krystallisationen bestehen in dem keilförmig verlängerten Octaëder mit Endkanteu von  $55^{\circ} 35' 2''$  und in derselben Krystallisation mit abgestumpften Endkanten oder

an den stumpfen Grundkanten abgestumpft. Die Schlacke von der Kupferkiesarbeit, so wie die Blauofenschlacke zeigen rechteckig tafelförmige Anlagen zur octaedrischen Krystallisation. — Eine ausgezeichnet krystallinische Eisenhohofenschlacke erhielt der Herr Prof. *Hausmann* zu *Gammalbola* in Westmanland. Diese ist von einer perlgrauen Farbe und in stark geschobenen vierseitigen, an sämtlichen Seiten zugeschärften Tafeln, mithin nach Art des Gypses, krystallisirt.

5. *Arsenigte Säure*. Dieser Körper bietet manche lehrreiche Beobachtungen über die Ausbildung der Krystalle dar. Er kommt oft krystallisirt vor, und in den mannichfaltigsten Abstufungen der mehreren oder minderen Vollendung. Das reguläre Octaëder ist die herrschende Form; aber sehr oft zeigt sich dieses nur an den Kanten ausgebildet, und in der Mitte jeder Fläche mit einer tetraëdrischen Vertiefung, deren Seitenbegrenzungen auf ähnliche Weise, wie bei den unvollkommenen Würfeln des regenerirten Bleiglanzes, treppenförmig sind. Auf diese Art erscheint das reguläre Octaëder wie aus acht hohlen Tetraëdern zusammengesetzt. Zuweilen finden sich auch einzelne hohle Tetraëder, hin und wieder mit Ansätzen zur Ausbildung der benachbarten. Die in dieser Abhandlung über den weissen Arsenik mitgetheilten Bemerkungen gründen sich auf die Untersuchung des krystallisirten weissen Arsens, der auf den Rösthaufen arsenikalischer Erze, z. B. besonders ausgezeichnet auf den Hütten am Unterharze, so wie bei dem Rösten des bei der Silber- und Bleiarbeit auf der Andreasberger Hütte gefallenen Steins sich erzeugt.

Durch die in dieser Abhandlung enthaltenen Un-

suchungen wird es einleuchtend; daß das Studium der unorganisirten Naturkörper nicht unbedeutenden Gewinn aus der genaueren Betrachtung metallurgischer Anstprodukte ziehen kann; und daß auf der andern Seite auch die Metallurgie dabei gewinnt, wenn die in ihrem Gebiete erzeugten Producte mit derselben Sorgfalt und denselben Hülfsmitteln erforscht werden, mit man bisher nur die Naturproducte zu untersuchen pflegte.

Wir heben aus einer in derselben Sitzung am 17. May 1817. gehaltenen Vorlesung des Hrn. Hofraths *Ostlander* über die in der Nähe von Salzburg aufgefundenen Römischen Alterthümer folgende Stelle aus *Gött. gel. Anz.* 1817. St. 1071.):

„Jedem Beobachter dieser Gegenstände muß es gleich auffallen, daß unter den eisernen Geräthschaften einige völlig wie neu aussehen, während andere im Rost ganz oder halb zerfressen sind. Diese Bemerkung hat sogar einige auf den Gedanken gebracht, der Besitzer habe z. B. neue Bretternägel den verrosteten untergeschoben. Dies wäre jedoch ein zweckloser und thörichter Betrug, dessen der Besitzer, den der Hofr. *Ostlander* als einen verständigen, geraden und biedereren Mann kennen lernte, an sich nicht fähig seyn scheint. Neue Nägel könnten ja den Werth einer solchen Sammlung im geringsten nicht erhöhen. Aber eben diese, wie kürzlich aus der Werkstatt des Nagelschmides kommenden Nägel, ohne alle Rostflecken, selbst mit dem eigenthümlichen metallischen Glanze des Eisens sind deswegen höchst merkwürdig,

weil sie den denkenden Beobachter auf die Untersuchung leiten müssen: Woher kam es denn, daß diese Nägel, wahrscheinlich über anderthalb tausend Jahre, vom Rost verschont blieben? und damit auf die Entdeckung des Mittels, wodurch Eisen so lange vor allem Rosten bewahrt werden konnte. Dieses ist der Nachfrage und Untersuchung unsers Hofr. *Osiander* gelungen. Alle diese Nägel nämlich, die unversehrt blieben, befanden sich zwischen den Holzkohlen (der Textur nach Eichenkohlen und Fichtenkohlen) der Urnenumgebungen. Die Kohle war es also offenbar, welche das Eisen gegen den Rost schützte. Am auffallendsten aber beweisen dieß diejenigen Nägel (wovon auch Hofr. *Osiander* einen von dem Besitzer geschenkt erhaltenen mitbrachte), welche, so weit sie mit Kohlen bedeckt waren, völlig wie neue aussehen, wo sie hingegen in die feuchte Erde hinausragten, ganz oder zum Theil vom Rost zerfressen sind. Die Kohle also ist ein so sicheres Schutzmittel gegen das Rosten des Eisens, daß solches viele Jahrhunderte lang in feuchter Lage unter der Erde, nahe an einem großen Fluß, dagegen vollkommen geschützt war. Wie wichtig diese Entdeckung ist, muß jedem in die Augen leuchten, besonders bei Versendung der Stahl- und Eisenwaren über Land und See, beim Aufbewahren der Eisen, Gewehre und Waffen in feuchten Magazinen, und in Ländern, wie in West- und Ostindien, auf vielen Inseln und in vielen Ländern, in denen der Rost in kurzem alles zerfrisst. Dieses Mittel ist aber um so wichtiger, als es überall zu haben, und von der Beschaffenheit ist, daß es nicht wie öliche oder fette Mittel oder wie Firniß, dem Eisen und polirten Stahl den natürlichen Glanz benimmt; auch das



Das Kohlenpulver die Politur nicht verderben wird. Wahrscheinlich schützt eben dieses Mittel auch andere Metalle gegen den Rost, indem die Kohle alle Säuren einsaugt, und den Oxydationsproceß, der den Rost hervorbringt, unterdrückt. Denn auch andere metallische Gegenstände, wie einige vorerwähnte kupferhaltige oder messingartige Münzen, fanden sich ohne Rost. Die Kohle ist uns schon von so vielen Seiten als ein wichtiges Schutzmittel bekannt worden, durch unsern ehemaligen Mitbürger, den verstorbenen Collegienrath *Lowitz* in Petersburg, als ein Mittel, faultem Wasser und Branntwein den übeln Geruch zu nehmen; durch Hrn. von *Krusensterna's* Reise, als ein Mittel in den inwendig verkohlten Fässern das faule Wasser bei Seereisen am längsten trinkbar zu halten, und nun durch die Aufmerksamkeit unsern off. *Osiander* auf eine durch funfzehn bis sechszehn Jahrhunderte bestätigte Thatsache, als ein Mittel, das Eisen, und wahrscheinlich alle andere dem Rost unterworfenen Metalle, vor der Zerstörung durch Rost vollkommen zu bewahren“ \*).

Als Anhang stehe hier noch eine Bemerkung, welche Herr Hofrath *Osiander* hinsichtlich auf den *Nadel* des alten Chemikers *Paracelsus* zu Salzburg machte. (S. Gött. gelehrte Anz. 132 St. S. 1315.)

„Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus *Paracelsus* von Hohenheim starb nämlich im Jahre 1541 einem Alter von 47 Jahren zu Salzburg, wurde auf

\*) Wir erinnern hier auch an *Döbereiners* Entdeckungen hinsichtlich auf die Kohle in diesem Journal B. III. S. 377.

dem Kirchhofe der St. Sebastianskirche begraben und sein Grab mit einem Leichenstein bezeichnet; seine Gebeine aber wurden um die Mitte des vorigen Jahrhunderts unter dem damaligen Erzbischoff Sigismund (von Schrattenbach) ausgehoben, und in ein, in der Vorhalle dieser Kirche errichtetes, Monument in eine Vertiefung hinter seinem Bildnisse an der Spitze einer marmornen Pyramide gelegt. Dort sind sie noch jetzt hinter zwei Thüren und mit zwei Schlössern verwahrt, allein die Vorsteher sind so gefällig, sie Fremden, besonders Aerzten, zeigen zu lassen. Dem Hrn. Geh. Rath von *Sommerring* ward sogar erlaubt, Abgüsse von dem Schädel zu verfertigen, und einen Schenkelknochen in seiner interessanten anatomischen Sammlung aufzubewahren. Als dem Hofr. *Osiander* nun bei seiner Anwesenheit durch die gütige Verwendung des dortigen Professors der Anatomie, Hrn. Dr. *Aberle*, der Schädel und die Knochenreste des Paracelsus gezeigt wurden, fiel der zarte Bau der Knochen und der besonders feine Umriss und eigene runde Bau des Schädels dem Hrn. Hofr. *Osiander* so auf, daß er sagte: Wenn er nicht sich überzeugt hielte, daß keine Verwechselung dieser Knochen mit andern geschehen wäre, so würde er diesen Schädel für einen weiblichen halten, so wie diese Knochen für weiblich. Der Hr. Hofr. *Osiander* nahm daher genaue Umrisse von dem Schädel, um sie mit männlichen und weiblichen Schädeln zu vergleichen, und überzeugte sich immer mehr, daß der Schädel des Paracelsus sich dem weiblichen Bau mehr näherte, als dem männlichen. Als er sich sodann mit der Lebensgeschichte dieses berühmten Mannes beschäftigte, so bekam er auf einmal einen Aufschluß dieses merkwürdigen Phänomens. Fast

le Schriftsteller stimmen nämlich darin überein, daß  
 Paracelsus in der Kindheit castrirt worden sey, ja daß  
 ein Schwein ihm alle äußere Geschlechtstheile in dem  
 dritten Jahre als Hirtenknaben abgefressen habe. Z. B.  
 in *Helmont* schreibt daher von Paracelsus in s. *Tar-*  
*ri historia*: „Non enim ibi Veneri deditus (trivium  
 impie sus castraverat) non denique ignavia aut as-  
 tinatione vitam suam trivit scientiae avidus. Sub an-  
 ni vigesimum namque varias minerarum Germaniae  
 zonas inquirens, in Moscoviam tandem venit, in cu-  
 jus finitimis a Tartaris captus ad Chamam *Sanuchus*  
 ester deducitur.“ (Sanuchus, ohne Zweifel so viel  
 Σανύιον οὐκ ἔχων, caudam non habens, i. q. ἀπό-  
 πτος, plenarie castratus.) Nun aber ist es bekannt,  
 daß der männliche Mensch und die Thiere, die in  
 der ersten Zeit ihres Lebens castrirt werden, in der  
 Bildung verweiblichen, der Ochse z. B. bekommt ein  
 Kuhkopf und Kuhhörner, und sein ganzer Bau  
 ehrt sich der Kuh, wie des Hapauns der Henne,  
 der Castrat aber bekommt ein weibisches Ovalgesicht,  
 einen weiblichen Hals u. s. w. Es ist also kein Wunder,  
 daß auch bei Paracelsus sein ganzer Knochen-  
 bau verweiblichte. Aber merkwürdig ist es, daß die  
 Beobachtung an seinem Schädel und seinen Knochen  
 manchem Anatomiker, die ihn indessen sahen, ent-  
 ging, und daß unser *Sir. Hofrath Osiander* durch den  
 Ausspruch über seinen Schädel nach 275 Jahren das  
 bestätigte, was schon ein Zeitgenosse von Paracelsus  
 sagte, man habe es ihm im Gesicht ansehen können,  
 daß er castrirt sey. *Le Clerc* in s. *Histoire de la Mé-*  
*decine* p. 705. „Eraste raporte, que Paracelse gar-  
 dit un troupeau d'oyes dans son enfance, un Soldat  
 vroit mutilé; d'autres ont dit, que c'étoit par la mor-

sure d'un pourceau, que ce malheur lui étoit arrivé. Eraste ajoute que le *visage de Paracelse* et d'autres indices marquoient, qu'il étoit Eunuque, à quoi il faut joindre, qu'il avoit un très-grande aversion pour les femmes. " Auch ist es merkwürdig, daß er nirgends, wie seine Zeitgenossen, mit einem Barte abgebildet ist. Eine andere Bemerkung, die der Hr. Hofr. *Osiander* an dem Schädel des Paracelsus machte, betrifft die Spalte in dem linken Schlafbein. Mehrere Sachverständige, namentlich auch Herr Geh. Rath und Ritter *von Sömmerring*, halten dafür, daß dieser Riß im Leben entstanden sey; die Sage ging nämlich, und sie ist auch gedruckt, Paracelsus habe durch sein Ansehen und durch seinen Zulauf der bei ihm Hülfe suchenden, den Neid der Salzburger Aerzte so sehr erregt, daß sie ihn zu Gast gebeten, und über dem Essen zum Fenster hinaus oder die Treppe hinabgeworfen, wodurch er die tödtliche Verletzung am Kopf erhalten habe. Daß von Salzburg wie von andern Städten, der Ausspruch des Hesiodus gilt: *Κεραμειὺς κεραμῆς κότεῖς* etc. *Figulus figulo invidet, et faber fabro*, ist leicht zu erachten, aber zum Fenster hinauswerfen kommt es doch nicht. Und bei Paracelsus war das zuverlässig nicht der Fall, denn er saß noch vier Tage vor seinem Ende, da er schon krank und schwach war, aufgerichtet auf seinem Feldbettlein, und dictirte dem K. Notarius sein Testament bei völligem Verstande. Man sehe *Hübner's* Beschreibung von Salzburg S. 536. Wer aber einen solchen Riß im Schlafbein hat, daß man den kleinen Finger durchstecken kann, läßt das Aufstehen und Testamentmachen wohl bleiben. Er ist daher gewiß nichts anders, als ein Schaufelstich des Todtengräbers beim

Ausgraben der Knochenreste, als man sie in das Monument sammelte, wodurch auch die Knochen der Basis des Schädels und ein Theil der untern Kinnlade abgestoßen wurden. Der Schädel ist übrigens sehr dünn, und man sieht wenige Eindrücke vom Gehirn und Gefäßen.

In der Versammlung der königlichen Societät der Wissenschaften, am 19. Aug. 1817., zeigte der Herr Professor *Hansmann* ein neues, von dem Herrn Hofr. *Stromeyer* chemisch analysirtes Mineral von *Chesterfield* in *Massachusetts* vor, welches in einem granitartigen Gemenge in Begleitung von *Turmalin* und *Almandin* vorkommt, und bisher für *Feldspath* gehalten wurde. Mit diesem stimmt es auch in den wesentlichen Stücken der *Krystallisation* und *Structur* überein, zeichnet sich aber von den bis jetzt bekannten *Formationen* dieser Substanz nicht allein durch das *Qualitative* und *Quantitative* der Mischung, sondern auch durch mehrere äußere Kennzeichen aus. Herr Hofr. *Stromeyer* fand in 100 Theilen dieses Mineralkörpers: 70,68 Kiesel-erde, 19,80 Alaunerde, 9,05 Natrum, 0,23 Kalk, 0,10 Eisen- und Magnesiumoxyd. In Hinsicht der Bestandtheile steht also dieses Mineral dem *Sausurite* — mit welchem der Herr Prof. *Hausmann* zu Folge der *Klaproth'schen* Untersuchungen auch den sogenannten *Labradorstein* verbindet — am nächsten, unterscheidet sich aber von dieser *Formation* durch den größeren *Kiesel-* und den *Mangel* eines bedeutenden *Kalkgehalts*. Im Aeußern hat das *Nordamerikanische* Fossil mit dem *Adular-Feldspath* die meiste Aehnlichkeit. Seine ausgezeichnet blätteriche *Textur* ist mit *schaaliger* oder *körniger* Absonderung,

Durchscheinheit und einem Glanze verbunden, der zwischen Glas- und Perlmutterartigem das Mittel hält. In Hinsicht des Verhaltens vor dem Löthrohre stimmt es mit dem *Saussurit* ziemlich überein. Bei solchen Eigenschaften wird dieser Mineralkörper nach der Methode des Hrn. Prof. *Hausmann* eine besondere Formation der Substanz des Feldspaths ausmachen müssen, zu deren Bezeichnung derselbe den Namen *Kieselspath* in Vorschlag gebracht hat.

In der von dem Herrn Hofrath *Stromeyer* der königlichen Societät der Wissenschaften in der Versammlung an ihrem Stiftungstage (Dec. 1817) übergebenen Abhandlung, theilte derselbe eine chemische Untersuchung des derben Kupfernicksels und der dichten Nickelblüthe von Riegelsdorf in Hessen mit.

Seitdem *Cronstedt* in dem Kupfernicksel ein eigenthümliches Metall entdeckt hat, ist dieser Mineralkörper zur Gewinnung dieses Metalls zwar häufigst von den Chemikern zergliedert und auch dessen Bestandtheile im Allgemeinen bestimmt worden, indessen hat doch keiner von ihnen versucht durch eine genaue Analyse das Verhältniß derselben auszumitteln, und dadurch die wahre Mischung dieser ausgezeichneten Miner zu erforschen. Daher über die Natur des Kupfernicksels sowohl bei den Chemikern, als auch bei den Mineralogen noch so sehr verschiedene Meinungen herrschen; und wenn auch einige denselben sehr richtig für eine natürliche Legirung des Nickels mit dem Arsenik erklärt haben, so gründet sich doch diese Behauptung nur allein darauf, daß die beiden Metalle die bei weitem vorwaltenden Bestandtheile desselben ausmachen.

Durch einen unserer ehemaligen gelehrten Mitbürger, den Herrn Hütteninspector *Schwedes* zu Rommershausen bei Jesberg, ist der Hr. Hofr. *Stromeyer* in den Stand gesetzt worden, diese Lücke in der chemischen Kenntniß der Mineralkörper auszufüllen. Hr. Hütteninspector *Schwedes* war nämlich so gütig, demselben mehrere schöne Exemplare des zu Riegelsdorf in Hessen vorkommenden derben Kupfernicks zu übersenden, welcher sich insbesondere durch seine Reinheit vor dem anderer Gegenden auszeichnet, und außer etwas eingewachsenem Quarz frei von Beimischungen anderer und zumal metallischer Fossilien ist, und sich daher zur Analyse vorzugsweise eignet. Das specifische Gewicht desselben fand sich bei 10°,5 C. Temperatur und 0m,76 Barometerstand = 7,7261.

Aus den mit diesem Kupfernicks angestellten Untersuchungen zeigte es sich, daß derselbe in 100 Theilen zusammengesetzt sey aus:

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 54,726 | Arsenik                                               |
| 44,206 | Nickel nebst einer nicht zu scheidenden Menge Kobalt. |
| 0,337  | Eisen                                                 |
| 0,320  | Blei                                                  |
| 0,401  | Schwefel                                              |

---

100,000

Aus den Resultaten dieser Untersuchung über den Kupfernicks ersieht man nun leicht, daß das Nickel in dieser Miner nur allein mit Arsenik verbunden ist, wie dieses auch schon *Proust* und *Fauvelin* vermuthet haben, und keineswegs auch in geschwefeltem Zustande darin vorkommt. Die geringe in demselben enthaltene Menge Schwefel gehört allein dem Eisen

und Blei an, die als Schwefel-Metalle in dem Arsenik-Nickel aufgelöset sind. Eben so ist es hiernach auch sehr wahrscheinlich, daß die geringe Menge Kobalt, welche in diesem Kupfernickel vorkommt, und aus Mangel einer praktisch brauchbaren Methode von dem Nickel nicht geschieden werden konnte, sich im Zustande des Speiskobalts ebenfalls in dem Arsenik-Nickel aufgelöset befindet.

Diese Arbeit über den Kupfernickel veranlaßte den Herrn Hofrath *Stromeyer* auch die Analyse der Nickelblüthe oder des so genannten Nickelochers damit zu verbinden, weil dieser Mineralkörper nicht nur den Kupfernickel überall begleitet, sondern auch offenbar durch Zersetzung desselben entstanden ist, und es daher schon in dieser Beziehung gewiß von Interesse ist, auch eine genaue Kenntniß der Mischung dieses Körpers zu besitzen. Zwar haben wir schon vor mehreren Jahren vom Hrn. Professor *Lampadius* eine vollständige Analyse dieses Mineralkörpers erhalten, wodurch auch die frühere Meinung, daß dieser Mineralkörper ein natürliches Nickeloxyd sey, gerechtfertigt zu werden scheint. Nach der vom Herrn *Lampadius* in seiner Anleitung zur chemischen Analyse mitgetheilten Untersuchung soll dieses Fossil nämlich in 100 Theilen zusammengesetzt seyn aus:

67,0 Nickeloxyd

23,2 Eisenoxyd

1,5 Wasser

91,7

Indessen streitet doch mit dieser Annahme nicht nur die Entstehungsart dieses Mineralkörpers, sondern auch sein chemisches Verhalten, besonders das im Feuer, welches sehr deutlich einen Gehalt von Arsenik-



ure in demselben erkennen läßt: wie solches auch von die von unserm sel. *Gmelin* der könipl. Societät er dieses Fossil im Jahre 1795 mitgetheilten Versuche (Commentationes Soc. reg. So. Gott. Vol. XII. p. 3) geben haben. Es wurde daher nicht ganz unwahrscheinlich, daß sich Herrn *Lampadius* bei der Analyse des Mineralkörpers dieser wesentliche Bestandtheil zogen habe, und daß das Nickeloxyd in demselben mit Arseniksäure zu einem arseniksaurem Salze verbunden sey, wofür auch *Proust* und unser Hr. Prof. *iusmann* dieses Fossil bereits erklärt haben.

Um nun hierüber Aufschlüsse zu erhalten, unterwarf Herr Hofrath *Stromeyer* dieses Mineral einer neuen sorgfältigen Analyse, und wählte dazu eben die rechte Nickelblüthe von Riegelsdorf, welche auch demselben *Gmelin* zu den erwähnten Versuchen gedient hat, und sich zu dieser Absicht wegen ihrer Reinheit vorzüglich empfiehlt. Den dazu nöthigen Vorrath dieses schönen Fossils erhielt er von zwei seiner vormaligen Zuhörer, dem Herrn *Heuser* von Rodenberg und dem Herrn Bergcommissär *Strippelmann* zu Cassel, welche beide sich mit großem Eifer und vorzüglichem Erfolg unter seiner Leitung in der chemischen Zersetzung der Mineralkörper geübt haben, und ihm auch bei mehreren analytischen Arbeiten behülflich gewesen sind.

Zufolge der mit dieser Nickelblüthe unternommenen Analyse fand sich dieselbe in 100 Theilen zusammengesetzt aus:

37,35 Nickeloxyd nebst einer nicht zu scheidenden Menge Kobaltoxyd

1,13 Eisenoxyd

36,97 Arseniksäure

0,25 Schwefelsäure

24,32 Wasser

---

 100,00

Diese Untersuchung bestätigt also auf das vollkommenste die Meinung, daß dieser Mineralkörper ein natürliches arseniksaures Nickelsalz sey, daher auch der demselben schon von *Wallerius* beigelegte Name Nickelblüthe dem von *Nickelocher* vorgezogen zu werden verdient.

Zugleich ergeben auch diese Versuche, daß das Verhältniß der Arseniksäure zu dem Nickloxyd in diesem Körper von dem des metallischen Arseniks zum Nickelmetall im Kupfernickel verschieden ist, und daß daher bei der Zersetzung des letzten ein Theil der gebildeten Arseniksäure in andere Verbindungen treten muß. Wahrscheinlich findet auch bei der spontanen Zersetzung des Speiskobalts in Kobaltblüthe etwas ähnliches Statt, woher sich dann auch die gleichzeitige Bildung des *Pharmacoliths* sehr gut erklären läßt.

Herr Generalmajor *Menu von Minutoli* theilte der königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen *Neue Muthmaßungen über die Vasa Murrhina* mit, von welcher Abhandlung sich in den Gött. gel. Anz. 1818. St. 98. ein Auszug befindet, den wir um so mehr hier herauszuheben haben, da schon einmal in dieser Zeitschrift eine gelehrte Abhandlung über die *Vasa Murrhina* vorkam (vergl. B. V. S. 99 — 156.)

Welcher antiquarische Gegenstand (sagt d. H. Vf.) hat mehrere Bearbeiter gefunden und zur Aufstellung mehrerer Hypothesen Veranlassung gegeben, als die *Vasa Murrhina*? Einige wie *Christ* (de *Murrhinis ve-*

um Lips. 1743, 4. p. 53) halten sie für Dendrachat; *inckelmann* (description des pierres gravées du B. de sch. Florence 1760, 4. p. 501) für eine zusammengesetzte Sardonix oder Achatart, *Janon v. St. Laurent* assert. sopra le pietre preziose degli antichi. Act. d. Corton. Tom. V. p. 45) für eine Agata Sardonix, der Abt *Le Blond* (Dissertation de l'Abbé Le Blond sur les vases Murrhins) für einen Sardonix; der *F von Voltheim* (Sammlung verschiedener Aufsätze, mineral. Inh. Helmstädt, 1800, 1ter Theil) für mesischen Sp.ckstein; andere dagegen, wie *Marte* (traité des pierres gravées. Paris 1750. Fol. T. 1. p. 218) *Stuckius*, *Cardan* und *Scaliger* für Porcellan, der Prinz *Biscari* (Ragionamento de vasi Murrhins, 1781. 4.) aber, für eine aus feiner Erde zusammengesetzte Masse; welche Meinung man die *der ssius*, *Entrecolles*, *Kleemann* und *Grether*, die solche einer Art Porcellanerde angefertigt glauben, beistimmen kann. Man ersieht hieraus, daß die einen murrhinischen Gefäße für ein Fossil, die andere für ein aus Erdarten gebranntes Kunstproduct halten. Ich glaube aber, daß man beide Partheien vereinigen kann, wenn man zugiebt, daß die echten Vasa Murrhina, nach *Plin. H. N. (Lib. 33. C. 2. Murrhina et crystallina ex eadem terra effodimus, und l. 37. C. 7. mus Pompejus lapides et pocula ex eo triumpho pitolino Jovi dicavit)* ein Fossil waren. Was allenfalls noch dafür sprechen dürfte. ist der Umstand, daß das Murrhinum nach *Plinius* weich war und sich leicht zerreiben liefs (l. 37. C. 7. Potavit ex eo ante hos annos consularis, ob amorem abraso ejus margine, ut non injuria illa pretium auget) keinen blendenden Glanz, sondern nur einen Fettglanz und eine matte

Blänke annahm (Lib. 37. C. 8. Splendor his sine viribus, nitorque verius quam splendor) und bis auf einige durchscheinende Stellen undurchsichtig war (l. c. translucere quidquam aut pallere vitium est) und *Martial* (Epig. L. IV. p. 85.)

„Nos bibimus vitro, tu Murrha, Pontice, quare?”

Prodat perspicuus ne duo vina calix.“

Dagegen besaßen die Alten auch noch ein künstliches Murrhin; nämlich eine Glasmasse, die ihm nachahmte. Plin. sagt davon (L. 36. C. 67. Fit (vitrum) et album et murrhinum, aut hyacinthos sapphirosque imitatum et omnibus aliis coloribus) und *Arrian* (in seinem Peripl. Maris Eryth. cf. Hudsonii Geog. min. 1. p. 4) erwähnt ebenfalls dieses Glases, welches zu *Diospolis*, dem jetzigen Luxor in Oberägypten, verfertigt wurde. Das, was *Propertz* (L. 4. Eleg. 5. v. 26 emend. Turnebii in advers. 8. 1) hierüber sagt: „Murrheaque in Parthis pocula cocta focus“ spricht ebenfalls für den künstlichen Murrhin, und es geht daraus hervor, daß die Parther die Kunst verstanden, Gefäße zu machen, die mit den murrhinischen Aehnlichkeit hatten. Das coquere (kochen oder schmelzen), setzt eine flüssige Materie voraus, unter welcher leicht Glas verbunden seyn könnte. Für beide Arten von Murrhin sprechen übrigens folgende Worte des Plinius (Lib. 33. C. 46. In sacris quidem etiam inter has opes hodie non murrhinis crystallinisve, sed fictilibus prolibatur simpuviis. Und weiter unten quoniam eo pervenit luxuria, ut etiam fictilia plaris constant quam murrhina) ebenfalls, zumal, wenn er bedauert, daß der Luxus zu sehr überhand genommen habe. — Aus den hier angeführten Stellen geht, dünkt mich, hinreichend hervor, erstens, daß die eine, vielleicht die unechte,

aller Wahrscheinlichkeit nach, aus Glasflüssen bestand. Dieser Murrhin kam ferner nach Plin. aus dem Orient (l. 37. C. 8. *Oriens Murrhina mittit. Inveniuntur enim ibi in pluribus locis, nec insignibus — praecipue tamen in Carmania l. c.*) und wurden nach dem *Arrian* (*Perip. Mar. Eryth. in Geog. Vet. Script. min. V. l. pag. 27 et 26. Ibidem quoque versus ortum est civitas Ozene dicta, ubi olim fuit regia. Ex hac omnia, quae ad regionis commoditatem felicitatemque faciunt, Barygazam deportantur, nec non quae ad nostram mercaturam pertinent, ut lapides onychini et murrhini, andrones Indicae et Molochinae multumque othonii vulgaris*) über *Ougein* (*Ozene*) aus entfernten Gegenden Indiens, als ein wichtiger Handelsartikel nach *Baroach* (*Barygaza*) am Meerbusen von Cambaya gebracht, und von da aus weiter versandt. Vor Cäsar und dem Triumvirat, scheinen sie den Römern unbekannt gewesen zu seyn; unter dem August und Tiber werden sie, als eine seltene noch wenig bekannte Sache, noch oberflächlich berührt, und nur die spätern Zeitgenossen *Nero's* erwähnen ihrer mit Bestimmtheit. — Nun frage ich aber, wie geht es zu, daß man von jenen echten Murrhinischen Gefäßen keine Ueberbleibsel in den zahlreichen Kunstsammlungen findet, da man doch Kunstproducte von allen Völkern und aus allen Zeiten aufzuweisen hat? Sollte denn nicht ein einziges dieser Gefäße unverletzt, oder sollten nicht wenigstens Bruchstücke davon bis auf uns gekommen seyn, da wir doch alle mögliche Gegenstände der antiken Kunst, als geschnittene Steine, edle und unedle bearbeitete Metalle, und selbst Gefäße von Glas, wie die berühmte *Portlandvase* u. d. m. in unsern Museen

besitzen, und deren noch täglich mehr durch Zufall oder Ausgrabungen an das Tageslicht fördern? Denn daß ein jedes Ueberbleibsel von jenen Murrhinsischen Gefäßen vernichtet und verschwunden seyn sollte, ist sehr unwahrscheinlich, folglich ist es anzunehmen, daß wohl dergleichen vorhanden sind, die man aber, durch Hypothesen getäuscht, nicht dafür anerkennen will. — Diesen Umstand näher erwägend, verglich ich mehrere Bruchstücke von sogenannten Glaspasten (Glasmosaik, Millefiori und Punisches Glas genannt), die sich in meiner Antikensammlung befinden, mit den obbenannten Stellen, und fand nicht allein, daß sie die Probe hielten, sondern auch wirklich Bruchstücke von zierlichen Gefäßen aus mannichfaltigen Farben waren; ja unter diesen einige, die nach Plinius (L. 57. C. 8. Sed in pretio varietas colorum, subinde circumagentibus se maculis in purpuram candoremque, et tertium ex utroque ignescentem, veluti per transitum coloris, purpura, aut rubescente lacteo. Und *Martial* Epig. L. X. 80, de *Erote*, *Plorat Eros, quoties maculosaa pocula Myrrhae, etc.*) ganz die Farbe des echten *Murrhins*, nämlich aus der *Purpurfarbe* ins *Weißglänzende*, oder in die *Feuerfarbe*, oder in eine sanfte *Fleischfarbe* übergehende *Streifen* und *Flecke* hatten. Einige dagegen hatten *Speck-* oder *Fettflecke* (His maculae pingues placent). — Die meisten Exemplare jener Glaspasten, die ich besitze, sind in Italien ausgegraben worden; allein ich besitze auch Korallen, die in Preussen in Urnen mit weiblichem Suppellex verschwistert vorgefunden wurden, und vor einigen Wochen erhielt ich von einem kunstverwandten Freunde aus Kopenhagen (Hrn. Thomson) zwei Korallen von Glasmosaik, die Theile eines Halsbandes

eten, das auf der Insel Börnholm in einem alten  
 be gefunden wurde. Dieser Umstand, und der,  
 mir im Jahre 1816 ein aus Madras hier anwesen-  
 Cavalier (H. v. Monte) versicherte, eine Glasku-  
 wie die von mir, in der Abhandlung über Glas-  
 aik (*über antike Glasmosaik*. Herausgegeben von  
 Frhrn. Menu v. Minutoli etc. und H. M. Klaproth  
 Berlin. Maurersche Buchhandlung. Fol. mit Kup-  
 ) beschriebene, gesehen zu haben, die ein reicher  
 scher Nabob, in Gold gefasst, zum Geschenke er-  
 n hatte; und endlich, das mich, der in diesem  
 e hier anwesend gewesene Indische Gaukler, der  
 mehrere Male besuchte und jene Glasmosaik bei  
 sah, versicherte, das man dergleichen in Indo-  
 , besonders aber im Lande der Maratten nebst an-  
 Kostbarkeiten ausgrabe, und als grosse Selten-  
 n aufbewahre, die seiner Aussage nach, aus dem  
 sten Alterthume herkommen und gegenwärtig  
 t mehr angefertigt werden können, — bestärkten  
 noch mehr in der Seite 14 meiner Abhandlung  
 gesprochenen Muthmassung, das diese Glasmosaik  
 Persien, oder vielleicht Indostan herkommen. Ich  
 ze ferner einen Knopf von dieser Mosaik, der  
 China kommt, eine kleine angeschliffene Platte,  
 in der Sammlung der Propaganda zu Rom lauter  
 schen Gegenstände beigelegt, und eine Kugel,  
 die oben angeführte, die in einem grossen Museum  
 falls nur Indischen Merkwürdigkeiten beigelegt  
 ten war. Auch der oberwähnte Freund scheint  
 er Meinung beizutreten, indem er mir hierüber  
 indes schreibt. „Ihrer Meinung, das diese Anti-  
 tiken (nämlich die erwähnte Glasmosaik) Arabischen,  
 ischen oder Indischen Ursprungs seyen, trete ich

besitzen  
oder A  
dafs  
Gefä  
selb  
de  
d

228 Göttingische naturwissenschaftliche  
 gerne bei, und sie erhält selbst durch das auf Bornhol  
 gefundene Bestätigung. Die Erfahrung hat mich  
 sehr gelehrt, daß schon in der frühesten Zeit ein  
 starke Handelsverbindung zwischen dem Norden un  
 jenen Ländern Statt fand. Daher kommt es, daß ma  
 so oft, besonders auf Bornholm und Jütland u. s. v  
 Münzen der Chalifen, der Konstantinopolitanische  
 Kaiser, ja selbst der Sassaniden u. s. w. findet.“  
 Hiernach bin ich geneigt, die in meiner Sammlun  
 aufbewahrten Bruchstücke von Gefäßen aus Glasm  
 osaik für nichts anders als den nachgeahmten Murrh  
 des Plinius und des Arians zu halten; und als Glas  
 lassen sie sich vollkommen mit dem Coquere des Pe  
 perz in Uebereinstimmung bringen. Ferner stimm  
 der ihm von Arrian angewiesene wahrscheinliche O  
 seines Ursprungs so ziemlich mit den übrigen Sagen  
 überein. Vielleicht bestand auch wohl selbst der ec  
 te Murrhin aus nichts anderm, als solcher Glasmas  
 da die Portlandsvase und andere ähnliche Pasten, wo  
 aus Fossilien, die aus der Erde gegraben (terra effo  
 sa) auch geschmolzen seyn konnten; und meine b  
 sagten Glasmosaik aus allen edlen und unedlen M  
 tallen ihren Farben nach chemisch zusammengeset  
 worden sind. Hielt man nicht, und hält man nic  
 auch noch die Chinesischen Gefäße aus sogenannte  
 Reifsstein für einen echten Stein, da sie doch, w  
 dieß ein ähnliches kleines Gefäß in meiner Sammlun  
 deutlich zeigt, aus einer weichen, oder erweicht  
 Masse in Schablonen, wie etwa unser irdenes Geschi  
 geformt wurden? — Genug, so lange man mir nic  
 den Ursprung meiner Mosaikgefäße näher nachweise  
 oder obige Stellen widerlegen kann, nehme ich mei  
 aufgestellte Hypothese nicht zurück. — Die Ansic



meiner Sammlung von diesem alten Kunstproducte steht jedem Wissbegierigen zu jeder Zeit frei, und soll es mich freuen, wenn diese hier rhapsodisch hingeworfenen Worte die Veranlassung zu einer ernsthaften Untersuchung über den abgehandelten Gegenstand veranlassen.“

In der Sitzung der königl. Societät der Wissenschaften am 11. Julius hielt der Hofr. *Osiander* eine Vorlesung de carbone ligneo summo ad arcendam metallorum oxydationem remedio, novo et certissimo experimento comprobato. Im Jahre 1817. hatte Herr Hofr. *Osiander* bei der Betrachtung der ausgegrabenen Römischen Alterthümer zu Salzburg die Entdeckung gemacht, daß eiserne Nägel über anderthalb tausend Jahre zwischen Kohlen unverrostet erhalten worden waren, und damals solches der k. Soc. d. W. bekannt gemacht, wie eben vorhin angeführt wurde. Dabei hatte er geäußert, daß die Kohle wahrscheinlich ein Mittel sey, nicht nur das Eisen, sondern auch andere, dem Rost unterworfenene Metalle, vor dem Rosten zu bewahren. Um aber darüber gewiß zu werden, that er voriges Jahr in ein großes gläsernes Gefäß mit weiter Oeffnung zwischen Lagen von Holzkohlenpulver neue Eisen- und Stahlwaaren, wie Nägel, Nadeln, Uhrfedern, Schrauben, stählerne Knöpfe, Federmesser, ferner silberne und kupferne neue Münzen, Stücke Messing, Kupferplatten, Zinn, Blei, Zink, Tombak u. s. w. und bedeckte die Glasflasche mit einer nicht genau anschließenden Glasplatte, welche das Eindringen von Feuchtigkeit nicht im geringsten hindern konnte; diese Glasflasche setzte er in ein großes tönernes Gefäß, füllte dieses mit Kohlen, Asche

im Innern des Zimmers, sehr leicht in jede Lage gebracht werden kann, so daß man durch die Röhren des Microscops, nachdem die gewöhnlichen Linsen sämmtlich herausgenommen worden, einen horizontalen Strahlenkegel von Sonnenlicht durch eine größere oder geringere Oeffnung vorn an jener Röhre, in das finstere Zimmer einlassen kann. Ein Gehülfe kann leicht durch eine sanfte Drehung des Spiegels bewirken, daß jene Strahlen immer in der gehörigen Lage auf diejenigen Körper fallen, welche man auf einem verschiebbaren Stative diesem Lichte aussetzt, um die Erscheinungen der Inflexion oder Deflexion desselben auf einer matt geschliffenen Glastafel, in diesen oder jenen Abständen hinter solchen Körpern, wahrnehmen zu können. Noch vorzüglicher lassen sich diese Erscheinungen, und die dabei sich darbietenden farbigen Streifen beobachten, wenn man das inflectirte Licht gar nicht auf einer solchen Glastafel auffängt, sondern eine Convexlinse oder Loupe, deren Brennweite etwa ein paar Zoll betragen kann, in gehörigem Abstände vor das Auge hält, in welchem Falle aber die Oeffnung, durch welche das Licht in das finstere Zimmer einfällt, sehr klein seyn muß, wenn das Auge nicht geblendet werden soll. Dünnere oder dickere verticale Drähte, an welchen das Sonnenlicht vorbeigeht, und theils inflectirt theils deflectirt wird, zeigen durch Beihülfe einer solchen Loupe, nach Maßgabe der Entfernung des Beobachters von einem solchen Drahte, die schönsten Erscheinungen von parallelen farbigen Streifen, mit mehr oder weniger dunkeln Zwischenräumen, von deren Detail hier aber nichts im Auszuge mitgetheilt werden kann. Vorzüglich schön ist das farbige Spectrum auf einer mattgeschliffenen

Glastafel, wenn man das Sonnenlicht zwischen zwei nahe neben einander befindlichen parallelen scharfen Kanten zweier Metallplatten, welche sich durch eine Micrometerschraube mehr oder weniger einander nähern lassen, hindurch gehen läßt, und worüber man die mannichfaltigen Modificationen gleichfalls in der Abhandlung selbst nachsehen muß, da sie ohne Zeichnungen sich nicht hinlänglich verdeutlichen lassen. Einige Versuche, nach der Art, wie sie der Verfasser hier angestellt hat, lassen auf das deutlichste abnehmen, wie diese farbigen Streifen auf mannichfaltige Art über einander weggehen, und sich decken, je nachdem bei einerlei Abstand der Glastafel von jenen scharfen Kanten, die letztern einander mehr oder weniger genähert werden, und welchen Ursprung die constante Form, in welche bei einem gewissen Abstände jener Kanten von einander, zuletzt das farbige Spectrum übergeht, eigentlich habe. Es ist dieß Alles bisher noch nicht so deutlich erörtert worden, daß diese und mehr andere Versuche nicht zu einer nähern Kenntniß und Analyse dieser Erscheinungen einigen Beitrag liefern sollten. Aber freilich bleibt hiebei dennoch manches unerforst, worüber man vielleicht nie völlig ins Klare kommt. Daß die Phänomene der Inflexion, und der dabei entstehenden Farbensäume, Erfolge einer Attraction sind, wird wohl nicht zu bezweifeln seyn, auch wird hiebei, wie bei der Refraction, das rothe Licht schwächer als das violette inflectirt. Die Farbensäume bei der Deflexion entstehen gleichfalls durch jene Attraction, wie der Verf. ganz deutlich aus seinen Versuchen ableitet, wenn gleich die Ursache der Deflexion selbst noch sehr im Dunkeln liegt. Ob diese durch eine wirkliche Abstofsungs-

kraft, oder wie einige glauben, durch gewisse Atmosphären um die Körper herum u. dgl. hervorgebracht werde, muß man nach den jetzigen Kenntnissen noch unentschieden lassen, und noch schwieriger ist die Entstehung mehrerer Farbensäume mit den schwarzen oder dunkeln Zwischenräumen (woraus man folgern muß, daß hierbei die Polarität des Lichts selbst mit im Spiele ist, wie bei den zwei Strahlenbüscheln im Isländischen Krystall. Die von dem Verf. hierüber mitgetheilten Ansichten können noch zu einer neuen, aber freilich sehr mühsamen Reihe von Versuchen Anlaß geben. Es scheinen hiemit auch die in einem prismatischen Farbenbilde von Hrn. *Fraunhofer* beobachteten höchst merkwürdigen Streifen in Verbindung zu stehen. (M. s. *Gilberts Annal d. Physik*. B. 56. S. 278. \*) Elektricität, verschiedene Temperatur u. dgl. haben übrigens, nach den Beobachtungen des Verf., keinen merklichen Einfluß auf alle diese Erscheinungen. Zu diesen und mehr andern Versuchen hat sich der Verf. auch sehr vortheilhaft eines Werkzeugs bedient, welches er sich nach seiner Idee hat verfertigen lassen, um die vorzüglichsten durch die Inflexion und Deflexion des Lichts bewirkten Erscheinungen auch ohne Beihülfe eines dunkeln Zimmers und der von einem Sonnenmicroscop entlehnten Vorrichtungen und anderer Apparate, auf eine einfache und bequeme Weise darstellen zu können. Es besteht dieses Werkzeug, wie ein Fernrohr, aus in einander verschiebbaren etwa drei Zoll weiten Röhren, deren innere Fläche geschwärzt wird. Statt eines Objectivglases hat das Rohr vorn eine Vorrichtung, wie die obige, mit einer Mi-

\*) Vergl. dieses Journal B. 19. S. 77 u. f.

rometerschraube, um zwischen zwei scharfen Kanten einen dünnern oder dickern Büschel von Sonnenstrahlen oder eines andern Lichtes in das verdunkelte Rohr, welches gleichsam das dunkle Zimmer selbst vorstellt, gelangen zu lassen. Man richtet es auf einem schicklichen Stative gegen die Sonne, oder um kein Blendglas nöthig zu haben, auch nur gegen eine stark beleuchtete Wolke in der Nähe der Sonne, gegen die Flamme einer Argandischen Lampe, gegen eine von der Sonne beleuchtete weisse Wand, oder sonst einen hinlänglich hellen Gegenstand. Statt des Ocularglases hat das Rohr eine ähnliche Vorrichtung wie die vorhin angegebene an der Objectivöffnung, dergestalt, daß die scharfen Kanten, zwischen denen das Licht durchgeht, parallel mit denen an der Objectivöffnung gestellt werden, und also das Licht, welches vorn zwischen den scharfen Kanten in das Fernrohr gelassen wird, nun auch zwischen denen an der Ocularröhre hindurch zu gehen genöthigt ist. Bringt man nun das Auge ganz nahe an die letztere Vorrichtung vor die scharfen Kanten, so erblickt es in dem Rohre selbst die schönsten durch die Abbeugung des an diesen scharfen Kanten vorübergehenden Lichtes bewirkten, und durch dunkle Zwischenräume von einander getrennten farbigen Parallelstreifen, welche denn in Rücksicht ihrer Anzahl und Breite, auf mannichfaltige Art modificirt werden, je nachdem man durch Beihülfe der Micrometerschraube den Abstand der scharfen Kanten zunächst vor dem Auge gröfser oder kleiner macht. Der Abstand derselben an der Objectivvorrichtung darf nicht über  $\frac{1}{2}$  Linie heiragen. Nichts schöneres kann man sehen, als wenn man vermittelst eines um eine Axe in einer Verticalebene beweglichen, und

auf einem Fenstergesimse stehenden Prisma, einen Büschel rothen oder andern Lichtes durch die Objectivöffnung des Rohres gehen läßt. Wenn man bei den Vorrichtungen in dem gewöhnlichen dunkeln Zimmer, auf der matt geschliffenen Glastafel, welche die farbigen Spectra auffängt, nur sehr undeutlich *mehrere* als drei oder vier durch dunkle Zwischenräume von einander getrennten Farbensäume, auf beiden Seiten der Mittellinie des Spectrums wahrnimmt, so kann man da gegen vor jenem Rohre, in dem schönsten Glanze, und zwar in der Farbe des durchgelassenen prismatischen Lichtes, wohl 12 dergleichen auf beiden Seiten der Mittellinie des Spectrums wahrnehmen, welche durch pechschwarze Linien von einander getrennt sind. Das Auge bedarf hiebei keines Blendglases, wenn es jenem Glanze nur nicht zu lange ausgesetzt bleiben will. Die Oeffnung vorn an der Objectivröhre, darf zu diesem Zwecke nur höchstens  $\frac{1}{4}$  Linie weit seyn. Hier zeigt sich in dem Rohre also alles durch directes, und nicht erst durch einen Spiegel geschwächtes Licht, wie in dem dunkeln Zimmer. Daher die größere Deutlichkeit und Lebhaftigkeit, in der solche Phänomene des abgelenkten Lichtes, sich durch Beihülfe eines solchen Rohres dem Auge darstellen lassen. Eine bloße kreisrunde Oeffnung an der Objectivröhre ist minder tauglich als eine lange Oeffnung, weil im ersten Falle die farbigen Säume nur ganz kurz erscheinen. So hat denn der Verf. auch noch eine zweite Vorrichtung an diesem Rohre beschrieben, vermittelt deren sich bequem die Erscheinungen des an Drähten vorüber gehenden Lichts und der dadurch entstehenden farbigen Streifen wahrnehmen lassen, und diese Einrichtung gründet sich auf den Gebrauch der oben

ingeführten Loupe. Dafs dieses Rohr, dem der Verf. den Namen eines *Inflexioscops* ertheilen möchte, ein sehr bequemes Werkzeug ist, Liebhabern der Physik die vorzüglichsten Phänomene des inflectirten Lichtes bei Vorlesungen über diese Lehre und dergl. zeigen zu können, bedarf keines Beweises. Auf Bestellung kann man ein solches Werkzeug bei dem hiesigen Universitätsmechanicus *Apel* erhalten.

In der Versammlung der Societät der Wissenschaften im Dec. 1818. legte der Herr Hofrath *Stromeyer* nach gehaltener Vorlesung die chemische Untersuchung der natürlichen Boraxsäure von der Insel *Vulcano*, des Eisenpecherzes aus Sachsen und des *Picropharmacoliths* von *Riegelsdorf* in Hessen vor.

I. *Chemische Untersuchung der natürlichen Boraxsäure der Insel Vulcano.* Die Nachrichten, welche in dieser Abhandlung über das Vorkommen der natürlichen Boraxsäure auf der Insel *Vulcano* mitgetheilt werden, verdankt Hr. Hofr. *Stromeyer*, so wie auch die Gelegenheit dieses seltene Fossil einer genauen chemischen Untersuchung unterwerfen zu können, seinem verehrten Freunde und Verwandten Hrn. Dr. *Stromeyer* in Hamburg, welcher während seines Aufenthalts in Sicilien die Liparischen Inseln besucht, und dieses Mineral dort selbst gesammelt hat. Durch dieselben erhält nun auch die Vermuthung des den Wissenschaften leider zu früh entrissenen englischen Chemikers *Smithson Tennant*, dafs diese Säure auf den Liparischen Inseln natürlich gefunden werde (*Transact. of the Geological Society* Vol. I. p. 589) nicht nur volle Bestätigung, sondern wir erlangen dadurch auch erst eine genaue Kenntnifs des eigentlichen Fund-

orts dieses merkwürdigen Fossils, und der Art, wie es daselbst vorkommt. Nach den vom Hrn. Dr. *Stromeyer* gemachten Mittheilungen findet sich die Boraxsäure nur allein auf der Insel Vulcano. Sie kommt daselbst in einer Felsenhöhle vor, woraus heiße Quellen entspringen, und überzieht die Decke und Wände dieser Höhle in ziemlich mächtigen oft mehrere Zoll haltenden Lagen. Diese Lagen bestehen aus latter einzelnen sehr los unter einander zusammenhängenden krystallinischen Blättchen von Boraxsäure, die theils blofs stellenweis, theils schichtenweis Schwefel in bald größerer oder bald geringerer Menge eingemengt enthalten, und hier und da auch kleine Trümmer des Muttergesteins, welches aus einer durch Dämpfe zeretzten Lave besteht, eingeschlossen haben.

Die Boraxsäure-Blättchen verhalten sich, nach der damit vorgenommenen Untersuchung, durchaus wie reine Boraxsäure. Sie haben eine weiße Farbe, besitzen den dieser Säure eigenen Perlmutterglanz und sind mehr oder weniger durchsichtig. Auch fühlen sie sich sanft und fettig an, und hängen sich leicht an die Finger und andere Körper an. In einem Platinlöffel erhitzt zergehen sie zuerst in ihrem Krystallwasser, und schmelzen nachgehends, nachdem dasselbe verflüchtigt worden ist, zu einer vollkommen durchsichtigen Glasperle zusammen, die sich im Wasser vollständig wieder auflöst.

Im Alkohol lösen sich dieselben sehr leicht mit Hinterlassung des eingemengten Schwefels auf, und diese Auflösung angezündet breunt mit einer sehr schönen zeisigrünen Flamme.

Eben so leicht und vollständig werden sie auch von Wasser aufgenommen. Diese wässerige Auflösung



ist völlig farblos, reagirt nur schwach säuerlich und erleidet durch Versetzen mit Reagentien weder eine Fällung noch sonst eine Veränderung, aus welcher sich auf die Beimischung einer andern Substanz schliessen läßt. Nur salzsaurer Baryt und salpetersaures Blei verursachen darin eine höchst unbedeutende Trübung, welche auf Zusatz von Salpetersäure nicht wieder verschwindet, und also von einer Spur Schwefelsäure herührt.

Der mit der Boraxsäure vorkommende und ihr beigemengte Schwefel besitzt die Gestalt kleiner krystallinischer Körner, die häufigst ein deutlich geflossenes Ansehen haben, und von denen oft mehrere unter sich zusammengesintert sind. Diese Schwefelkörner bestehen aus reinem Schwefel, und nur diejenigen, welche noch Boraxsäure oder etwas von dem Muttergestein eingeschlossen enthalten, hinterlassen beim Abbrennen einen kleinen Rückstand.

Die Menge dieses der Boraxsäure eingemengten Schwefels ist sehr veränderlich. In manchen Exemplaren ist die Menge desselben so äußerst gering, daß derselbe von der Boraxsäure dergestalt eingehüllt wird, daß man ihn kaum wahrnimmt. Dagegen andre Exemplare wieder eine so große Menge davon enthalten, daß die Boraxsäure selbst dadurch ein ganz schwefelgelbes Ansehen erhält. Nach mehreren Versuchen fällt indessen der Schwefelgehalt etwa zwischen 5 und 20 Procent.

Die natürliche Boraxsäure der Insel Vulcano ist demnach dieser Untersuchung zufolge von dem Sasso-lin oder der natürlichen Boraxsäure, welche man zu Sasso im Florentinischen schon vor mehreren Jahren entdeckt hat, in Hinsicht der Beimischungen wesent-

lich verschieden, indem sie nur Schwefel eingemengt enthält. Dagegen nach *Klaproths* Untersuchung im Sassolin die Boraxsäure mit schwefelsaurem Mangan, Gyps und einer aus kohlensaurem Kalk, Kieselerde, Alaunerde und manganhaltigem Eisenoxyde bestehender Erde vermischt ist.

Ungeachtet dieser Verschiedenheit ist es dem Hofrath *Stromeyer* dennoch nicht unwahrscheinlich, daß die Boraxsäure der Insel Vulcano mit dem Sassolin einen gleichen Ursprung hat, und ebenfalls ihre Entstehung einer besondern Art von heißen Quellen verdankt, in welchen sie ursprünglich aufgelöst vorkommt. Nur in der Art der Ausscheidung scheinen beide verschieden zu seyn, und anstatt daß der Sassolin bloß durch Verdunsten des Wassers sich gebildet hat, ist jene durch die Kraft der Wasserdämpfe zugleich mit dem Schwefel sublimirt worden. Zwar ist es ihm durchaus unbekannt, ob die Quellen in der oben erwähnten Grotte auf der Insel Vulcano, worin die Boraxsäure vorkommt, diese Säure auch aufgelöst enthalten. Indessen scheint ihm das ganze Ansehen dieser Boraxsäure, der Umstand, daß sie Schwefel eingemengt enthält, und die Art, wie der Schwefel sich darin findet, zu sehr dafür zu sprechen, daß dieselbe nicht durch Auswittern sondern durch Sublimation entstanden ist.

(Die Fortsetzung folgt)

**Auszug**  
des  
**meteorologischen Tagebuches**

vom  
**Professor Heinrich**  
in  
**Regensburg.**

---

**Februar 1819.**

## B a r o m e t e r.

| Mo-<br>nats-<br>Tag. | Stunde,        | Maximum.                  | Stunde,         | Minimum.                   | M    |
|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| 1.                   | 8 A.           | 26' 8 <sup>'''</sup> , 85 | 4 F.            | 26'' 7 <sup>'''</sup> , 95 | 26'' |
| 2.                   | 10 A.          | 26 9, 11                  | 3. 4 A.         | 26 7, 80                   | 26   |
| 3.                   | 10 A.          | 27 0, 09                  | 5 F.            | 26 10, 42                  | 26   |
| 4.                   | 10 A.          | 27 0, 16                  | 3 A.            | 26 11, 33                  | 26   |
| 5.                   | 10 A.          | 27 0, 06                  | 2 A.            | 26 11, 74                  | 26   |
| 6.                   | 4 F.           | 26 11, 53                 | 4 A.            | 26 10, 46                  | 26   |
| 7.                   | 4 F.           | 26 11, 28                 | 10 A.           | 26 7, 96                   | 26   |
| 8.                   | 10 A.          | 27 0, 06                  | 4 F.            | 26 8, 46                   | 26   |
| 9.                   | 8. 10 A.       | 27 3, 46                  | 5 F.            | 27 0, 86                   | 27   |
| 10.                  | 4 F.           | 27 3, 05                  | 10 A.           | 27 1, 65                   | 27   |
| 11.                  | 10 F.          | 27 3, 01                  | 10 A.           | 27 2, 35                   | 27   |
| 12.                  | 4 F.           | 27 1, 55                  | 10 A.           | 26 8, 44                   | 26   |
| 13.                  | 10 A.          | 26 9, 53                  | 5 F.            | 26 6, 91                   | 26   |
| 14.                  | 10 A.          | 26 11, 00                 | 6 F.            | 26 9, 75                   | 26   |
| 15.                  | 8 A.           | 27 0, 91                  | 2 F.            | 26 11, 14                  | 26   |
| 16.                  | 10 F.          | 27 1, 10                  | 11 A.           | 27 0, 25                   | 27   |
| 17.                  | 4 F.           | 26 11, 89                 | 5 A.            | 26 10, 91                  | 26   |
| 18.                  | 10 A.          | 26 11, 92                 | 12 Mittag       | 26 10, 56                  | 26   |
| 19.                  | 5 F.           | 27 0, 12                  | 3. 5 A.         | 26 11, 01                  | 26   |
| 20.                  | 10 A.          | 27 0, 21                  | 4 F.            | 26 11, 53                  | 26   |
| 21.                  | 4 F.           | 26 11, 55                 | 8 10 A.         | 26 6, 65                   | 26   |
| 22.                  | 10 A.          | 26 10, 16                 | 2½ F.           | 26 6, 80                   | 26   |
| 23.                  | 10 F.          | 26 11, 74                 | 10 A.           | 26 9, 47                   | 26   |
| 24.                  | 12 Mittag      | 26 8, 15                  | 4 A.            | 26 7, 66                   | 26   |
| 25.                  | 8 A.           | 26 7, 61                  | 4. 6 F.         | 26 6, 85                   | 26   |
| 26.                  | 10 A.          | 26 8, 15                  | 6 F.            | 26 5, 80                   | 26   |
| 27.                  | 1½ F.          | 26 8, 08                  | 4 A.            | 26 7, 45                   | 26   |
| 28.                  | 11 F.          | 26 7, 60                  | 5 P.            | 26 7, 32                   | 26   |
| Im<br>ganz.<br>Mon.  | den<br>9ten A. | 27 3, 46                  | den<br>26ten F. | 26 5, 80                   | 26   |

| Barometer.  |             | Hygrometer. |             |              | W i n d e. |              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Ma-<br>nim. | Me-<br>dium | Ma-<br>xim. | Mi-<br>nim. | Me-<br>dium. | Tag.       | Nacht.       |
| -1,0        | -0,36       | 508         | 403         | 464,3        | N. O. 1    | O. N. 1. 2   |
| -0,2        | +0,65       | 492         | 431         | 461,5        | NW. 1      | W. 1         |
| -1,6        | -1,07       | 569         | 536         | 547,6        | SW. SO. 1  | SSO. 1       |
| -3,0        | -2,17       | 541         | 501         | 518,3        | SO. 1      | OSO. 1. 2    |
| -3,2        | -0,55       | 545         | 483         | 508,1        | SO. SW. 1  | SW. SO. 1    |
| -1,5        | -0,21       | 473         | 376         | 420,0        | OSO. 1     | OSO. 1       |
| +0,5        | +1,24       | 491         | 341         | 409,1        | OSO. 1     | SO. NW. 1    |
| +0,5        | +1,90       | 617         | 526         | 568,1        | WNW. 1     | W. 2         |
| +1,0        | +1,76       | 630         | 529         | 590,5        | WNW. 1     | SW. SO. 1    |
| -2,2        | 0,00        | 593         | 461         | 520,5        | OSO. 1     | SO. SW. 1    |
| 0,0         | +2,09       | 660         | 424         | 523,9        | WSW. 1. 2  | SW. 2        |
| +1,3        | +3,01       | 695         | 577         | 644,0        | SW. 2      | SW. NW. 3    |
| +0,6        | +1,99       | 643         | 585         | 608,7        | W. 2       | W. 2         |
| -1,0        | +0,20       | 628         | 571         | 597,0        | W. 2       | WNW. 2       |
| -0,2        | +0,21       | 630         | 595         | 608,6        | WNW. 2. 3  | WNW. 2. 1    |
| -3,0        | -0,60       | 643         | 556         | 601,2        | SW. SO. 1  | OSO. 1. 2    |
| -3,2        | -0,86       | 531         | 399         | 486,6        | OSO. 2     | OSO. 1       |
| +0,6        | +2,11       | 515         | 346         | 410,6        | SO. SW. 1  | SO. W. 1. 2  |
| +1,2        | +2,47       | 543         | 446         | 500,7        | OSO. 1     | OSO. W. 1    |
| -1,0        | -0,05       | 445         | 325         | 383,8        | O. 1       | OSO. 1       |
| 0,0         | +0,59       | 463         | 350         | 416,8        | OSO. 1     | OSO. 1       |
| +1,0        | +2,01       | 536         | 402         | 453,5        | OSO. 1     | OSO. 1       |
| -0,2        | +1,61       | 565         | 385         | 465,0        | OSO. 1     | OSO. 1       |
| +0,2        | +1,94       | 695         | 418         | 564,7        | SW. 1      | NO. NW. 1. 2 |
| 0,0         | +1,21       | 500         | 452         | 477,3        | N. 1.      | N. 2         |
| -0,7        | +0,42       | 533         | 422         | 477,0        | WNW. 2     | WSW. 2       |
| -3,0        | -1,56       | 615         | 523         | 562,9        | SO. 1      | WNW. 1       |
| -3,3        | -0,61       | 614         | 500         | 567,3        | NW. NO. 1  | WNW. 1       |
| -3,3        | +0,63       | 695         | 325         | 512,8        | -          | -            |

Monatstag.

Witterung.

Allgemeine  
Uebersicht  
der  
Witterung

|     | Vormittags.     | Nachmittags.   | Nachts.        |            |
|-----|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.  | Trüb            | Trüb.          | Trüb. Schnee.  | Heitere Ta |
| 2.  | Trüb. Schnee.   | Trüb. Schnee.  | Trüb.          | Schöne Tag |
| 3.  | Trüb.           | Trüb.          | Trüb.          | Vermischte |
| 4.  | Trüb.           | Trüb. Wind.    | Schnee, Trüb.  | Trube Tage |
|     | Trüb. Schnee.   | Trüb.          | Wind           | Tage mit W |
|     |                 |                | Trüb. Nebel.   | Tage mit S |
| 6.  | Trüb. Nebel.    | Trüb.          | Trüb. Nebel.   | Tage mit S |
| 7.  | Trüb. Nebel.    | Trüb.          | Trüb.          | Tage mit B |
| 8.  | Trüb.           | Trüb.          | Trüb. Wind.    | Tage mit E |
| 9.  | Trüb.           | Trüb.          | Trüb. Heiter.  |            |
| 10. | Trüb. Neblicht. | Trüb.          | Regen. Heiter. |            |
| 11. | Vermischt.      | Verm. Trüb.    | Trüb. Wind.    | Heitere Nä |
| 12. | Trüb.           | Trüb. Wind.    | Trüb. Sturm.   | Schöne Nä  |
| 13. | Trüb. Wind.     | Trüb. Wind.    | Trüb. Wind.    | Verm. Nä   |
|     |                 | Schnee, Regen. | Schnee.        | Trübe Nä   |
| 14. | Trüb. Schnee.   | Trüb. Schnee.  | Verm. Trüb.    | Nächte mit |
|     |                 |                | Wind. Schnee.  | Nächte mit |
| 15. | Trüb. Sturm.    | Trüb. Wind.    | Verm. Trüb.    | Nächte mit |
|     | Schnee.         | Schnee.        | Wind.          | Nächte mit |
| 16. | Trüb.           | Vermischt.     | Heiter.        | Nächte mit |
| 17. | Trüb. Schnee.   | Trüb. Nebel.   | Trüb. Nebel.   | Nächte mit |
|     |                 | Schnee.        |                |            |
| 18. | Trüb. Nebel.    | Trüb. Verm.    | Trüb. Heiter.  | Regen- und |
| 19. | Trüb. Verm.     | Trüb. Verm.    | Schön. Heiter. | Wasser-    |
| 20. | Reif. Nebel.    | Trüb. Nebel.   | Trüb. Nebel.   | nien.      |
|     | Trüb.           |                |                |            |
| 21. | Trüb. Schnee.   | Trüb.          | Trüb.          | Herrschend |
| 22. | Trüb. Nebel.    | Verm. Trüb.    | Trüb. Nebel.   | de OSO.    |
| 23. | Trüb. Nebel.    | Trüb.          | Trüb. Schnee.  |            |
| 24. | Trüb. Verm.     | Trüb. Schnee.  | Tr. Schnee. Wd | Zahl der   |
| 25. | Trüb. Schnee.   | Trüb. Nebel.   | Trüb. Regen.   | tungen-    |
|     |                 |                | Schnee.        |            |
| 26. | Trüb. Schnee.   | Trüb. Schnee.  | Trüb. Schnee.  |            |
| 27. | Schön.          | Vermischt.     | Trüb.          |            |
| 28. | Trüb.           | Trüb. Verm.    | Heiter         |            |

Sehr gemäßigter, ungemein feuchter Februar: dicke, tag un-  
 abhaltende Nebel durchzogen alles; Schnee in Uebermaass;  
 theils niedriger Barometerstand: und dennoch Ostwinde herrsch-  
 ten 284 Beobachtungen ergiebt sich: 75 Ostsudost: 28 Ost: 11  
 10 West: 26 Westnordwest: 18 Nordwest: 28 Sudwest u s  
 Den 21ten Februar 1819, 10½ U. früh, stirbt Coelestin  
 Lehner, der letzte Fürst-Abt des ehemaligen Reichstifts zu  
 Meran in Regensburg, im 82sten Lebensjahre: der erste Begr-  
 Meteorologie in Baiern.

Ueber die  
vorthellhafte Benutzung  
des  
brenzlichen Thieroels  
(*Oleum Cornu cervi foetidum*)

auf Berlinerblau.

vom

Dr. G. E. Hänle in Lehr.

Unter allen Erzeugnissen der Salmiakfabrikation ist das so abscheulich riechende, und in so großer Menge sich erzeugende Horn- oder Knochen-Oel das einzige Nebenprodukt, das bisher den Fabrikanten ungenutzt zur Last liegen blieb, so sehr sich auch mehrere technische Chemiker bemüht haben ihm einen ökonomischen Vortheil abzugewinnen. Als Oel, oder Harz, ist es, wegen seines unerträglichem Geruchs, durchaus nicht verkäuflich, und die wenigen Pfunde, die man jährlich an Materialisten und Apotheker verkaufen kann, kommen \*) in keinen Betracht.

\*) so wie das *Ol. animal.* Dipp.

## 312 Händle über die vortheilh. Benutzung

Es ist mir, nach wenigen Versuchen, gelungen, dieses Oel vortheilhafterweise auf Berlinerblau zu benutzen, und eine Blutlauge daraus zu gewinnen, welche der aus Horn oder Blut bereiteten an Güte ganz gleich kommt, und ein sehr schönes und feuriges Berlinerblau liefert.

Der Salmiakfabrikant kann nun auch aus Knochen-Oel Berlinerblau bereiten, und wenn schon die jährliche Ausbeute geringer ist, als von Horn- oder Blutkohle, so vermehrt sie doch seinen Gewinn, und setzt ihn in den Stand, sich dieses lästigen Products, mit beträchtlichem Nutzen; und ohne besondern Kostenaufwand, zu entledigen.

Dafs *Diesbach*; als er Florentinerlack, durch Niederschlagung vermittelt eines von *Dippel* erhaltenen Weinsteinsalzes, bereiten wollte, zufälligerweise einen blauen Niederschlag erhielt, hat einige Chemiker veranlaßt, das brenzliche Thieroel über Kali abzuziehen, und damit zu kochen, in der Hoffnung ein blausaures Kali zu erhalten. Allein diese, und alle Versuche, durch ein Verfahren auf nassem Wege den Zweck zu erreichen, waren fruchtlos, und mußten es seyn; denn wenn schon dieses Oel aus denselben Grundstoffen — Kohlen- Wasser- und Stickstoff — wie die Blausäure zusammengesetzt ist, so sind doch diese Stoffe in dem Oele, in einem andern Verhältniß und anders gemischt vorhanden, als in der Blausäure, und diese selbst setzt, um sich mit dem Kali verbinden zu können, einen chemischen Zustand desselben voraus, der nur in einer höheren Temperatur eintreten kann, und den wesentlichen Grund des nöthigen Glühens angiebt (S. meine Chemisch-technische Abhandlung über das Berlinerblau S. 21).



Auch muß man in Betrachtung ziehen, daß *Diesbach* bei seinem, die höchste Reinlichkeit erfordernden, Farbenprozeß das schmutzige, stinkende Kali, worüber mehrmals Thieroel abgezogen wurde, in diesem Zustande nicht hätte anwenden können. und daß es also vorher von ihm, oder wahrscheinlich von *Dippels* selbst, durch *Ausglühen* gereinigt, und dadurch blausaures Kali gebildet wurde.

Diese Ansicht hat mich zurückgehalten auch nur einen einzigen derartigen Versuch anzustellen, vielmehr glaubte ich meine Absicht auf einem einfachern und kürzern Wege zu erreichen, und der Erfolg hat meine Erwartung bestätigt: daß nur durch das Verbrennen des brenzlichen Thieroels und Glühen der erhaltenen Kohle mit Kali, auf dem gewöhnlichen Wege, blausaures Kali erhalten werden könne.

Der Zweifel, ob sich der Stickstoff im Oele nicht in einem zu geringen Verhältniß zu den übrigen Stoffen befinden möge, habe ich mir durch die Vermuthung gehoben, daß, da beim Verbrennen die atmosphärische Luft zerlegt wird, der Sauerstoff die Kohle oxydiren, und noch soviel Stickstoff hinzutreten werde, als zur Blausäure-Bildung erforderlich seyn möchte, zu welcher Annahme ich mich durch *F. C. Vogels* vortreffliche Versuche berechtigt fand. (*S. Schweiggers Journal f. Chemie u. Physik* 4n Bds 10 Hft. S. 88 u. 89.)

„Eine Unze thierischer Kohle“, die er in einem Flintenlaufe geglüht und mit dem atmosphärischen Gas in Verbindung gesetzt hatte, „absorbirte  $4\frac{1}{2}$  Kubikzoll von diesem Gas. Das rückständige Gas enthielt weder Wasserstoff noch kohlen-saures Gas, war aber ebenfalls stark desoxydirt. Auch gab diese Kohle

## 244 Händle über die vorthheilh. Benutzung

nach vollendeter Absorption, kein Gas von sich, wohl aber fand, während der Absorption, Ammoniakbildung, statt; darum konnte sich auch, nach der Absorption, kein Stickgas aus der Kohle entbinden, weil dieses (zum Theil) mit dem Wasserstoffe der Kohle zur Bildung von Ammoniak verwendet wurde. Da die thierischen Kohlen als hydrogenirte Stickstoffkohlen angesehen werden müssen, und die Kohle des Bluts bei diesem Versuche, aussër dem Stickstoff, auch sehr viel Sauerstoff angezogen hat, so kann letzterer theils zur Oxydirung des, in der Kohle befindlichen, zum Theil, beim Glühen, durch die Kohle reducirten Eisens (eine richtige Bemerkung) theils auch zur Oxydation des Kohlenstoffes, und zur Bildung des Ammoniaks (nach *Berzelius*) verwendet worden seyn. *Dann kann auch ein Theil des Ammoniaks von der Selbstzersetzung der beim Glühen gebildeten Blausäure herkommen.*“

Und so ist es auch; denn offenbar half der, aus der Atmosphäre zur Kohle getretene Stickstoff Blausäure bilden, welche, in erhöhter Temperatur, zum Theil wieder zerstört wurde, und Ammoniak erzeugte.

Abgeleitet von dieser Erfahrung, konnte ich mit aller Wahrscheinlichkeit schliessen: dafs der atmosphärische Stickstoff mit dem im Oele in so grossem Uebermaafs befindlichen Kohlen- und Wasserstoff sich chemisch verbinden, und als quantitativer Beitrag zur Blausäurebildung wesentlich mitwirken werde.

Ich habe dieses Oel in einem hiezu eingerichteten, mit einem guten Rauchfange versehenen Ofen, der zugleich die Vermeidung alles übeln Geruchs bezweckt, verbrannt, und eine Kohle erhalten, welche

vor der, auf Salmiakhütten, durch Destillation der thierischen Substanzen in verschlossenen Gefäßen, erhaltenen *Schmelze* oft großen Vorzug hat, indem ein gleiches Quantum mehr Eisen blau färbt, bei weniger Alaun eine größere Menge Berlinerblau in schönster Qualität, und überhaupt immer gleiche Resultate liefert, und zwar aus begreiflichen Gründen: der Salmiakfabrikant beabsichtigt möglichst viel Ammoniak zu gewinnen, wozu eine große Glühhitze erforderlich ist; wodurch aber die in der Hohlle erhaltene Blausäure zum Theil wieder zerstört wird, und als Ammoniak entweicht, und auch ein anderes Verhältniß der Kohle zum Stickstoff eintritt.

Die umständliche Beschreibung des Verfahrens, Einrichtung der Oefen, Berechnung des Gewinnes etc. wird nächstens in der *Hermannschen* Buchhandlung in Frankfurt erscheinen, unter dem Titel: *Technisch-ökonomische Verbesserungen der Berlinerblau-Fabrikation*, als Nachtrag zum 2ten Bdchen meiner *Chemisch-technischen Abhandlungen*.

Chemiker können sich durch Anwendung des brenzlichen Thieroels, in kurzer Zeit, ein blausaures Kali, als Reagens, bereiten, ohne dem mindesten stinkenden Geruche ausgesetzt zu seyn. Ein 8 bis 16 Unzen haltender hessischer Schmelztiegel wird zur Hälfte mit diesem Oele gefüllt, und zwischen glühenden Kohlen erhitzt. So wie das Oel anfängt zu steigen, wird es angezündet, mit einer Zange vom Feuer hinweg und auf den Heerd gestellt; dann wird sogleich ein, etwa 1½ Schuh hohes, in einem Knie, oder rechten Winkel auslaufendes, und auf unterlegten Steinen ruhendes, gewöhnliches Ofenrohr darüber gestürzt, welches, zur Verlängerung des Rauchfangs, am äussern

Ende mit einem Bogen Rackpapier umwickelt und von einer steinernen Unterlage getragen wird.

Von Zeit zu Zeit wird wieder Oel nachgegossen, und wenn solches abgebrannt ist, wobei man nicht den geringsten widrigen Geruch empfindet — vorausgesetzt, daß der Tiegel unter einem gutziehenden Schornstein steht — so bringt man die pechartige Masse wieder aufs Feuer, und läßt sie schwach durchglühen, bis sich ein brauner Rauch erhebt, und etwas von der Masse, auf einen kalten Körper gebracht, sogleich erhärtet, schwammig, geruchlos und bröcklicht ist.

Diese Kohle wird hierauf sogleich, in demselben Tiegel, mit reinem Kali geschmolzen, und weiters auf bekannte Art verfahren.

247

---

N a c h t r a g  
zu dem Aufsätze  
über  
P o l a r i t ä t  
u n d  
doppelte Strahlenbrechung  
der Krystalle;  
v o m  
Professor Bernhardt.

---

**A**ls ich diesen Aufsatz abgesandt hatte, wurde mir erst die neuerdings gemachte Entdeckung bekannt, daß der Arragonit zwei unterschiedene Arten von ungewöhnlicher Strahlenbrechung besitze: die eine nämlich senkrecht, die andere parallel mit der Achse des sechseitigen Prisma. Um zu sehen, wie weit dies mit meiner Theorie in Uebereinstimmung stand, prüfte ich wiederholt und mit aller Sorgfalt die Polarität desselben, und fand, daß derselbe nach zwei Richtungen eine Ungleichheit der magnetischen Achsen bemerkbar läßt, und daher der Theorie zu Folge allerdings auch

## 248 Bernhardt über Polarität und doppelte

nach zwei Richtungen die Bilder verschieben muß. Es sind nämlich überhaupt zwölf magnetische Achsen im Arragonit vorhanden. Neun derselben bewirken die doppelte Strahlenbrechung senkrecht mit der Achse des Prisma, wovon eine eben dieser Achse entspricht, und die acht übrigen von den vier ähnlichen Kanten und Ecken der Endflächen zu den entgegengesetzten gehen, und zwar fallen auf die eine Endfläche alle positive und auf die andere alle negative Pole. Die ungewöhnliche Brechung, parallel mit der Achse des Prisma, wird bloß durch drei magnetische Achsen bewirkt, die je zwei gegenüberliegende Seitenflächen senkrecht durchschneiden. Von den ersten neun Achsen sind also vier und vier einander ähnlich, und bloß die neunte, welche der Achse des Prisma entspricht, ist einzig in ihrer Art, während von den letzten nur zwei in Hinsicht ihrer Lage und Größe einander gleichen, und die dritte sich verschieden verhält. In dieser ausgezeichneten Lage der magnetischen Achsen liegt unstreitig auch der Grund, warum der Arragonit ein anderes Gefüge nach der Richtung der Achse des Prisma, als in der Richtung von einer Seitenfläche zur andern zeigt, und daher der Länge nach gespalten, auf den Durchschnitt eine kreuzförmige Figur wahrnehmen läßt. Das Kreuz im Chialolith entsteht aus einer ähnlichen Ursache.

Es ist übrigens nicht bloß der Arragonit, der sich von dem Kalkspath durch die Zahl und die Lage seiner magnetischen Achsen unterscheidet, sondern auch andere Mineralien, in welchen der kohlensaure Kalk den wesentlichen Bestandtheil ausmacht, weichen in diesen Stücken zum Theil ab, selbst wenn die Durchgänge der Blätter vollkommen dieselben bleiben.

Der Bitterspath z. B. besitzt vier magnetische Achsen, wovon eine durch die beiden Ecken des Rhomboëders geht, und die übrigen drei je zwei gegenüberliegende Seitenkanten senkrecht durchschneiden. Bei dem sogenannten Spatheisenstein bemerkt man zwar ebenfalls vier magnetische Achsen, wovon eine durch die beiden Ecken der Grundform läuft, die vier übrigen durchschneiden dagegen die Flächen des Rhomboëders senkrecht. Von dem Spatheisenstein muß aber sorgfältig ein anderes Mineral unterschieden werden, das in Hinsicht seiner chemischen Zusammensetzung eine Verbindung von kohlensaurem Kalk mit kohlensaurem Talk und kohlensaurem Eisenoxydul zu seyn scheint, wozu oft noch kohlensaures Manganoxyd kommt. Dieses, auch durch andere äussere Kennzeichen nicht schwer zu erkennende Mineral, das bisher noch von keinem Mineralogen gehörig abge sondert wurde (wiewohl das, was man *Perlspath* genannt hat, größtentheils dahin zu gehören scheint, und dieser Name auch zu seiner Bezeichnung beibehalten werden könnte), kommt in seiner Polarität ganz mit dem reinen kohlensauren Kalk überein; zwischen dem, was man nach *Hany* als Eisenkalk und Eisenbraunkalk zu trennen gesucht hat, scheinen dagegen durchaus keine scharfen Gränzen vorhanden zu seyn.

Der sächsische Braunspath zeichnet sich ebenfalls durch seine Polarität sehr aus: er vereinigt nämlich die magnetischen Achsen des Kalkspaths mit denen des Bitterspaths, und bekommt daher dieselben sieben. Wodurch er sich aber in Hinsicht seiner chemischen Bestandtheile unterscheidet, wissen wir leider noch nicht mit völliger Bestimmtheit. Der Ungarische Braunspath weicht davon sehr wesentlich sowohl in Hinsicht

## 250 Bernhardi über Polarität und doppelte

der magnetischen Achsen, als in andern äussern Kennzeichen ab; dabei ist dasjenige, was man unter diesem Namen zusammengefasst hat, nicht einmal von einerlei Natur. Mancher nämlich, der mit Salpetersäure lebhaft aufbraust, scheint bloß eine Abänderung des gemeinen kohlensauren Kalks zu seyn, und der übrige, welcher sich in Salpetersäure langsam und mit schwacher Gasentwicklung auflöst, gehört zu dem manganhaltigen Perlspath. Auch einiges, was man in Sachsen für Braunspath ausgiebt, muß an dieses Mineral angeschlossen werden.

Die in Absicht auf Gefüge so merkwürdige Abänderung des kohlensauren Kalks, welche ich in *Geolens Journal* (6r Bd. S. 140) beschrieb, und von der wir ebenfalls das Mischungsverhältniß noch nicht kennen, besitzt drei magnetische Achsen, wovon zwei die vier Flächen, welche die vollkommensten Durchgänge der Blätter bilden, und die dritte den etwas unvollkommenen Durchgang senkrecht durchschneidet, so daß also dieses Mineral sich auch durch seine Polarität vor allen andern Arten des kohlensauren Kalks unterscheidet. Dies scheint auch mit dem Schieferspath der Fall zu seyn; nur ist es bei seinem verworrenen Gefüge schwer auszumitteln.

Wenn nun aus dem Angeführten sich ergibt, daß die Polarität mit dem Mischungsverhältnisse oft im engsten Bezuge steht, so können wir doch, so lange uns die chemischen Analysen noch nicht vollkommene Aufklärung über die wesentlichen Bestandtheile dieser verschiedenen Mineralkörper gegeben haben, nicht als ausgemacht ansehen, daß dies überall der Fall sey. Es machen vielmehr schon mehrere Erfahrungen gegenwärtig wahrscheinlich, daß sich zwei



Stoffe bloß durch die verschiedene Verbindung, welche sie mit den beiden magnetischen Materien eingegangen sind, unterscheiden können. So läßt sich z. B. schwerlich annehmen, daß in dem reinen Kalkspath und in der reinen Kreide ein anderes Mischungsverhältniß Statt finde (wenigstens hat dies die von *Bucholz* unternommene Analyse beider Substanzen nicht gelehrt), und gleichwohl verhält sich die Kreide bloß positiv magnetisch, während der Kalkspath und selbst der dichteste Kalkstein vier positive und vier negative Pole bemerken läßt. Ja selbst der Karlsbader Erbsenstein zeigt sie noch, und muß daher so gut, wie der dichte Kalkstein, eigentlich als eine Anhäufung äusserst kleiner krystallinischer Theile, die sämmtlich dieselbe Lage besitzen, angesehen werden. Eben so scheint der wesentliche Unterschied zwischen Diamant und Kohle darauf zu beruhen, daß in jenem der Kohlenstoff mit positiver, in dieser mit negativer magnetischer Materie verbunden ist. Auch der Quarz giebt ein Beispiel, daß die magnetischen Achsen eine andere Lage annehmen können, ungeachtet in der Mischung durchaus kein Unterschied mit Wahrscheinlichkeit sich annehmen läßt. Der Quarz besitzt nämlich nicht bloß acht, sondern vierzehn Pole, oder sieben magnetische Achsen, indem ausser den acht Ecken des Triangular-dodekaëders auch seine sechs Seitenkanten sich wie Pole verhalten, und zwar so, daß an einem positiven oder negativen Pole, der auf die Kanten fällt, immer ein gleichnamiger an einer der sie begränzenden Ecken liegt, während an der andern ein ungleichnamiger bemerkt wird, wodurch dann im Umfange der gemeinschaftlichen Basis der doppelt-sechseitigen Pyramide überall zwei gleichnamige Pole an einander gränzen,

## 252 Bernhardi über Polarität und doppelte

und zwei positive mit zwei negativen sechsmal wechseln. Bei genauerer Prüfung einer gewissen Anzahl von Krystallen wird man nun noch den Unterschied bemerken, daß, wenn man ihnen sämmtlich die gleiche Lage giebt, (z. B. sie so hält, daß der positive Pol an der einen Endecke des Triangulardodekaeders bei alten abwärts gerichtet ist), bei dem einen neben den positiven oder negativen Polen an den Kanten die gleichnamigen auf den Ecken zur rechten Hand liegen, während sie bei den andern zur linken fallen, und daß nach diesem Unterschied sich auch die Aufsetzung der kleinern von *Hauy* mit  $u$  und  $x$  bezeichneten \*) Flächen richtet. Die Krystalle sind nämlich im ersten Falle in Hinsicht dieser kleinen Flächen links und im zweiten rechts gewunden. Da nun in einer und derselben Gruppe von Krystallen manche sich auf diese, andere auf jene Weise verhalten, ohne daß man weiter einen Unterschied zwischen ihnen bemerkte, so ist es höchst unwahrscheinlich, daß sie in Hinsicht ihrer Mischung von einander abweichen sollten. — Alles dies läßt uns vermuthen, daß auch in andern Fällen der Unterschied zwischen zwei Krystallisationen nicht von einer Verschiedenheit der Bestandtheile, sondern bloß von der verschiedenen Verbindung mit den beiden magnetischen Materien bedingt werde; und so lange daher noch manche chemische Untersuchungen (wie neuerdings wieder die von *Laugier* angestellten) einigen Zweifel übrig lassen, ob auf der Beimischung von kohlensaurem Strontian der wesentliche Unterschied in der Krystallisation zwischen Kalkspath und

---

\*) *Annales du Muséum* T. II, p. 99.

## Strahlenbrechung der Krystalle. 253

Arragonit beruhe, darf der Gedanke nicht ganz aufgegeben werden, daß derselbe überhaupt nicht von den wägbaren Bestandtheilen, sondern bloß von den verschiedenen magnetischen Verhältnissen abhängig sey.

Noch halte ich es für nöthig zu bemerken, daß, wenn ich die allgemeine Bedingung der doppelten Strahlenbrechung in der Ungleichheit der magnetischen Achsen suche, ich damit nicht behaupten will: bei jeder Ungleichheit der Art wären auch doppelte Bilder wahrzunehmen. Sie fehlen vielmehr jederzeit, sobald jene Achsen zwar ungleich sind, aber in Hinsicht ihrer Lage und Anzahl ein gewisses Ebenmaas beobachten. Zum Beweise dient der Quarz, von dessen magnetischen Polen so eben die Rede war. Bei der Ungleichheit der magnetischen Achsen, die bei ihm durch die Seitenecken und Seitenkanten des Triangulardodekaeders gehen, müßte sich nothwendigerweise doppelte Strahlenbrechung parallel mit der Achse der Grundform zeigen, wenn die Symmetrie in Hinsicht der Zahl und Lage dieser sechs magnetischen Achsen es nicht hinderte. Die Verrückung der Bilder hat daher bloß nach den beiden Eudecken des Triangulardodekaeders Statt, durch welche eine magnetische Achse geht, die einzig in ihrer Art ist. Aus demselben Grunde zeigt auch der Arragonit nur zwei verschiedene Arten von doppelter Brechung, ungeachtet bei der Brechung senkrecht mit der Achse des Prisma die Ziehkkräfte von dreierlei magnetischen Achsen in Anschlag gebracht werden müssen, wovon aber vier und vier die gehörige Symmetrie besitzen.

Ueber die  
isothermischen Linien,

VON

Alexander von Humboldt.

(Nach dem Auszuge in den Annales de Chimie et de Physique T. V. S. 102 übersetzt vom Dr. Fabry, Sekretär der physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen.)

Der Leser wird am Ende des Heftes eine Karte finden, die wir dem Herrn von Humboldt verdanken, auf welcher er durch Zeichnung einige seiner merkwürdigen Resultate über die Gestalt und Lage der isothermischen Linien, oder der Linien von gleicher Wärme, dargestellt hat. Um die Einsicht darüber zu erleichtern, werden wir einen kurzen Auszug des Aufsatzes beifügen, welchen dieser berühmte Reisende in einem Band der Memoires von Aruceil, der so eben erschienen ist, hat einrücken lassen.

Der Gegenstand, womit uns Hr. von Humboldt hither bekannt macht, nicht theoretisch sondern gemäß den neuesten Beobachtungen, ist die Vertheilung der Wärme auf dem Erdball. Zu dem Ende prüft er anfangs die verschiedenen Methoden, denen die Physiker bei der Bestimmung der mittlern Temperatur gefolgt sind.

Die *mittlere Temperatur eines Tages* ist, mathematisch diesen Ausdruck genommen, das Mittel der correspondirenden Temperaturen aus allen Zeitabschnitten, aus denen ein Tag zusammengesetzt ist.

Wenn man eine *Minute* für die Dauer eines dieser Zeitabschnitte annähme, so würde man durch  $1440 = 24 \times 60$  die Summe der 1440 thermometrischen Beobachtungen, die von Minute zu Minute unternommen wurden, dividiren, und man erhielte so die gesuchte Zahl: die Summe aller dieser einzelnen Resultate, durch 365 dividirt, würde die *mittlere Temperatur des Jahres* geben.

Da aber im Allgemeinen die größten Unterschiede thermometrischer Veränderungen an einem Tage sich sehr nahe kommen, so sieht man ein, daß die nämlichen Wärmegrade einer großen Anzahl von Zeitabschnitten zukommen werden, deren jeder auf das zu entscheidende Mittel nach Maafsgabe seines Werthes und seiner Dauer Einfluß hat. Demnach kann man jene Mittelzahl mit Genauigkeit erhalten, selbst wenn die Zeit zwischen den einzelnen Beobachtungen viel länger ist, als wir so eben hier angenommen haben.

Hr. von Humboldt hat aus diesem Gesichtspunkt mehrere Reihen von thermometrischen Beobachtungen, die von Stunde zu Stunde und zu verschiedenen Jahreszeiten unter dem Aequator und zu Paris vorgenommen wurden, genau untersucht. Er verglich die nach der vorbergehenden Methode berechneten Mittelzahlen, wobei die Dauer jeder einzelnen Temperatur in Rechnung kam, mit denen, welche auf die sonst gewöhnliche Weise erhalten werden. Es ging daraus hervor, daß die halbe Summe der höchsten und niedrigsten Temperatur eines jeden Tages (nämlich die um

2 Uhr Nachmittags und die beim **Aufgang** der Sonne, im Allgemeinen nur um einige Zehntelgrade von der strengberechneten Mittelzahl abweicht, und an deren Stelle gesetzt werden kann.

Indem Herr von *Humboldt* eine große Menge von Beobachtungen, die er zwischen den  $46^{\circ}$  und  $48^{\circ}$  der Breite machte, zusammenrechnet, hat er gefunden, daß der einzige Zeitraum beim Niedergang der Sonne eine mittlere Temperatur giebt, welche nur um einige Zehntelgrade von derjenigen verschieden ist, welche aus den Beobachtungen beim **Aufgang** der Sonne und den um 2 Uhr Nachmittags abgeleitet wurde.

Da es selten ist, daß Reisende an jedem Orte Gelegenheit haben, Beobachtungen in hinreichender Anzahl zu sammeln, um daraus die mittlere Temperatur des Jahres ableiten zu können, so war es wichtig nachzusuchen, welche Monate sie uns unmittelbar verschaffen können. Die folgende Tafel zeigt, daß hie selbst zu großen Breitengraden, die Monate April und October, aber vorzüglich der letztere, diese Eigenheit haben.

| Orte.          | Mittlere Temperatur. |                     |                     | Orte.          | Mittlere Temperatur. |                    |                    |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                | des Jahres.          | des Octobers.       | des Aprils.         |                | des Jahres.          | des Octobers.      | des Aprils.        |
| Caire . . .    | 22 <sup>o</sup> , 4  | 23 <sup>o</sup> , 4 | 25 <sup>o</sup> , 5 | Götingen .     | 8 <sup>o</sup> , 3   | 8 <sup>o</sup> , 4 | 6 <sup>o</sup> , 9 |
| Alexer . . .   | 21 <sup>o</sup> , 9  | 22, 3               | 17, 0               | Franneker .    | 11, 3                | 12, 7              | 10, 0              |
| Naschex . .    | 18, 9                | 20, 2               | 19, 1               | Copenhagen     | 7, 6                 | 9, 3               | 5, 0               |
| Rom . . .      | 15, 8                | 16, 7               | 13, 0               | Stockholm.     | 5, 7                 | 5, 8               | 3, 6               |
| Mailand . .    | 13, 2                | 14, 5               | 13, 1               | Christiana.    | 5, 9                 | 4, 0               | 5, 9               |
| Cincinnati .   | 12, 0                | 12, 7               | 15, 8               | Upsala . . .   | 5, 4                 | 6, 3               | 4, 3               |
| Philadelphia   | 11, 9                | 12, 2               | 12, 0               | Quebec . . .   | 5, 5                 | 6, 0               | 4, 2               |
| New York . .   | 11, 9                | 12, 2               | 12, 0               | Petersburg.    | 5, 8                 | 5, 9               | 4, 2               |
| Pekin . . .    | 10, 6                | 11, 5               | 9, 5                | Abé . . . . .  | 5, 2                 | 5, 0               | 4, 0               |
| Oden . . . .   | 10, 6                | 11, 3               | 9, 5                | Dronkheim.     | 4, 4                 | 4, 0               | 3, 3               |
| London . . .   | 11, 0                | 11, 3               | 8, 9                | Uléé . . . . . | 4, 4                 | 3, 5               | 1, 2               |
| Genf . . . . . | 10, 5                | 10, 7               | 9, 6                | Umo . . . . .  | 4, 7                 | 3, 2               | 1, 1               |
| Dublin . . . . | 9, 2                 | 9, 3                | 7, 4                | Casp-Nord.     | 0, 0                 | 0, 0               | -1, 0              |
| Edinburg . .   | 8, 8                 | 9, 0                | 8, 3                | Enontekies.    | -2, 8                | -2, 5              | -3, 0              |
|                |                      |                     |                     | Nana . . . . . | -3, 1                | +0, 6              | -2, 5              |

Die mittlern Temperaturen der Jahre sind viel gleicher als man nach dem Zeugniß unserer Sinne und der verschiedenen Ergiebigkeit der Ernten annehmen möchte. Die größten Abweichungen betragen kaum 2° der hunderttheiligen Scale.

In Paris waren die mittlere Temperaturen  
 Jahre 1805 bis 1851: + 10° 8' . . . 11° 1' . . . 9° 4'  
 . . . 11° 9' . . . 10° 8' . . . 10° 5' . . . 10° 5' . . . 10°  
 . . . 11° 5' . . . 9° 9' . . . 9° 9' . . . 9° 7' . . . 10°  
 . . . 9° 4'

Zu Genua war in den Jahren 1805 — 1851  
 mittlere Temperatur: + 10° 2' . . . 10° 6' . . . 8° 7'  
 . . . 10° 8' . . . 9° 6' . . . 8° 5' . . . 9° 4' . . . 10° 8'  
 . . . 10° 9' . . . 8° 8' . . . 9° 3' . . . 9° 0' . . . 10° 8'

Die Differenzen zwischen den Mittelzahlen der  
 Monate Januar steigen bis 7°, die des Monats August  
 erreichen selten 4°.

### Von der Zeichnung isothermischer Linien.

Nachdem wir mit Genauigkeit den Sinn, der  
 mit dem Ausdrucke mittlere Temperatur zu verbindet  
 ist, angezeigt haben, können wir uns mit der Zeich  
 nung der *isothermischen Linien*, oder der Linien glei  
 cher Wärme, beschäftigen. Man wird von einigen a  
 kleine Übertlichkeiten gebundenen Unregelmäßigkeiten  
 absehen, wie z. B. denjenigen, welche man auf de  
 Küsten des mittelländischen Meeres zwischen Marseill  
 Genua, Lucca und Rom bemerkt. Es wird späterhi  
 von Nutzen seyn, sie in detaillirten Karten zusamme  
 zufassen. „Die Zeichnung dieser Mittellinien, sag  
 Herr von Humboldt, wird viel Licht über Erscheinun  
 gen verbreiten, die für den Ackerbau und für den g  
 gesellschaftlichen Zustand der Einwohner von hohe  
 Wichtigkeit sind. Wenn wir anstatt der geographi  
 schen Karten nur Tafeln besäßen, welche die Coord  
 naten der Breite, der Länge und der Höhe enthi  
 ten, so wäre eine große Anzahl merkwürdiger Ve



hältnisse, welche das feste Land in seiner Gestalt und den Ungleichheiten seiner Oberfläche darstellt, für immer unbekannt.“

Um die isothermischen Linien zu ziehen, muß man die Orte auf dem Globus suchen, deren mittlere Temperaturen sich am meisten  $0^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ , oder  $15^{\circ}$  nähern. Man wird bei dem ersten Anfang schon getraut, ob die Linien von Süden nach Norden an diesem oder jenem Orte sich hinziehen; um aber solches genau nach den Graden der Breite zu bestimmen, muß man die gewöhnlichen Interpolations-Methoden zu Hülfe nehmen, mit Hülfe der nach Beobachtungen entworfenen Tafeln, woraus für verschiedene Meridiane, einerlei Höhe über der Meeresfläche vorausgesetzt, sich ergibt, in welcher Art die jährliche mittlere Temperatur von Süden gegen Norden hin abnimmt.

Einem Gradunterschied in der mittlern jährlichen Temperatur entsprechen in verschiedenen Zonen folgende Breitengrade:

|                                                               | In der neuen Welt innerhalb den Längen von $70^{\circ}$ bis $80^{\circ}$ östlich. | In der alten Welt innerhalb den Längen von $3^{\circ}$ bis $17^{\circ}$ westlich. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| wischen $30^{\circ}$ und $40^{\circ}$ nördlicher Breite . . . | $1^{\circ}$ , $24'$                                                               | $2^{\circ}$ , $50'$                                                               |
| — $40^{\circ}$ — $50^{\circ}$ —                               | $1^{\circ}$ , $6'$                                                                | $1^{\circ}$ , $24'$                                                               |
| — $50^{\circ}$ — $60^{\circ}$ —                               | $1^{\circ}$ , $18'$                                                               | $1^{\circ}$ , $48'$                                                               |

Gemäß diesen Daten und den genauesten Mitteln, die zu erhalten waren (deren 30 auf der Tafel

S. 257 angeführt sind) endlich auch mit Rücksicht auf die Höhe der Orte, wo die Beobachtungen vorgenommen wurden, fand Hr. von Humboldt, daß

die isothermische Linie von  $0^{\circ}$  aus  $3^{\circ}, 54'$  südlich von Nam in Labrador durch das Centrum von Lappland und  $1^{\circ}$  nördlich von Uleó durch Solikamsky geht.

Die isothermische Linie von  $5^{\circ}$  geht  $0^{\circ}, 5$  nördlich von Quebec;  $1^{\circ}$  nördlich von Christiania;  $0^{\circ}, 5$  nördlich von Upsala; durch Petersburg und Moscau.

Die isothermische Linie von  $10^{\circ}$  geht durch  $42^{\circ} \frac{1}{2}$  in den vereinigten Staaten;  $1^{\circ}$  südlich von Dublin;  $0^{\circ}, 5$  nördlich von Paris;  $1^{\circ}, 5$  südlich von Franecker;  $0^{\circ}, 5$  südlich von Prag;  $1^{\circ}, 5$  nördlich von Ofen;  $2^{\circ} \frac{1}{2}$  nördlich von Peking.

Die isothermische Linie von  $15^{\circ}$  geht  $4^{\circ}, 5$  nördlich von Natchez durch Montpéllier;  $1^{\circ}$  nördlich von Rom; und  $1^{\circ}, 5$  nördlich von Nangasacki.

Die isothermische Linie von  $20^{\circ}$  geht  $2^{\circ}, 5$  südlich von Natchez;  $50'$  nördlich von Funchal; und so viel man aus den Materialien, welche wir besitzen, schliessen kann, durch den  $33^{\circ}, 5$  der Breite unter dem Meridian von Cypem. Wir haben von den mittlern Temperaturen zu Algier und Cairo keinen Gebrauch gemacht, weil der Sand, von dem sie umgeben sind, sie um  $1^{\circ}$  oder  $2^{\circ}$ , wie es uns vorkommt, erhöht.

Aus diesen Daten geht hervor, daß die Knoten der isothermischen Linien, oder ihre Durchschnitte mit den Parallelen des Aequators, folgende Lage haben:

Isothermischer Streifen von  $0^{\circ}$ : Länge  $94^{\circ}$  W.; Breite  $54^{\circ}, 12'$ ; — Länge  $63^{\circ}, 40'$  W.; Br.  $53^{\circ}, 15'$

— Länge  $18^{\circ} 30'$  O.; Br.  $65^{\circ} 15'$ ; — L.  $23^{\circ}$  O.; Br.  $66^{\circ} 20'$ ; — L.  $56^{\circ}$  O.; Br.  $62^{\circ} 12'$ . Ein Zweig geht längs der nördlichen Küsten durch die Länge  $18^{\circ}$  O., Br.  $70^{\circ}$ ; L.  $23^{\circ}$ ; Br.  $73^{\circ}$ .

*Isothermischer Streifen von  $5^{\circ}$  L.  $75^{\circ} 30'$  W.; Br.  $47^{\circ} 20'$  — L.  $5^{\circ}$  W. Br.  $62^{\circ}$  — L.  $3^{\circ}$  O. Br.  $61^{\circ} 15'$  — L.  $15^{\circ} 18'$  O. Br.  $60^{\circ} 20'$  — L.  $20^{\circ}$  O. Br.  $59^{\circ} 57'$ ; — L.  $35^{\circ} 12'$  O. Br.  $57^{\circ} 45'$ .*

*Isothermischer Streifen von  $10^{\circ}$  L.  $86^{\circ} 40'$  O.; Br.  $41^{\circ} 20'$  — L.  $75^{\circ} 30'$  W. Br.  $42^{\circ} 45'$  — L.  $8^{\circ} 40'$  W. Br.  $52^{\circ} 20'$  — L.  $5^{\circ}$  W. Br.  $51^{\circ}$  — L.  $3^{\circ}$  W. Br.  $52^{\circ}$  — L.  $6^{\circ}$  Br.  $51^{\circ}$  — L.  $14^{\circ}$  O. Br.  $49^{\circ} 30'$  — L.  $16^{\circ} 40'$  O. Br.  $48^{\circ} 50'$  — L.  $114^{\circ}$  O. Br.  $43^{\circ} 30'$ .*

*Isothermischer Streifen von  $15^{\circ}$  L.  $93^{\circ}$  W. Br.  $56^{\circ}$  — L.  $1^{\circ}$  O. Br.  $43^{\circ} 30'$  — L.  $9^{\circ}$  O. Br.  $43^{\circ}$  — L.  $127^{\circ} 30'$  O. Br.  $36^{\circ} 15'$ .*

*Isothermischer Streifen von  $20^{\circ}$  L.  $96^{\circ}$  W. Br.  $29^{\circ}$  — L.  $19^{\circ} 15'$  W. Br.  $55^{\circ} 40'$  — L.  $28^{\circ}$  O. Br.  $35^{\circ} 50'$ .*

Wirft man einen Blick auf die Fig. 1, der Kupfertafel, so sieht man, wie die isothermischen Linien von den Parallelkreisen der Erde abweichen. Ihre convexen Gipfel in Europa befinden sich beinahe unter dem nämlichen Meridian.

Diese Linien in westlicher Richtung von jenen Punkten aus neigen sich gegen den Aequator, mit welchem sie beinahe, bis an die atlantischen Küsten der neuen Welt, und bis gegen Osten des Mississippi und des Missouri, parallel bleiben; ohne Zweifel erheben sie sich alsdann wieder jenseits der Felsenberge auf den entgegengesetzten Küsten von Asien, zwischen dem 35 und 55 Grad der Breite. Man weiß in der That,

dafs man längs dem Kanal von St. Barbara, in Neu-Californien, den Oelbaum mit Erfolg cultivirt, und dafs zu Noutka, beinahe in der nämlichen Breite von Labrador, vor dem Monat Januar auch die kleinsten Flüsse nicht einfrieren.

Die hier beigefügte Tafel thut auf eine nicht weniger auffallende Art dar, dafs, von Europa nach Osten hin, die isothermischen Linien sich von neuem senken.

|             | Br. Mittlere Temp. |          | Br. Mitl. Temp.   |
|-------------|--------------------|----------|-------------------|
| Sanct Malo, | 48°, 39' + 12°, 5  | Wien     | 48°, 11' + 10°, 3 |
| Amsterdam,  | 52°, 22' + 11°, 9  | Warschau | 52°, 14' + 9°, 2  |
| Neapel,     | 40°, 50' + 17°, 4  | Pekin    | 39°, 54' + 12°, 7 |
| Copenhagen  | 55°, 41' + 7°, 6   | Moscau   | 55°, 45' + 4°, 5  |
| Upsala,     | 59°, 51' + 5°, 5   | Petersb. | 59°, 56' + 5°, 8  |

(Die Höhe von Pekin ist wenig beträchtlich. Die von Moscau beträgt 300 Meter.)

Es wäre unnütz, bei allgemeinen Folgerungen zu verweilen, welche beim ersten Anblick der Karte sich ergeben; wir wollen jetzt nur einige Resultate erwähnen, welche die Kleinheit des Maafsstabes nicht leicht aufzufinden erlaubt. — Zu der Bemerkung, welche man schon seit mehr als einem Jahrhundert machte, dafs die Temperaturen in der ganzen Ausdehnung einer jeden Erdparallele nicht gleich sind, und, dafs 70° der Länge östlich oder westlich vom Pariser Meridian entfernt, das Klima viel kälter wird, kann man noch hinzufügen, dafs die Unterschiede zwischen den Temperaturen der Oerter, die unter den nämlichen Parallelkreisen liegen, nicht in allen Breiten gleich beträchtlich sind.

| Br.   | Mittl. Temp. im<br>Westen der<br>alten Welt,<br>in | Mittl. Temp. im<br>Osten der<br>neuen Welt | Unterschiede.           |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 50°N. | 21°,4 Hunderth.<br>Sc.                             | 19°,4 Hunderth.<br>Sc.                     | 2°,0 Hun-<br>derth. Sc. |
| 40°   | 17, 5                                              | 12, 5                                      | 4,8                     |
| 50°   | 10, 5                                              | 3, 3                                       | 7,2                     |
| 60°   | 4, 8                                               | -4, 6                                      | 9,4                     |

Man wird das Gesetz der Abnahme der mittleren Temperaturen in folgender Tafel finden:

|              |                     |      |             |      |
|--------------|---------------------|------|-------------|------|
| Von 0° — 20° | Br. in d. alt. Welt | 2°;  | in d. neuen | 2°   |
| — 20° — 30°  | - - - - -           | 4°;  | - - - - -   | 6°   |
| — 30° — 40°  | - - - - -           | 4°;  | - - - - -   | 7°   |
| — 40° — 50°  | - - - - -           | 7°;  | - - - - -   | 9°   |
| — 50° — 60°  | - - - - -           | 5°,7 | - - - - -   | 7°,9 |

Die Zone in den beiden Welten, wo die Abnahme der mittleren Temperaturen am schnellsten ist, befindet sich zwischen den Parallelkreisen des 40 und 45ten Grades. „Dieser Umstand, sagt Hr. von Humboldt, muß einen günstigen Einfluß auf Cultur und Kunstfleiß derjenigen Völker, welche die jenem mittleren Parallelkreis benachbarten Länder bewohnen, haben. Es ist der Punkt, wo die Gegenden des Weinstocks, die der Oliven- und Citronenbäume berühren. Nirgends außerdem auf der Erdkugel, von Norden nach Süden hin, sieht man die Temperaturen merklicher zunehmen. Nirgends folgen auch die verschiedenen Erzeugnisse des Pflanzenreichs, und die mancherlei Gegenstände des Ackerbaues rascher auf einander. Daher belebt der große Unterschied der Erzeugnisse aus den Ländern der benachbarten Himmelsstriche den Handel, und vermehrt die Industrie der Ackerbau treibenden Völker.“

Der Leser wird leicht bemerken, daß in der kalten Zone unter dem Parallelkreis von  $30^{\circ}$ , die isothermischen Linien nach und nach unter einander und mit dem Aequator der Erde parallel werden, so daß die schon seit langer Zeit angenommene Meinung: die alte Welt sey wärmer als die neue, selbst unter den Tropen, keinen Grund hat.

Mittlere Temp.

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Senegambia | (Br. $14^{\circ}, 41'$ N.) | $26^{\circ}, 5$ |
| Madras     | (Br. $13^{\circ}, 5'$ N.)  | $26^{\circ}, 9$ |
| Batavia    | (Br. $6^{\circ}, 12'$ S.)  | $26^{\circ}, 9$ |
| Manilla    | (Br. $14^{\circ}, 36'$ N.) | $25^{\circ}, 6$ |
| Cumana     | (Br. $10^{\circ}, 28'$ N.) | $27^{\circ}, 7$ |
| Antillen   | (Br. $16^{\circ}$ N.)      | $27^{\circ}, 5$ |
| Vera Cruz  | (Br. $19^{\circ}, 13'$ N.) | $25^{\circ}, 6$ |
| Havanna    | (Br. $23^{\circ}, 9'$ )    | $25^{\circ}, 6$ |

Nach der Erklärung, welche wir von mittlerer Temperatur gegeben haben, ist es klar, daß eine Quantität von jährlicher Wärme an unterschiedenen Orten sehr ungleich unter die verschiedenen Jahreszeiten vertheilt seyn kann. Die folgende Tafel zeigt, wie die Winter und Sommer unter einander auf allen isothermischen Linien von dem  $28^{\circ}$  und  $30^{\circ}$  nördlicher Breite bis zu den Parallelkreisen des  $55^{\circ}$  und  $60^{\circ}$  verschieden sind. Man wird auch bemerken, daß in den beiden Streifen der alten und neuen Welt, welche zwei verschiedene Systeme von Klimaten bilden, die Vertheilung der jährlichen Wärme zwischen Sommer und Winter dergestalt geschieht, daß auf der isothermischen Linie von  $0^{\circ}$  der Unterschied der zwei Jahreszeiten beinahe das Doppelte von demjenigen ist, den man auf der isothermischen von  $20^{\circ}$  bemerkt.

|                     | Strich                            |             |             |                     | Strich                           |             |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--|--|
|                     | diesscits des atlantischen Meeres |             |             |                     | jenseits des atlantischen Meeres |             |  |  |
|                     | Länge 50° westl. und 15° östl.    |             |             |                     | Länge 60 — 74° westl.            |             |  |  |
| Isothermische Linie | Mittlere Temperatur               |             | Unterschied | Mittlere Temperatur |                                  | Unterschied |  |  |
|                     | des Winters                       | des Sommers |             | des Winters         | des Sommers                      |             |  |  |
| 20°                 | 15°                               | 27°         | 12°         | 12°                 | 27°                              | 15°         |  |  |
| 15°                 | 7                                 | 25          | 16          | 4                   | 26                               | 22          |  |  |
| 10°                 | 2                                 | 20          | 18          | — 1                 | 25                               | 23          |  |  |
| 5°                  | — 4                               | 16          | 30          | — 10                | 19                               | 32          |  |  |
| 0°                  | — 10                              | 12          | 22          | — 17                | 12                               | 30          |  |  |

Wenn man anstatt, wie hier oben, die mittleren Temperaturen der Jahreszeiten zu betrachten, die mittleren Temperaturen des kältesten und wärmsten Monats nimmt, so ist das Zunehmen der Unterschiede noch viel größer, als wir so eben gefunden haben.

Die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten scheinen an die Gestalt der isothermischen Linien gebunden zu seyn; sie sind weniger groß bei dem concaven Gipfel als bei den concaven Gipfeln, so daß die nämliche Ursache, welche die Kurven gegen die Pole erhebt, auch die Temperaturen der Jahreszeiten auszugleichen strebt. Da die mittlere Wärme des Jahres dem Viertel der thermometrischen Summe der Winter-, Frühling-, Sommer- und Herbst-Temperaturen gleich ist, so haben wir z. B. auf der nämlichen isothermischen Linie von 12° am concaven Gipfel in Amerika (77° Länge westlich von Paris):

Der Leser wird leicht bemerken, daß in der heissen Zone unter dem Parallelkreis von  $30^{\circ}$ , die isothermischen Linien nach und nach unter einander und mit dem Aequator der Erde parallel werden, so daß die ~~1949~~ seit langer Zeit angenommene Meinung: die alte Welt sey wärmer als die neue, selbst unter den Tropen, keinen Grund hat.

Mittlere Temp.

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Senegambia | (Br. $14^{\circ}, 41'$ N.) | $26^{\circ}, 5$ |
| Madras     | (Br. $13^{\circ}, 5'$ N.)  | $26^{\circ}, 9$ |
| Batavia    | (Br. $6^{\circ}, 12'$ S.)  | $26^{\circ}, 9$ |
| Manilla    | (Br. $14^{\circ}, 36'$ N.) | $25^{\circ}, 6$ |
| Cumana     | (Br. $10^{\circ}, 28'$ N.) | $27^{\circ}, 7$ |
| Antillen   | (Br. $16^{\circ}$ N.)      | $27^{\circ}, 5$ |
| Vera Cruz  | (Br. $19^{\circ}, 13'$ N.) | $25^{\circ}, 6$ |
| Havanna    | (Br. $23^{\circ}, 9'$ )    | $25^{\circ}, 6$ |

Nach der Erklärung, welche wir von mittlerer Temperatur gegeben haben, ist es klar, daß eine Quantität von jährlicher Wärme an unterschiedenen Orten sehr ungleich unter die verschiedenen Jahreszeiten vertheilt seyn kann. Die folgende Tafel zeigt, wie die Winter und Sommer unter einander auf allen isothermischen Linien von dem  $28^{\circ}$  und  $30^{\circ}$  nördlicher Breite bis zu den Parallelkreisen des  $55^{\circ}$  und  $60^{\circ}$  verschieden sind. Man wird auch bemerken, daß in den beiden Streifen der alten und neuen Welt, welche zwei verschiedene Systeme von Klimaten bilden, die Vertheilung der jährlichen Wärme zwischen Sommer und Winter dergestalt geschieht, daß auf der isothermischen Linie von  $0^{\circ}$  der Unterschied der zwei Jahreszeiten beinahe das Doppelte von demjenigen ist, den man auf der isothermischen von  $20^{\circ}$  bemerkt.



|                     | Strich                           |             |             |                     | Strich                           |             |     |  |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-----|--|
|                     | diessits des atlantischen Meeres |             |             |                     | jenseits des atlantischen Meeres |             |     |  |
|                     | Länge 50° westl. und 15° östl.   |             |             |                     | Länge 60 — 74° westl.            |             |     |  |
| Isothermische Linie | Mittlere Temperatur              |             | Unterschied | Mittlere Temperatur |                                  | Unterschied | 15° |  |
|                     | des Winters                      | des Sommers |             | des Winters         | des Sommers                      |             |     |  |
|                     | 20°                              | 15°         | 27°         | 12°                 | 12°                              | 27°         | 15° |  |
|                     | 13                               | 7           | 25          | 16                  | 4                                | 26          | 22  |  |
|                     | 10                               | 3           | 20          | 18                  | — 1                              | 23          | 25  |  |
|                     | 5                                | — 4         | 16          | 20                  | — 10                             | 19          | 32  |  |
|                     | — 10                             | — 12        | 12          | 17                  | — 12                             | 19          | 30  |  |

Wenn man anstatt, wie hier oben, die mittleren Temperaturen der Jahreszeiten zu betrachten, die mittleren Temperaturen des kältesten und wärmsten Monats nimmt, so ist das Zunehmen der Unterschiede noch viel grösser, als wir so eben gefunden haben.

Die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten scheinen an die Gestalt der isothermischen Linien gebunden zu seyn; sie sind weniger groß bei den concaven Gipfeln als bei den concaven Gipfeln, so daß die nämliche Ursache, welche die Kurven gegen die Poles erhebt, auch die Temperaturen der Jahreszeiten auszugleichen strebt. Da die mittlere Wärme des Jahres dem Viertel der thermometrischen Summe der Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbst-Temperaturen gleich ist, so haben wir z. B. auf der nämlichen isothermischen Linie von 12° am concaven Gipfel in Amerika (77° Länge westlich von Paris):

Die *Breite*, die *Höhe* in unsern Klimaten  
 sind *aus* *dem* *Widerstande* *der* *Luft*  
 Herr von Humboldt hat daraus folgende  
*abgeleitet*

| Breite | Äquatorealzone |         |
|--------|----------------|---------|
|        | von 0°         | von 30° |
| 174    | + 27, 5        | + 12    |
| 194    | + 21, 8        | + 5     |
| 204    | + 18, 4        | -       |
| 204    | + 14, 3        | -       |
| 300    |                |         |
| 274    |                |         |

In der zweiten Figur verhält sich der  
 der Breiten zu dem der Höhen wie 1 zu 1

In einem der folgenden Hefte werden wir  
 die Abhandlung, die merkwürdigen  
 die sie über die vergleichbaren Temperaturen  
 und Luft unter verschiedenen Breiten ent  
 wickeln, und die physikalische Erklärung  
 welche uns Hr. von Humboldt über das Wied  
 steigen der isothermischen Linien an den  
 Küsten der alten und neuen Welt gegeben

Aus derselben Abhandlung ist die Tafel genom  
 men, die am Ende des Hefes findet.

Es ist zu bemerken, dass die Tafel  
 die die Breiten und Höhen zeigt, die  
 die isothermischen Linien an den Küsten  
 der alten und neuen Welt gegeben

|   |      |                                                                                                                                                                                                              |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | <p>17,1, Herbst 10°,4. Arago.<br/>T. Cotte- Strafsburg Br. 48°,54'</p>                                                                                                                                       |
|   | 18,0 | <p>F. II. 453) Cavendish (Trans. 1788.<br/>Kirwan haben die 4 Jahreszeiten<br/>°,4, wornach London 10°,9, Paris<br/>on 10°,7 für Paris 11°,3 an). Die<br/>wird, hängen weniger von der m.<br/>immels ab.</p> |
| 5 | 18,2 | <p>dissons 11°,9; Rethel 11°,8, Metz<br/>Maine</p>                                                                                                                                                           |

as.  
 suk  
 r E  
 ,  
 fag  
 em  
 the  
 n,

| Date | Description | Amount |
|------|-------------|--------|
| 1912 | Jan 1       | 100.00 |
| 1913 | Jan 1       | 100.00 |
| 1914 | Jan 1       | 100.00 |
| 1915 | Jan 1       | 100.00 |
| 1916 | Jan 1       | 100.00 |
| 1917 | Jan 1       | 100.00 |
| 1918 | Jan 1       | 100.00 |
| 1919 | Jan 1       | 100.00 |
| 1920 | Jan 1       | 100.00 |
| 1921 | Jan 1       | 100.00 |
| 1922 | Jan 1       | 100.00 |
| 1923 | Jan 1       | 100.00 |
| 1924 | Jan 1       | 100.00 |
| 1925 | Jan 1       | 100.00 |
| 1926 | Jan 1       | 100.00 |
| 1927 | Jan 1       | 100.00 |
| 1928 | Jan 1       | 100.00 |
| 1929 | Jan 1       | 100.00 |
| 1930 | Jan 1       | 100.00 |
| 1931 | Jan 1       | 100.00 |
| 1932 | Jan 1       | 100.00 |
| 1933 | Jan 1       | 100.00 |
| 1934 | Jan 1       | 100.00 |

Ueber die

## Entwicklung der Salze

aus den

gediegenen Verbindungen,

vom

Professor Meinecke in Halle.

Die Veranlassung zu dieser Abhandlung ist eine Aeusserung von *Bischof* in dessen *Stoichiometrie*

„*Meinecke* irrt recht sehr, wenn er meint, es sey  
„seiner chemischen *Stereometrie* eigenthümlich,  
„gezeigt zu haben, daß in den Salzen nicht al-  
„lein die Sauerstoffmengen, sondern auch die Ra-  
„dicale der Säure und der Base in einem einfa-  
„chen Raumverhältnisse zu einander stehen. Er  
„hat weiter nichts gezeigt, als daß die brennba-  
„ren Radicale eines Salzes in demselben gemäß  
„den stöchiometrischen Tafeln enthalten sind, und  
„dies ist es, was schon vor ihm bekannt war.“

Ehe ich die Unrichtigkeit dieser nicht gut ausgedrückten Stelle erweise, bemerke ich, daß der erste

Theil meiner chemischen-Messkunst zwar auf dem Titelblatt die Jahrzahl 1815 trägt, daß aber dessen Druck schon 1814 besorgt und nur wegen einer Hinderung erst 1815 vollendet worden ist. Auch habe ich, wie öffentliche Nachrichten in dem Allgem. Anzeiger und in der Hall. A. L. Z. beweisen, den Inhalt desselben schon 1814 in der Hallischen naturforschenden Gesellschaft vorgetragen. Allein auch im Jahre 1815 war die neuere Stöchiometrie noch in ihrem Beginnen: kaum waren erst die höchstverdienstlichen Arbeiten von *Berzelius* und *Dalton* bekannt geworden, aber stöchiometrische Tafeln, wie wir sie seitdem von *Wollaston* u. A. erhalten haben, und wovon *Bischof* redet, waren noch nicht vorhanden. Ueberhaupt war damals der Umfang der Stöchiometrie noch nicht sichtbar, und manches Gesetz derselben, das jetzt allgemein geworden, kaum noch geahnet. Und zur Erörterung und Verbreitung der Stöchiometrie glaube ich beigetragen zu haben, indem ich zuerst die neuern Ansichten zu einem System durchgeführt in einem besondern Werke, so unvollkommen dieses auch seyn mag, darstellte.

Ich leitete zuerst mit einiger Consequenz, wie es mir scheint, die Bildung der Salze aus den gediegenen Verbindungen ab, oder um meinen eigenen Ausdruck zu wiederholen, ich liefs aus den einfachen gediegenen Verbindungen die Salze „aufblühen.“ *Berzelius* hatte schon gezeigt, daß in mehreren schwefelsauren Salzen der Schwefel in dem Verhältniß der Thioide vorkommt: dies sage ich Ch. M. I. 46 ff. ausdrücklich und berufe und stütze mich darauf; auch hätte *Berzelius* ohne allen Zweifel meine Idee weit besser als ich durchführen können, wenn er es für

gut befunden hätte; allein er gab seiner Bemerkung keine Folge, vielleicht weil er in den von ihm vorzüglich untersuchten Arten von Schwefeleisen und Schwefeleisensalzen abweichende Schwefelverhältnisse fand; er ließ sie fallen, um dafür die chemische Proportionslehre aufzustellen, nach welcher in jeder Art von Salzen ein besonderes Verhältniß zwischen dem Sauerstoff der Säure und der Grundlage herrscht. Die Gesetze der Proportionslehre sind sehr wichtig und haben zur Beförderung der Stöchiometrie wesentlich beigetragen; aber indem für jede Art der verschiedenen Salze besondere und zahlreiche Gesetze aufgestellt wurden, so geschah es, daß man damals, nämlich noch in den Jahren 1814 und 1815, vor lauter Gesetzen fast die Gesetzmäßigkeit aus den Augen verlor, und daß selbst geübte Denker, wie der treffliche *Vogel*, in der Proportionslehre von *Berzelius* nur eine mehr entwickelte Oxydationstheorie erblickten. Ich frage *Bischof* selbst, ob auch jetzt schon, nämlich im Jahre 1819, alle Stöchiometer sich es deutlich und klar bewußt sind, wie den sämtlichen Gesetzen der Proportionslehre der Salze nur ein einziges allgemeineres zum Grunde liegt, woraus die besondern sich von selbst ergeben?

Ich wandte daher auf die Darstellung der stöchiometrischen Verhältnisse der Salze meine besondere Aufmerksamkeit: ich stellte den Carboniden, Thioiden, Phosphoroiden, den Haloiden (Jodin und Blausstoff waren noch nicht bekannt) und auch den Metalllegirungen und mineralischen gediegenen Körpern ihre entsprechenden Salze gegenüber, ich suchte deren Entwicklung aus ihren gediegenen Grundlagen vermittelt der Bestandtheile des Wassers zu erläutern durch

Tabellen, Exempel, Schemata, Formeln u. s. w. (es scheint mir aber doch nicht gelungen zu seyn, da *Bischof* mich mißversteht), — immer aber mit Zuziehung der Proportionslehre der Salze, die dadurch nur um so fester begründet und dann von den häufig vorkommenden Ausnahmen der einzelnen Gesetze nicht mehr erschüttert werden konnte.

Es sind nämlich mehrere Hauptsätze der Proportionslehre nicht haltbar. *Berzelius* selbst hat jetzt das Hauptgesetz, daß in den Salzen das Verhältniß zwischen dem Sauerstoff der Säure und der Base durch eine ganze Zahl bestimmt wird, wieder aufgehoben, indem es sogar für die neutralen Salze nicht allgemein gültig ist; denn z. B. die neutralen phosphorsauren Salze enthalten in der Säure  $2\frac{1}{2}$  Mal den Sauerstoff der Basis. In den basischen und sauren Salzen sind die Verhältnisse noch verwickelter und schwieriger zu übersehen, wenn man sie nach den Sauerstoffgehalten bestimmt. Alle Schwierigkeiten und Verwickelungen aber verschwinden, wenn man auf die einfachen Verhältnisse der gediegenen Radicale in den Salzen zurückgeht.

Ferner giebt es in vielen Salzen kein Verhältniß von Sauerstoff zu Sauerstoff, sondern nur von Wasserstoff zu Sauerstoff. Und wenn man auch in dem Jodin und Halogen mit *Berzelius* einen Sauerstoffgehalt zulassen will, so ist dies doch bei dem jetzigen Stande der Chemie für das Cyanogen und das Hydrothion nicht gut möglich. Es erfordern also die Wasserstoffsalze wieder eine Beschränkung eines Hauptgesetzes der Proportionslehre, und somit eine neue Theilung und Vermehrung ihrer Gesetze.

Endlich scheint es auch allmählig Zeit zu wer-



den, die übertriebenen Begriffe von der Wichtigkeit des Oxygens etwas herabzustimmen, nachdem wir immer deutlicher sehen, wie der Wasserstoff, das Halogen, der Blausstoff, der Schwefel, Phosphor u. s. w. oft die Rolle des Sauerstoffs übernehmen, und daß es sogar Salze und salzartige Verbindungen giebt, die weder in der Basis noch in der Säure Oxygen enthalten. Zur Berichtigung chemischer Begriffe, besonders für den Anfänger, würde es dienen, wenn selbst der Name Oxygen oder säurender Stoff mit einem schicklichern vertauscht würde.

Das Grundgesetz der Salzbildung (doch noch nicht das allgemeinste), welches die Proportionslehre in sich schließt, ist nun aber folgendes (zunächst für die Sauerstoffsalze):

Wenn in einer gediegenen (sauerstofffreien) Verbindung der eine Bestandtheil, welcher die Grundlage bildet, sich mit Sauerstoff in demselben Grade verbindet, in welchem der Grundbestandtheil mit dem zweiten Bestandtheile verbunden ist, so entsteht ein neutrales Salz: eine basische Verbindung des Radicals bringt ein basisches und eine übersättigte Verbindung des Radicals bringt bei gleicher Oxydation ein saures Salz hervor, die Stufe der Säuerung, wozu sich der zweite Bestandtheil erhebt, sey welche sie wolle.

Dieser Grundsatz ist bloß für Sauerstoffsalze gültig, nun kann aber die Stelle des Sauerstoffs auch der Wasserstoff, der Stickstoff u. s. w. vertreten, selbst ein zusammengesetzter Stoff, wie das Cyanogen kann durch den Zutritt zu einer gediegenen (die Elektrizität leitenden) Verbindung ein Salz im weitern Sinne bilden; das allgemeine Gesetz für die Salzbildung ist also folgendes:

Der Zutritt eines salzbildenden Stoffs zu der Grundlage einer gediegenen Verbindung in einem dieser Verbindung analogen Grade giebt analoge Salze; aus neutralen Thioiden, Phosphoroiden, Haloiden, Arseniden, Antimoniden, Chromiden, Cyaniden u. s. w. entwickeln sich neutrale, aus basischen Verbindungen basische und aus übersättigten Verbindungen des Radicals saure Salze, und zwar genau in dem Grade der gediegenen Verbindungen, bei gleicher Menge des salzbildenden Stoffs der Grundlage, der Oxygengehalt oder überhaupt der salzbildende Gehalt der Säure sey, welcher er wolle.

Welches die analogen Grade sind, lehrt die Stöchiometrie: sie fängt damit an, indem schon die Bestimmung der Werthe der einfachen Stoffe eine Kenntniss ihrer analogen Verbindungs-Grade voraussetzt. Sind sie in der Natur nicht vorhanden, oder durch Kunst noch nicht dargestellt worden, so muß man sie durch Schlüsse finden.

Der Sauerstoffgehalt, oder der salzbildende Gehalt der Säure eines Salzes ist zwar nicht gleichgültig, es hängt vielmehr von demselben eben sowohl als von der Natur der Salzradicale und von den Verhältnissen dieser Radicale zu einander und zu dem Salzstoff der Grundlage die Natur eines Salzes ab, aber sobald nur die Benennung eines Salzes, worin jene Verhältnisse ausgesprochen werden, gegeben ist, so ist auch der Gehalt der Säure bekannt, indem dieser ebenfalls schon durch die ersten Grundlehren der Stöchiometrie und Chemie angegeben wird.

Es sey z. B. ein Schwefelsalz und zwar zunächst bloß ein Sauerstoff- oder Wasserstoffschwefelsalz von irgend einem Grade und irgend einem Metalle zu be-

stimmen, so ist bekannt, daß ein Metall mehrere salzfähige Oxydations- und Hydrogenisationsstufen und in demselben Maasse auch mehrere analoge salzfähige Schwefelungsstufen haben kann. Dieser Schwefel aber tritt ganz unabhängig von der Salzbildung ganz für sich in mehreren Stufen der Säuerung durch Oxygen und Hydrogen auf, die aus der Kenntniß des Schwefels bekannt sind und nun wieder in den Salzen vorkommen. Ist nun bei der Umbildung eines Schwefelmetalls durch Salzstoff, hier durch Wasser, in dem zum Salze sich erhebenden Schwefelmetall der Schwefel in einem solchen Grade gegenwärtig, daß dieser mit dem analogen Oxydations- oder Hydrogenisationsgrade der Grundlage zusammentrifft, so muß ein neutrales Schwefelsalz entstehen, mag der Schwefel sich nun zum ersten, zweiten oder dritten Grade oxydiren oder sich hydrogenisiren. Nimmt aber die Grundlage z. B. den zweiten Grad der Oxydation an, während der mit der Grundlage verbundene Schwefel nur den ersten Schwefelungsgrad darstellt, so muß ein basisches Salz entstehen; dagegen muß sich ein saures Salz bilden, wenn die Grundlage auf einer höhern Schwefelungsstufe steht, als der Oxydationsgrad der Grundlage angiebt; es sey denn, daß die Grundlage den Ueberschuß von Schwefel abwirft, oder sich ebenfalls zu einem der Schwefelungsstufen entsprechenden Oxydationsgrade erhebt; der Schwefel mag sich zur hyposchwefeligen, schwefeligen oder Schwefel-Säure, oder zu Hydrothion- und Hypohydrothionsäure ausbilden, was auf die Salzstufe keinen Einfluß hat, sondern nur die Natur des Schwefelsalzes näher bestimmt.

Dies ist im folgenden Schema der Schwefelsalze



In diesem Schema, das indess nach dem Charakter eines Metalls zusammengezogen, oder ausgedehnt wird, sind alle möglichen neutralen, basischen und sauren Wasserstoff- und Sauerstoff-Schwefelsalze enthalten. Sind auch nicht bei einem jeden, oder auch bei keinem einzigen Metalle diese sämtlichen Stufen der Schwefelung, Oxydirung und Wasserstoffung vorhanden, so zeigen sie sich doch in der Metallreihe überhaupt, und für einige Metalle, wie für Eisen, müssen sogar noch einige Mittelstufen eingeschoben werden.

Der Anblick dieses Schema zeigt nun zuerst, wie viele neutrale Schwefelsalze blois durch das Wasser entstehen können. Fänden sich jene Grade der Schwefelung, Sauer- und Wasserstoffung sämtlich bei Einem Metalle, so würde es, da der Schwefel sich in drei Graden mit dem Sauerstoff und in zwei Graden mit dem Wasserstoff säuert, schon allein 48 mögliche neutrale Schwefelsalze eines einzigen Metalls geben, wenn nicht wieder ein Theil dieser Salze, der durch die Metallung der Schwefelmetalle (durch die basischen Thioide) entsteht, mit den Salzen der zweiten, dritten und vierten Schwefelungsordnung zusammenfiel. Denn ein Antheil Metall verbindet sich, vermöge der Voraussetzung, auf der einen Seite mit  $1; 2\frac{1}{2}; 3$  und  $5$  Antheilen Schwefel, und wieder mit  $1; 1\frac{1}{2}; 2$  und  $3$  Sauerstoff. Kommen zu diesen vier Oxydationsgraden des Metalls noch 2 Hydrogenisationsgrade, so entstehen durch diese 6 Grundlagen mit einer einzigen Säure des Schwefels eben so viele neutrale Salze. Da aber der Schwefel bekanntlich mit dem Sauerstoff drei und mit dem Wasserstoff zwei Säuren giebt, so bringen diese 5 Säuren mit jenen 6 Grund-

legen 50 neutrale Salze hervor, wenn das Verhältniß des Sauerstoffs und Wasserstoffs der Säuren zu dem Sauerstoff und Wasserstoff verschieden beya kannt, je nach dem Grade der Acidification. Die Grade der Metallung der Thioide, oder der basischen Thioide, vermehren die Anzahl der neutralen Salze nicht, denn die einzigen durch die Verbindung von  $1\frac{1}{2}$ ; 2 und 3 Metall mit  $\frac{1}{2}$ ; 2 und 3 Schwefel entstehenden achtzehn neutralen Salze wiederholen nur die Ordnung 1 Metall und 1 Schwefel, und die übrigen aus der Metallung 3; 2 und  $1\frac{1}{2}$  hervorgehenden Salze fallen den basischen anheim.

Die Verhältnisse des salzbildenden Stoffa in der Säure zu dem in der Base dieser neutralen Salze sind sehr verschieden, aber ergeben sich von selbst aus der Natur der Säuren und Basen.

Ist der Salzstoff der Säure und der Base das Oxygen, so sind in den Thomsonschen hyposchwefeligen Salzen die Mengen desselben für beide gleich; in den neutralen schwefeligen Salzen beträgt die Menge des Sauerstoffs das Doppelte und in den schwefelsauren das Dreifache des Sauerstoffs der Base, indem ein stöchiometrischer Antheil Schwefel mit 1, mit 2 und mit 5 Antheilen Sauerstoff die bezeichneten drei Säuren darstellt.

Ist aber die Säure des Schwefels eine Wasserstoffsäure, während die Grundlage ein Oxyd bleibt, so wird in den Däberemerschens hydrothionigen oder Hypohydrothion-Salzen die Säure  $\frac{1}{2}$  Antheil an Gewicht  $\frac{1}{2}$  Wasserstoff und in den Hydrothionsalzen 1 Antheil an Gewicht  $\frac{1}{2}$  Wasserstoff gegen 1 Sauerstoff der Grundlage enthalten.

Ist dagegen die Grundlage ein Hydroid, wäh-

rend der Salzstoff der Säuren das Oxygen bleibt, so findet man 1, 2 und 3 Sauerstoff in der Säure gegen 1 Antheil an Gewicht  $\frac{1}{2}$  Wasserstoff in der Grundlage, z. B. die Schwefelsalzsäuren.

Wenn endlich der Salzstoff beider Glieder des Salzes Hydrogen ist, so muß die Säure des hydrothionigen Hydroids  $\frac{1}{2}$ , und die des hydrothionsauren 1 Anth. Wasserstoff gegen 1 Wasserstoff der Grundlage enthalten.

Die Anzahl der sauren und basischen Salze, welche sonst unbestimmt oder unbegrenzt erscheinen möchte, wird nun durch die Anzahl der Verbindungsstufen der Salzradicale nach der Combinationsrechnung beschränkt, und durch die vorkommenden Wiederholungen ein und derselben Verhältnisse noch mehr herabgesetzt. Doch bleibt die Menge derselben noch immer zahlreicher, als man sobald Hoffnung hat, aufzufinden.

In den sauren und basischen Salzen stimmt das Verhältniß des salzbildenden Stoffs der Säure und Base oft ganz mit dem der neutralen Salze überein, doch gehören sie dann immer einer verschiedenen Säure des Schwefels an. Z. B. in dem basischen schwefelsauren Kupferoxyd ist ebensowohl wie in dem hypochweifigen Kupferoxyd (Schwefeloxyd - Kupferoxyd) der Sauerstoff der Säure und Base gleich. Das neutrale schwefligsaure Eisenoxydul enthält ebensowohl in der Säure den doppelten Sauerstoffgehalt der Basis als das erste basische Schwefelglycynsalz, nach *Berzelius*. Hier tritt uns wieder ein neues Hinderniß der Messung der Salze nach den Verhältnissen des Sauerstoffs entgegen.

Diese Darstellung hat sich blofs auf die Schwe-

felsalze beschränkt, welche durch die Bestandtheile des Wassers salificirt sind... Die Stelle des Sauerstoffs und Wasserstoffs kann aber auch ein anderer Salzstoff vertreten. Tritt zu den Schwefelverbindungen Chlorin, Kohlenstoff, Cyanogen hinzu: so entstehen Schwefelchlorinsalze, Schwefelkohlenstoffe, Schwefelcyanalze u. a. w. statt der Schwefelwasserstoff- und Schwefelsauerstoffsalze, und wieder, wie diese, in zahlreichen möglichen Abänderungen. Hier eröffnet sich für die neuere Chemie eine große schöne Aussicht zu Entdeckungen zusammengesetzter Salze, wofür sich schon in den Fossilien, besonders unter den Kiesel- und Thonerdeverbindungen, Analogien finden.

Ich lasse jetzt noch einen sehr einfachen Fall bestimmen unterer Salze eines bestimmten Salzradicals, des Chlorinkaliums folgen. Die Zahlen bezeichnen Gewichte \*).

---

\*) Dabei allen chemischen Werthen keine andere Theilungen vorkommen, als solche, welche sich durch Achtel ausdrücken lassen; den Sauerstoff als Einheit gesetzt, so wird die Rechnung bequemer und kürzer, wenn man statt der Decimalbrüche sich der Achtelbrüche bedient, und zwar mit Weglassung des Nenners, nach der Form der Decimalbrüche, Z. B. statt 1,125 octadisch  $1\frac{1}{8}$  und statt 1,75 oct.  $1\frac{6}{8}$ , wobei die Bruchziffer etwas kleiner, etwa so:  $1\frac{1}{8}$ ;  $1\frac{6}{8}$ , geschrieben werden mag. Ueber die Vortheile der octadischen Rechnung, worauf der Chemiker gleichsam von der Natur angewiesen ist, an einem andern Orte.



10<sup>o</sup> salzsaures Kali

|         |                               |                    |                           |
|---------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 6. Kali | 9 $\frac{1}{2}$ Kaliumchlorid | Hydrogen           | 4 $\frac{1}{2}$ Salzsäure |
|         |                               | 5 Kalium + Chlorin |                           |
|         | 1 Oxygen                      | 4 Oxygen           | Chlorin-<br>säuren        |
|         |                               | 5 —                |                           |
|         |                               | 7 —                |                           |

Chlorinsaures Kali.

Das Chlorin tritt hier nur in 5 salzfähigen Oxydationsstufen auf, nach Graf *Stalions* von *Gay-Lussac* bestätigten Versuchen; nach den Untersuchungen Anderer findet sich noch eine Mittelsäure mit 5 Sauerstoff, und es ist sehr wahrscheinlich, daß wenigstens noch das Euchlorin, oder die Verbindung von 4, 5 und 1 Sauerstoff in dem durch Erhitzung bis zu einem gewissen Grade desoxydirten chlorinsauren Kali vorkommt, wenn sich nicht auch fernere Mittel- und höhere Stufen durch künstliche Ueberladung mit Sauerstoff nach *Thénards* neuer Methode darstellen lassen sollten. Aber die schon genau bekannten Arten des oxychlorinsauren Kali sind, ohngeachtet des bedeutend verschiedenen Sauerstoffgehalts der Säure (4; 5; 7) einander so ähnlich, daß man sie kaum von einander unterscheiden kann: es ist hier also das Verhältniß des Sauerstoffs von weit geringerem Einfluß, als eine Vermehrung des Chlorins oder des Kaliums in diesen Salzen seyn würde. Das Verhältniß der Radicale zu einander ist also die sicherste Grundlage für die chemische Messung der Salze.

*Berzelius* selbst hat schon angefangen, für Salze

Fränsch über die Entwicklung

welche in zahlreichen Abänderungen erscheinen, Verhältnisse der beiden Glieder der Salze, bei gleichen Mengen des einen oder des andern, statt Rechnung nach den Sauerstoffverhältnissen, welche die Analyse ohnehin erst durch Schlüsse findet, ein führen, was fast der Bestimmung nach den Verhältnissen der Salzradicale gleichkommt: da indeß letztes Verfahren an die Zusammensetzung der Radica woraus die Salze entspringen, erinnert, so geht dasselbe tiefer in die Natur der Salze ein, und giebt gleich eine leichtere Uebersicht, weil die chemischen Radicale im Allgemeinen nicht einfach zu nehmen, als die zusammengesetzten Säuren. Demnach wurde bei einer vollständigen Analyse der Phosphorsäure und Boraxsäure auf die Rechnung nach Sauerstoffmengen eine Vergleichung der Größe der Salzglieder (s. dieses Journal. XXIII. S. 44) folgt, wie es sich gestaltet, so gestaketen sich die Verhältnisse weit einfacher. Es findet sich nämlich in diesen Salzen für den Sauerstoffgehalt der Säure im Verhältnisse zum Sauerstoff der Grundlage folgende Reihe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

man das vorhin durch 1,5 angegebene Salz als Einheit setzt.

Dies wird nun auf folgende Weise gefunden:

Die Phosphorsäure ist nach *Berzelius*, *Dulong* u. a. aus nahe 100 Phosphor und 125 Sauerstoff, oder als 4 P. und 5 O. zusammengesetzt. Nach der Analogie der salpetersauren und chlorinsauren Salze sollte man nun vermuthen, daß ein neutrales phosphorsaures Salz in der Säure 5mal mehr Sauerstoff als in der Grundlage enthalten, und ein Antheil Phosphorsäure reich 9 seyn würde; dies Salz ist aber das höchste, und das, welches sich am meisten der Neutralität zu nähern scheint, enthält  $\frac{2}{3} = 7,5$  Phosphorsäure. Obgleich nun hier, wie bei mehreren andern Salzen die Farbenreaction sehr täuschend ist, so ist doch dieses Salz mit *Berzelius* als neutral anzunehmen. Setzen wir also 4,5 als Säuremenge des neutralen Salzes, und multipliciren wir damit obige Reihe der Säuremengen bei gleichen Mengen der Grundlagen, so erhalten wir die Sauerstoffgehalte:  $\frac{3}{2}$ ;  $1\frac{5}{8}$ ;  $1\frac{10}{8}$ ;  $2\frac{1}{2}$ ;  $1\frac{5}{4}$ ;  $1\frac{5}{2}$ ; 5

und die Phosphorgehalte:

$\frac{3}{4}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{2}{3}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{3}{4}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{4}$

wo das neutrale Salz (2) als Einheit gesetzt:

$\frac{3}{4}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{2}{3}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{3}{4}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{4}$

Diese letzte Reihe giebt die Anzahl der stöchiometrischen Antheile, und die vorige oder das Doppelte der letztern Reihe, die Gewichte des Phosphors an, wenn Sauerstoff gleich 1 gesetzt. In diesen Salzen enthält also das höchste saure doppelt und das nächste dreimal die Phosphormenge des neutralen Salzes.

das niedrigste basische, welches als Gegensatz des höchsten sauren 2 Grundlage gegen 1 Phosphor enthalten sollte, scheint zu fehlen: denn das gefundene höchstbaisische enthält nur 1 Grundlage gegen 1 Phosphor, als Gegensatz zu dem zweiten sauren, worin 1 Säure mit 1 Grundlage verbunden sind. Sehr merkwürdig ist es, daß gerade die beiden wichtigsten Phosphorsalze, die Knochenerde und der Apatit \*), die ebenfalls als Gegensätze gegen einander auftreten, nur um ein Geringes von dem neutralen Salze, je das 3 sauer und dieses 1 basisch, von 1 abweichen, so daß man sie als leichtbewegliche Zwischen- oder Mittelsalze ansprechen möchte. Nach Thomson, Klaproth und Brandenburg sind einige Phosphorkalksalze einzuschließen.

Die Uebersicht der Zusammensetzung solcher verwickelten Salze wird also durch das Zurückgehen zu den metallischen Salzradicalen erleichtert.

Die Sauerstoffverhältnisse der Salze aber ergeben sich aus der bekannten Zusammensetzung der Säuren, wodurch die Salze gebildet werden. Sie lassen sich auf folgende drei Hauptabtheilungen reduciren:

\*) *Thomard* führt in seinem *Traité de chimie* 2de Ed. 1817. II. 386, neben dem Apatit auch den Chrysolith als Phosphorkalksalz auf, in folgenden Worten: La seconde (la chrysolithe), qu'on plaçoit autrefois parmi les pierres gemmes, contient, d'après *Vauquelin*, 54½ de chaux et 45½ d'acide phosphorique. Hier ist wohl wieder eine Verwechslung vorgefallen. Denn wenn gleich sonst wohl der spanische Apatit mit diesem Edelstein verwechselt worden, so bleibt doch *Werner's* Chrysolith als Gattung stehen und zwar als eisenhaltiger Kieselkalk.

1. In den höchsten Säuren des Schwefels, Arseniks, Antimons, des Molybdans und Wolframs herrscht die Zahl 3.

2. In den Säuren und Salzen der Kohle, des Borons (vielleicht auch des Chroms) die Zahl 4 (und 3).

3. In den höchsten Säuren und Salzen des Stickstoffs, Cyans und Phosphors, des Chlorins und Jodins die Zahl 5.

Durch ihre niedern Säuren greifen diese Stoffe in ihre Zahlen gegenseitig über.

Da nun die Wasserstoffsalze als Hydrate erscheinen, worin die salzbildenden Stoffe in dem Verhältnisse des Wassers vorkommen, und die vegetabilischen Säuren eigentlich Znsammensetzungen der Kohlenstoffverbindungen oder kohlensaure Salze darstellen, so herrscht in allen Sauerstoffsalzen, welche die Proportionslehre umfaßt, die bekannte Trias der Zahlen 5; 4; 5, oder 2; 3; 5, welche, wie ich früher in einer besondern Schrift \*) gezeigt habe, auch den drei großen natürlichen Abtheilungen der Pflanzen, den Acotyledonen (2 und 4), den Monocotyledonen (3) und Dicotyledonen (5) zum Grunde liegt.

Hier gewinnt nun wieder die chemische Proportionslehre eine ungemein anziehende Bedeutung. Denn so wie in den beiden Gliedern der Salze bei ihrer ba-

---

\*) Vergl. Untersuchungen über die Zahlverhältnisse in den Fructificationsorganen der Pflanzen, oder Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Ersten Bandes des 2tes Heft, 1809.

sischen und sauren Steigerung mannigfache Vervielfachungen der neutralen Grundverhältnisse vorkommen, so zeigt sich auch in den beiden Sexualgliedern der Blüten, und durch diese in den Fructificationstheilen überhaupt, bald in dem positiven, bald in dem negativen Gliede eine verschiedene Steigerung, und bei Mittelpflanzen und Zwischenorganen ein Uebergreifen der Verhältnisse, wobei immer das Grundmaas kenntlich und characteristisch bleibt. Dieser Gegenstand reicht aber über den Zweck gegenwärtiger Abhandlung hinaus, und erfordert eine besondere Darstellung, die ich nächstens liefern werde.

Hier hatte ich mir bloß vorgesetzt, meine Ansicht von der naturgemäßen Entwicklung und Berechnung der Salze zu erläutern.

Dem Einwurfe, daß häufig in der Natur und fast immer in den Laboratorien die Salze durch unmittelbare Verbindung einer Säure mit einer Grundlage dargestellt werden, begegne ich nicht: die Natur hat, wie die Kunst, mancherlei Mittel, ihre Zwecke zu erreichen; allein der normale Gang der natürlichen Bildungen ist die Entwicklung des Zusammengesetzten aus dem Einfachen, nicht umgekehrt, und so gehen auch hier aus den gediegenen Verbindungen der Radicale die Salze hervor. Die Säuren und Grundlagen einzeln genommen sind nur disjecta membra oder zersplitterte Salze: denn die Tendenz der gediegenen Körper, indem sie sich oxydiren oder überhaupt mit salzbildenden Stoffen verbinden, ist das Salz: dies ist die Blüthe des Chemismus.

Ich wiederhole hier ausdrücklich noch einmal mein Bild des Aufblühens der chemischen Körper zu

ken, indem ich nach dem Vorhergehenden darin  
se würdige Bedeutung finde \*).

---

\*) Aus dem Obigen ist nun ersichtlich, in wie fern der Irrthum, wovon *Bischof* hinsichtlich meiner Theorie der Salze redet, auf meiner Seite liegt. Mag ich sie in Verbindung mit meiner Volumtheorie, die ich noch besonders rechtfertigen werde, sehr unvollkommen und mangelhaft dargestellt haben, so ist doch die Idee derselben, die *Bischof* wohl hätte finden können, keinesweges umgestoßen, sondern vielmehr durch alle neuern Entdeckungen und berichtigte Erfahrungen vollkommen bestätigt worden. Wie viel Antheil ich überhaupt an der Entwicklung stöchiometrischer Grundsätze habe, kann ein Zeitgenosse nicht leicht entscheiden, und ich will darüber nicht streiten. Neue Ideen verhalten sich nicht wie Entdeckungen schlichter Thatsachen, deren Datum und Gränze sich bestimmen läßt: jene entstehen oft aus der Combination zahlreicher neuer und alter, selbst längst weggeworfener oder vergessener Thatsachen; und daher schreiben sich zum Theil die Prioritätsstreitigkeiten würdiger Gelehrten, welche oft ärgerlich genug sind, und worüber die Nachwelt, die den Zusammenhang besser übersieht und einen klar durchgeführten tüchtigen Gedanken von zufälligem Umhertappen zu unterscheiden weiß, lächeln wird. Und vollends ist eine rechnende Wissenschaft, welche wie die Stöchiometrie erst in ihrem Entstehen ist, so reich an neuen fruchtbaren Gedanken, daß ein Stöchiometer nur darauf sinnen muß, ihren Gang aufzuhalten, um nicht den Erfahrungen vorzugreifen und den Unvorbereiteten etwas Unverständliches oder scheinbar Unglaubliches zu sagen. Hier ist dem Einen etwas neu, was dem Andern in etwas längst Ausgesprochenem schon übergriffen scheint. Und oft wird nur zu leicht

durch persönliche Vorliebe die Trennung des Urtheils he-  
stochen.

So scheint auch *Bischof* nach dem *τὸ ἐξ ὀπίσθεν* zu verfahren, wenn er in seiner Berechnung der vegetabilischen Substanzen bei Anführung des Gedankens, daß die einfacheren unter den organischen Substanzen noch aus zusammengesetzten secundären Bestandtheilen hervorgehen, *Gay-Lussac* und *Saussure* als Urheber desselben vor *Döbereiner* und mir angiebt, was jene berühmten Chemiker schwerlich gut heißen werden. Sie haben durch ihre vortrefflichen Analysen gezeigt, daß mehrere vegetabilische Substanzen bei ihrer Verbrennung Wasser und Kohlensäure, Wasser und ölbildendes Gas in bestimmten Verhältnissen geben, aber sie statuiren keinesweges eine Zusammensetzung der Körper aus diesen secundären Substanzen. *Döbereiner* war es, der es zuerst bestimmt aussprach, daß die Kleesäure aus Kohlensäure und Kohlenoxyd zusammengesetzt sey, und der dies darauf auch durch die Analyse mittelst wasserfreier Schwefelsäure zeigte. Noch immer aber konnte man behaupten, daß, wie bei *Gay-Lussacs* und *Saussures* Versuchen durch Verbrennung, hier durch Vitriolöl die beiden Gase aus der Kleesäure erst gebildet worden seyen, indem auf andere Weise die Zerlegung nicht gelang, und ein synthetischer Beweis fehlte. Ich fand nun, daß in der Stärke, dem Gummi und dem Zucker die drei Mittelzahlen aus den verschiedenen besten Analysen dieser drei Körper kleinere Unterschiede der Elemente geben, als die verschiedenen gleich vorzüglichen Analysen jedes einzelnen dieser Körper, und daß mithin diese drei Substanzen, welche sich ganz verschieden verhalten, aus völlig gleichen Elementen zusammengesetzt sind; zugleich zeigte ich durch die Zusammenstellung mehrerer Körper nach ihrer organischen Entwicklung, wie ihre Verschiedenheit durch die Combinationen der vier bekannten Kohlenstoffverbindungen mit den Bestandtheilen des Wassers



## der Salze aus den gedieg. Verbind. 289

bedingt und beschränkt werde. Jetzt war ein unumstößlicher Beweis da, und kein Ausweg mehr. Denn man mußte entweder annehmen, daß durch die Analyse dieser verschiedenen Körper ihre letzten Elemente umgewandelt und gleich gemacht werden, was die Chemie nicht zuläßt, indem sie dadurch geradezu ihre Nichtigkeit ausspräche, oder man müßte den Grund ihrer Verschiedenheit hier in der eigenthümlichen Anordnung oder Constitution der Elemente finden, vorausgesetzt nämlich, daß die Analyse von *Thouard* und *Gay-Lussac*, *Berzelius*, *Saussure* einen hohen und nahe gleichen Werth haben. Dieses punctum saliens der allmählig entstandenen neuen Theorie über die Bildung und Zusammensetzung der organischen Substanzen, wodurch die organische Chemie eine andere Wendung, und für die Physiologie neue Wichtigkeit erhält, deren Folgen nicht ausbleiben werden, hätte *H. Bischof* wohl treffen können, wenn er gewollt hätte; aber er vergrößert den historischen Fehler noch dadurch, daß er nur den zweiten Theil meiner chemischen Meßkunst 1817. und nicht zugleich meine frühere ausführliche Abhandlung in *Trommsdorffs Journal* 1816. II. 86 ff. citirt, die er wohl kennen mußte, und wodurch sich wieder etwas ändert.

Uebrigens begrüßte ich *H. Bischof* als meinen Landsmann und fleißigen Mitarbeiter auf gleichem Felde freundlich und mit Achtung.

Meinecke,

Ueber eine  
 A n o m a l i e  
 bei der  
 chemischen Verwandtschaft

von

*Richard Phillips Esq.*

(Aus dem Journ. of Science and the Arts No. 1. 1816. p. 80.  
 Uebers. von *H. Eisenbach*, Mitglieder der physikalischen  
 Gesellschaft von Studierenden in Erlangen, und revidirt  
 v. H.)

**H.** *Davy* (Elements of chemical philosophy p. 103) bemerkt, daß „in vielen Fällen Zersetzungen, welche bei einfachen Anziehungen nicht Statt finden können, durch doppelte Verwandtschaften bewirkt werden können. So sind die Bestandtheile des schwefelsauren Baryts oder die Verbindung der Schwefelsäure und der Erde, welche Baryterde heisst, so fest verbunden, daß kein Alkali und keine Erde die Säure von der Baryterde abtrennen kann. Kali, welches für die Säure eine sehr große Anziehung hat, kann für sich dieses Salz nicht zersetzen; aber wenn Kali in Verbindung

mit Kohlensäure über gepulvertem schwefelsauren Baryt einige Zeit digerirt wird, so entsteht eine doppelte Zersetzung, und man erhält Verbindungen von Schwefelsäure und Kali, so wie von Kohlensäure und Baryt.“

Diese Zersetzung ist zwar schon oft angeführt worden, aber wie es mir scheint, ist weder die Art ihres Vorkommens, noch sind die Vorsichtsmaassregeln bei Anstellung dieses Versuches vollständig beschrieben worden. Bei Anführung dieses Versuchs bemerkt Dr. *Henry* (*Elements of Experimental Chemistry*, Vol. II. p. 35.): „man siede das gepulverte schwefelsaure Salz mit einer Auflösung von seinem doppelten oder dreifachen Gewicht kohlensaurem Kali, so wird die Kohlensäure an den Baryt, die Schwefelsäure an das Kali treten.“

Auch nach Band II. von *Klaproth's* analytischen Versuchen (S. 223) scheint es, daß eine große Menge kohlensaures Kali zu der Zersetzung des schwefelsauren Baryts nöthig ist; „500 Gran desselben wurden gepulvert mit 600 Gran kohlensaurem Kali und Wasser gekocht, zur Trockenheit verdampft, wieder in Wasser vertheilt und zum zweitenmal abgeraucht. Nach einer zweiten Vermischung mit Wasser, wurde die Erde mit Salzsäure behandelt, welche dieselbe mit Aufbrausen auflöste, und einen Rückstand von 18 Gran liefs.“

Bei diesem Versuch ist offenbar eine beträchtliche Sorgfalt angewandt worden, um die vollkommene Wirkung der Salze auf einander zu erhalten. Da 18 Theile des schwefelsauren Baryts der Zersetzung entgingen, so müssen 282 Theile desselben 600 Theile kohlensaures Kali zu ihrer Verwandlung in kohlensauren Baryt nöthig haben. Es könnte aber bei diesem

## 292 Phillips über eine Anomalie

Verhältniß die Zersetzung nicht gegenseitig stattfinden; denn nach *Wollastons* Tafel ergibt sich, daß die Kohlensäure und das Kali von 165 Theilen kohlen-sauren Kalis hinreicht, um den Baryt und die Schwefelsäure von 282 Theilen schwefelsauren Baryts zu sättigen.

Meine Aufmerksamkeit wurde zuerst auf die Umstände der oben erwähnten Zersetzung gerichtet, weil ich von *D. Babington* erfahren hatte, daß schwefelsaures Kali und kohlen-saurer Baryt sich auch zerlegen, wenn der letztere in einer Auflösung des ersten gekocht wird. Als ich mich von der Wirklichkeit dieser beiden so widersprechend scheinenden Fälle überzeugt hatte, so machte ich folgende Versuche, um die Umstände und die Grenzen zu bestimmen, unter denen sie vorkommen.

Da es sehr wahrscheinlich war, daß ein Zustand mechanischer Theilung des schwefelsauren und des kohlen-sauren Baryts die Zersetzung begünstige, indem so der Wirkung des kohlen-sauren und des schwefelsauren Kalis mehr Flächen dargeboten werden, so bereitete ich diese Salze, indem ich salpetersauren Baryt durch schwefelsaures Natrum und kohlen-saures Ammoniak zersetzte; die Niederschläge wurden mit destillirtem Wasser gut ausgewaschen und getrocknet. Ich wandte krystallisirtes schwefelsaures Kali an, von dessen Reinheit ich mich überzeugt hatte, und bereitete das kohlen-saure Kali, indem ich das zweifach kohlen-saure in einer schwachen Rothglühhitze zersetzte.

Um zu finden, bis zu welchem Grad der schwefelsaure Baryt sich zersetzen läßt, wenn man ihn in einer Auflösung seines Aequivalents von kohlen-saurem

Kali kocht, wurden 100 Theile des erstern Salzes mit 50 Theilen des letztern zwei Stunden lang in ungefähr 4 Unzen Wasser gesotten; die Auflösung wurde nicht bis zur Trockenheit verdampft, indem ich von Zeit zu Zeit Wasser nachgoss, um das durchs Verdampfen Weggehende zu ersetzen. Der unauflöseliche Rückstand wurde mit Wasser gewaschen, bis er von dem unzersetzten kohlensauren und dem neu gebildeten schwefelsauren Kali befreit war; als ich verdünnte Salpetersäure auf denselben goss, so erfolgte ein beträchtliches Aufrausen. Der von der Säure nicht aufgelöste Theil wurde nun gewaschen, bis das Wasser keine Spur von salpetersaurem Baryt mehr zeigte und wog getrocknet 77 Theile, es waren also 23 Theile schwefelsaurer Baryt durch das kohlensaure Kali zeretzt und in 19,5 kohlensauren Baryt verwandelt worden.

Nun nahm ich Quantitäten von kohlensaurem Baryt und schwefelsaurem Kali, welche den oben angewandten äquivalent waren, das heißt, wie Dr. Wollastons Tafel zeigen wird, 85 des erstern und 74 des letztern; sie wurden in Wasser gesotten, wie in dem so eben beschriebenen Versuch; ich liess den unzerlegten Antheil sich setzen, und untersuchte die klare Auflösung: Curcumapapier wurde stark davon geröthet, sie braunte mit Salpetersäure auf, und gab einen starken rothen Niederschlag mit ätzender Sublimationslösung, die Auflösung enthielt daher augenscheinlich eine beträchtliche Menge kohlensaures Kali, welche aus der wechselseitigen Zeretzung des kohlensauren Baryts und schwefelsauren Kali entstand.

Der vom Wasser nicht aufgelöste Rückstand wurde durch mehrfaches Aufgießen von Wasser gewa-

sehen, bis alles rein kohlensaures Kali mehr anzeigte, darauf wurde er wie in dem vorigen Beispiel mit überschüssiger Salpetersäure behandelt; diese erregte ein beträchtliches Aufrausen, und ich fand, daß die salpetersäure Auflösung mit Ammoniak keinen Niederschlag gab, wohl aber einen beträchtlichen mit kohlensaurem Ammoniak; schwefelsaures Natrum gab einen in Salzsäure unauflöselichen Niederschlag. Daraus erhellt, daß nicht aller kohlensaurer Baryt in schwefelsauren verwandelt wurde. Ich fand seine wirkliche Menge = 67 Th., es wurden folglich 57 Theile kohlensauren Baryts durch das schwefelsaure Kali zersetzt.

Im ersten Versuch wurden 23 Theile schwefelsaurer Baryt zersetzt; wenn wir uns also auf die Äquivalententafel beziehen, so werden die hiebei angewandten 100 Theile schwefelsauren Baryts und 59 kohlensauren Kalis nahe in folgendes Verhältniß kommen:

77 schwefelsaurer Baryt.

45,5 kohlensaures Kali.

17 schwefelsaures Kali.

19,5 kohlensaurer Baryt.

In dem zweiten Versuch verwandelten sich 57 Theile kohlensaurer Baryt in schwefelsauren, es gaben daher die 85 Theile kohlensaurer Baryt und die 74 schwefelsaures Kali ungefähr

67 schwefelsaurer Baryt

59,5 kohlensaures Kali

24,5 schwefelsaures Kali

28 kohlensaurer Baryt.

Die Zersetzungen in diesen beiden Fällen sind sehr beträchtlich. Da aber die Mengen der Salze, welche aus der Wirkung derselben Verhältnisse ähnlicher Säuren und Basen entstehen, nicht gleich sind,

so ist es wahrscheinlich, daß die Zersetzung in beiden Fällen nicht vollständig war, indem die Mischungen nicht genugsam digerirt, und zur Trockenheit verdampft wurden.

Setzen wir, daß die Unauflöslichkeit des schwefelsauren Baryts im ersten Falle die vollständige Wirkung des kohlsauren Kali verhindert habe, so müssen wir auch annehmen, daß dieselbe Ursache die Wirkung des schwefelsauren Kali auf den kohlsauren Baryt im zweiten Versuch verhindert habe. Geben wir nun zu, daß diese Ursache in beiden Fällen gleich stark gewirkt habe, so wird das Mittel der angegebenen Mengen wahrscheinlich die Resultate ausdrücken, welche entstanden wären, wenn man jeden der Versuche bis auf seine äusserste Grenze fortgesetzt hätte.

Gehen wir auf die in jedem Versuch angewandten Mengen der Salze zurück, so finden wir nach der Äquivalententafel, daß sie aus Säuren und Basen nahe in folgenden Verhältnissen zusammengesetzt waren:

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 54 | — | Schwefelsäure |
| 19 | — | Kohlensäure   |
| 66 | — | Baryt         |
| 40 | — | Kali          |

und diese so verbunden, daß sie das Mittel aus beiden Versuchen angeben, stehen so:

$$24,5 \text{ Ss.} + 47,5 \text{ B.} = 72 \text{ schwefelsauren Baryt}$$

$$15,75 \text{ Ks.} + 28,75 \text{ K.} = 42,5 \text{ kohlsaures Kali}$$

$$9,5 \text{ Ss.} + 11,25 \text{ K.} = 20,75 \text{ schwefelsaures Kali}$$

$$5,25 \text{ Ks.} + 18,50 \text{ B.} = 23,75 \text{ kohlsauren Baryt.}$$

Wenn man die Resultate von *Klaproths* Versuchen prüft, so wird man einsehen, daß diese Zahlen die Mengen ausdrücken, welche aus der vollständigen ge-

gegenseitigen Wirkung der Salze entstanden wären. Er fand, daß 600 Theile kohlen-saures Kali 282 schwefel-sauren Baryt zersetzten, es würde demnach 59, soviel ich anwandte, 27,6 zersetzt haben, welches bis auf 4 mit der Berechnung übereinstimmt. Wir können daher mit Sicherheit sagen, daß nicht mehr als 72 aus 100 Theilen schwefel-sauren Baryts durch kohlen-saures Kali zersetzt werden können, während dieses letztere Salz der Gegenwirkung des schwefel-sauren Kali ausgesetzt ist, welches durch die Zersetzung der 72 Theile gebildet wird. Und es möchte scheinen, daß die Kraft des letzteren zureicht, die Wirkung von irgend einer Quantität kohlen-sauren Kalis zu verhindern, so groß diese letztere und so klein die Menge des schwefel-sauren Baryts auch seyn mag.

In *Klaproth's* Versuch konnten nicht mehr als 165 Theile kohlen-saures Kali durch 282 schwefel-sauren Baryt zersetzt werden, und es scheint, daß das entstandene schwefel-saure Kali, sobald es 200 Theile betrug, durch sein Bestreben wieder schwefel-sauren Baryt zu erzeugen, die übergebliebenen 435 Theile kohlen-saures Kali gehindert, 18 Theile schwefel-sauren Baryt zu zersetzen, wiewohl jenes wenigstens dreisigmal mehr Kohlensäure enthielt, als sich mit dem Baryt hätte verbinden können.

Um zu untersuchen, in wiefern diese Annahmen durch die Erfahrung bekräftigt würden, ließ ich 72 Theile schwefel-sauren Baryt, 42,5 kohlen-saures Kali, 20,75 schwefel-saures Kali und 23,75 kohlen-sauren Baryt ungefähr zwei Stunden lang im Wasser stehen. Die Resultate bewiesen nicht, daß die Mengen genau dieselben seyen, welche die gegenseitige Wirkung verhindern, aber sie zeigten doch, daß der Irrthum



nicht sehr beträchtlich ist; ich fand, daß der schwefelsaure Baryt um ungefähr 3,75 zugenommen hatte:

Das Resultat dieses Versuchs zeigt hinlänglich, daß die Zersetzung des schwefelsauren Baryts mittelst kohlen-sauren Kalis gehindert wird, durch die Kraft des schwefelsauren Kalis und kohlen-sauren Baryts denselben wieder zu erzeugen; und umgekehrt, daß die Kraft des schwefelsauren Kalis und kohlen-sauren Baryts, sich wechselseitig zu zersetzen, ebenso durch die entsprechende Kraft der Wiedererzeugung, die dem schwefelsauren Baryt und kohlen-sauren Kali zukommt, aufgehoben wird.

Ich gebe von diesem anomalen Fall keine Erklärung; er drückt bloß ein Factum aus, welches man in einer von den *Berthollets* wenig abweichenden Sprache so ausdrücken kann, daß eine Zertheilung der Basen zwischen den Säuren, deren Wirkung entgegengesetzt ist, stattfindet. Gleichwohl ist klar, daß dieser Fall keiner von denen ist, welchen er der *Massenwirkung* zuschrieb; denn unabhängig von andern Betrachtungen erhellt aus *Klaproths* Versuchen, daß eine große Menge kohlen-saures Kali nicht im Stande ist, einen geringen Antheil des schwefelsauren Baryts gänzlich zu zersetzen.

Einige von den Erscheinungen, auf welche *Berthollet* seine Lehre von der *Massenwirkung* gründete, hat man erklärt, indem man die Bildung von sauren Salzen nachwies, wo er annahm, daß eine schwächere Säure mit einer stärkeren eine Base theile, und *H. Davy* zeigte, daß einer von den Fällen, wo jener annahm, daß eine Base, deren Verwandtschaft gegen

handlung zu antworten, welche vor achtzehn Monaten in Dr. Thomsons Annalen erschien, und worin er seine frühere Ansicht vertheidigt.

Es ist hier nicht meine Absicht seine Schrift zu beurtheilen, sondern einige Erscheinungen darzulegen, welche sich auf den Gegenstand des Streites beziehen, und die ich nur bei meiner Hingeziehung auf meinen Weg nach Indien gerade verschaffen konnte.

Meine Versuche wurden an dem Blute des Schafs, der Schildkröte und des Hayfisches angestellt, wovon der letztere sich für diesen Zweck ganz besonders gut schickt, da seine Temperatur der der Atmosphäre sehr nahe kommt.

Den 15ten März hatte unser Schiff gerade 4° nördliche Breite und 150° 15' westliche Länge, nach dem Chronometer, als bei Sonnenaufgang ein grosser Hay durch den Harpun gefangen wurde. Sobald er aufs Verdeck gebracht war, haute man ihn noch lebend aus einander. Das in der grossen Rückenholader fliessende Blut hatte 82° \*); die umgebenden dicken Muskeln 82,5, das Wasser der See 80,5° und die Luft 79° F. Etwas von dem Blute wurde in ein Glas gesammelt, und war in ungefähr zwei Minuten fest geronnen. Während der ganzen Zeit beobachtete ich das darin getauchte Thermometer, das Quecksilber fiel von 82,5° bis auf 81°, und stieg nicht in dem Augenblicke, als das Blut sich zu festeren Gerinnen ansetzte.

\*) Diese Beobachtung beweist zugleich, dass das Venenblut von niedrigerer Temperatur ist, als das Arterienblut; ein Umstand, welchen ich durch zahlreiche Versuche zu beweisen bemüht war, die sich in der erwähnten Dissertation finden.

genblick, als das Gerinnen anfang, es blieb nicht einmal stehen, als das Gerinnen begann, sondern fiel unaufhörlich fort.

Den folgenden Tag wurde ein anderer Hay gefangen, der selbe Versuch mit dem Blut angestellt, und derselbe Erfolg erhalten.

Den 23ten März, als wir bei  $2^{\circ}29'$  südlicher Breite und  $24^{\circ}30'$  westlicher Länge waren, wurde eine große Schildkröte getödtet, welche vor ungefähr drei Wochen bei der Himmelfahrtsinsel gefangen war. Die Temperatur der Luft war gerade  $79^{\circ}$ ; das aus der Carotis der Schildkröte fließende Blut hatte  $91^{\circ}$ , in ein Glas gesammelt hatte es  $88,5^{\circ}$ . Das in seine Mitte gestellte Thermometer fing auf der Stelle an zu fallen, und fiel stufenweise fort, ohne eine Unterbrechung, solange das Blut gerann.

Seit ich auf dem Cap Town war, habe ich meine Versuche wiederholt an dem Blute von Schafen. Es wäre überflüssig, sich auf eine umständliche Erzählung derselben einzulassen, da ihre Resultate vollkommen mit den schon beschriebenen übereinstimmen. Die Luft hatte beiläufig  $60^{\circ}$ , das Blut, wenn es aus dem Körper kam, ungefähr  $100^{\circ}$ , es kühlte sich fortwährend ab, während es anfang zu gerinnen, so daß, als der Blutkuchen entstanden war, seine Wärme zwischen zwei und drei Minuten ungefähr  $1^{\circ}$  Grad gefallen war.

Der sich aufdrängende und, wie mir scheint, unvermeidliche Folgesatz aus diesen Versuchen ist derjenige, welchen ich früher in meiner Dissertation angenommen hatte, und welchen *Hunter* zuerst aussprach, nämlich, „daß während der Gerinnung des Bluts keine merkliche Wärmeentwicklung stattfindet.“

Es ist jetzt nur noch übrig, die Thatsache (wenn ich sie so nennen darf) mit dem festbegründeten Satz in Uebereinstimmung zu bringen, daß Aenderung der Temperatur die nothwendige Folge der Formänderung der Körper im Allgemeinen ist; und einen Grund für die Abweichung der Versuche des Hrn. Dr. Gordons von den meinigen anzugeben.

Was das erste betrifft, so finde ich da wenig Schwierigkeit; und ich werde die Erklärung, welche ich in meiner Dissertation gab, wieder aufstellen, da sie mir für diesen Zweck ganz passend scheint.

Da während der Gerinnung des Blutes ein Theil desselben aus dem flüssigen in den festen Zustand übergeht, so sollte nach der Theorie ein Zuwachs der Temperatur stattfinden. Da hingegen der Theil der Flüssigkeit, welcher fest wird, der Eyweissstoff, so gering ist, daß er nur ungefähr  $\frac{1}{10}$  des ganzen Gewichts beträgt, und da das Gerinnen nicht plötzlich, sondern langsam und stufenweise geschieht, so glaube ich, daß nothwendig daraus folgt, die erzeugte Hitze sey zu schwach, um eine merkliche Wirkung aufs Thermometer hervorzubringen. Dies zugegeben, so verschwindet die Anomalie, und diese Thatsache widerspricht nicht länger dem allgemeinen Princip.

Der Unterschied der Resultate aus Dr. Gordons Versuchen und den meinigen rührt vielleicht von der verschiedenen Art der Anstellung unserer Versuche her. Dr. Gordon hielt etwa die Kugel seines Thermometers nahe an den Boden des Gefäßes, worin das Blut enthalten war, und wenn diese Flüssigkeit an der Oberfläche zu gerinnen anfang, zog er das Instrument in die Höhe. In den hier beschriebenen Versuchen durfte das Thermometer nicht ruhig bleiben,

sondern wurde sanft von einer Seite zur andern bewegt, so daß das Ganze in derselben Temperatur erhalten werden konnte, bis das Gerinnen anfang. Denn, wenn das Blut zäh und das Gefäß tief ist, so ist die Oberfläche an dem zuletzt herausgelassenen Theil wärmer als das darunter befindliche, und wenn es nicht tief ist, so ist es am Boden am wärmsten, wie ich oft bei meinen Versuchen bemerkt und in meiner Dissertation als eine Quelle ungenauer Beobachtungen angeführt habe.

Ich wünschte mehr ins Einzelne über diesen Gegenstand eingehen zu können, aber in dieser Entfernung von Europa und mithin von allen wissenschaftlichen Journalen und wissenschaftlichen Werken ist es mir nicht möglich. Von Dr. Gordons anerkannter Wahrheitsliebe und Liberalität hoffe ich Verzeihung, wenn ich bei Betrachtung seiner Abhandlung irgend eine Uebersetzung begangen haben sollte. Ich bin jedoch überzeugt, daß Dr. Gordon bei etwaiger Wiederholung meiner Versuche dieselben Resultate erhalten, und *Hunters* früheren Schlüssen beitreten wird.

Vorgeb. der guten Hoffnung,

d. 24. Mai 1816.

---

Untersuchungen  
über die  
Gesetze der Wärme

von

*Dulong und Petit*

Auszug aus dem Französischen \*)

von

Professor Meinecke.

**D**allon stellt in seiner philosophischen Chemie folgende Wärme Gesetze auf:

1) Die Gase dehnen sich aus nach geometrischer Progression, wenn ihre Temperatur in arithmetrischer Progression zunimmt.

2) Quecksilber und alle andere Flüssigkeiten dehnen sich, von ihrer größten Dichtigkeit an, im Quadrat ihrer Temperaturen aus.

3) Die Wärmecapacität der Körper bleibt unveränderlich, wenn ihr Volumen sich nicht ändert.

\*) Annales de Chimie et de Physique VII. 113 f. 285 f. 337 ff.

4) Wenn Körper erkalten, so nehmen ihre Temperaturen in geometrischer Proportion ab, während die Zeiträume der Erkaltung eine arithmetische Reihe darstellen.

Alle diese Gesetze bestätigen sich ziemlich an *Daltons* Thermometer, und bilden dadurch ein System, das durch seinen Zusammenhang und seine Consequenz überraschend ist. Es ist daher von Wichtigkeit, zu untersuchen, ob die Beobachtungen und Thatsachen, worauf sich *Daltons* Wärmetheorie und neue Thermometerscale gründen, genau und richtig sind.

Dies gab Veranlassung zu den nachfolgenden Versuchen, die sich über die Ausdehnung der Körper in der Wärme, über ihre Wärmecapacität bei verschiedenen Temperaturen und über die Erkaltung verbreiten.

### *Ueber die Ausdehnung der Gase.*

Nach *Gay Lussac* dehnen sich alle Gasarten innerhalb 0° und 100° C. gleichförmig durch die Wärme aus. Dies hat sich überall bestätigt. Um zu erfahren, ob vielleicht in sehr hohen Temperaturen eine Aenderung dieses Gesetzes Statt findet, wurden Hydrogen und atmosphärische Luft, als zwei vorzüglich verschiedene Luftarten, nach und nach einer sehr hohen Wärme ausgesetzt: ihr Volum blieb sich bei gleicher Temperatur immer gleich, bis auf einen unbedeutenden Unterschied, der geringer war, als die äussersten Verschiedenheiten der beobachteten Volume von mehreren Abtheilungen der Luft allein. Ein Volum Hydrogen von 0° wurde bei 300° zu 2.1003 Volumen, während unter denselben Umständen die ver-

gleichen Mengen mehrerer Abtheilungen atmosphärischer Luft zwischen 2,0948 und 2,1027 Volumen schwankten. Dafs auch in niedern Temperaturen unter dem Frostpunkte das Gesetz dasselbe bleibt, konnte man beiläufig aus den nachher angeführten Versuchen schliessen.

Dehnt sich eine Luftart und eine tropfbare Flüssigkeit in der Wärme in solchen gleichbleibenden Verhältnissen aus, dafs aus ihrer Ausdehnung auf ihre Temperatur, und umgekehrt geschlossen werden kann? Diese Frage mufs durch Thatsachen entschieden werden, ehe man vermittelst des Quecksilberthermometers die Temperaturen und die Ausdehnungen der Gase misst.

*Gay-Lussac* hat schon vor längerer Zeit das Quecksilberthermometer mit dem Luftthermometer verglichen, und innerhalb dem Frostpunkte und dem Siedepunkte den Gang beider übereinstimmend gefunden. *Dalton* aber giebt an, dafs innerhalb dieser Punkte das Luftthermometer etwa um einen Grad vorseile, und zwar um die Mitte der Scale, wo die Abweichung, wenn sie da ist, am stärksten seyn mufs, indem beide Instrumente bei  $0^{\circ}$  und  $100^{\circ}$  zusammen treffen. Wenn wirklich eine Abweichung der Ausdehnungen des Quecksilbers und der Luft Statt findet, so ist sie hiernach wenigstens sehr gering innerhalb  $0^{\circ}$  und  $100^{\circ}$ .

Es bleibt noch zu untersuchen, ob die Uebereinstimmung sich gleich bleibt in sehr tiefen Temperaturen unter dem Frostpunkte, und in hohen Wärmegraden über dem Siedepunkte des Wassers.

Zu dem Ende wurde vollkommen getrocknete Luft in eine Glasröhre eingeschlossen, und diese fast



horizontal in eine kältende Mischung, und in ein Gefäß voll Oel, das man nach und nach erhitzen konnte, gelegt, je nachdem man in tiefen oder hohen Temperaturen experimentirte. Diese Röhre endigte sich ausserhalb dem Gefäße in eine sehr feine Röhre, deren Inhalt zum ganzen Raume der Röhre sich so klein verhielt, daß derselbe nicht zu rechnen war. Sobald nun die Luft in der Röhre die Temperatur erreicht hatte, wozu man sie bringen wollte, so verschloß man die feine Spitze der Röhre mit Hülfe des Löthrohrs, und wenn die Röhre wieder die Temperatur der Atmosphäre angenommen, so nahm man sie heraus und brach unter Quecksilber die Spitze ab. Es drang jetzt ein Theil des Quecksilbers hinein. Wenn man nun das Gewicht dieses Quecksilbers mit der Menge, welche die ganze Röhre füllte, verglich, so konnte man leicht die Ausdehnung der Luft berechnen, wobei indess die Veränderungen des Druckes nicht vernachlässigt werden durften.

Diese Vorrichtung ist zu Versuchen mit atmosphärischer Luft hinreichend; eine kleine Abänderung muß für andere Gasarten vorgenommen werden. Um diese von der Atmosphäre auszuschließen, wird die feine Spitze der Röhre gekrümmt und in Quecksilber getaucht. Solange die Temperatur zunimmt, tritt ein Theil des Gases heraus: sobald aber das Maximum der Wärme, die man erreichen will, vorüber ist, und die Erkältung anfängt, so tritt das Quecksilber nach und nach in die Röhre, bis das Bad die Temperatur der Atmosphäre angenommen hat. Die Rechnung ist hier übrigens dieselbe.

Für Erkältungsversuche wird auch die mit atmosphärischer Luft gefüllte Röhre bis an die Spitze

in Quecksilber getaucht, das während der sinkenden Temperatur nach und nach hereintritt. Bei dem höchsten Kältegrade nimmt man die Röhre heraus und mißt wie vorher.

Die Correction wegen der Ausdehnung des Glases wurde bei diesen Versuchen nicht versäumt.

Mit Erkältungsversuchen fing die Vergleichung an. Der erste Versuch bis zu  $-20^{\circ}$  herab gab eine vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem Fortschreiten der Ausdehnungen der Luft und des Quecksilbers, und eine beträchtliche Anzahl nachheriger Versuche bis zu  $30^{\circ}$  und  $36^{\circ}$  herab ließen nur geringe Abweichungen bemerken, die bald negativ bald positiv waren, so daß die daraus gezogene Mittelzahl eine fast gänzliche Uebereinstimmung des Quecksilberthermometers und Luftthermometers zeigte. (Die in das Erkältungsbad gelegte Röhre voll Luft ist nämlich nichts anders, als ein Luftthermometer, dessen Gang hier mit der Scale eines Quecksilberthermometers verglichen wird).

Aus den Versuchen wird hier nur folgende Reihe ausgehoben:

| Quecksilberthermometer. | Luftthermometer.    |
|-------------------------|---------------------|
| $-36^{\circ},29$ C.     | $-36^{\circ},18$ C. |
| 34,72                   | 34,84               |
| 33,31                   | 33,40               |
| 32,27                   | 32,13               |
| 31,63                   | 31,54               |
| 31,25                   | 31,04               |
| 30,46                   | 30,59               |
| 29,68                   | 29,64               |
| Mittel $-32,452$        | Mittel $-32,420$    |

Diese Resultate zusammengenommen mit den innerhalb

0 und 100° angestellten Versuchen geben für die beiden Scalen des Quecksilbers und der Luft in einer Ausdehnung von 130° so geringe Abweichungen, daß man sie mit Beobachtungsfehlern verwechseln kann.

Nicht so leicht sind diese Versuche in hohen Temperaturen über dem Siedepunkt. Der Mangel eines festen Punkts der Temperatur, die Schnelligkeit der Erkaltung des Oelbades und andere Hindernisse, welche anzuführen hier zu weitläufig seyn würde, machen das Verfahren langwierig und verwickelt. Durch Sorgfalt wurden die Schwierigkeiten so weit überwunden, daß die Fehler unbedeutend waren. Folgende Tafel enthält das Mittel aus den Ergebnissen von vier Reihen Versuchen, die nicht um Einen Grad von einander abweichen. Sie umfaßt beinahe 400 Grade.

| Quecksilberthermometer.  | Ausdehnung eines Volums Luft. | Luftthermometer. |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| — 36°                    | 0,8650                        | — 36             |
| 0                        | 1,0000                        | 0                |
| + 100                    | 1,3750                        | + 100            |
| 150                      | 1,5576                        | 148,70           |
| 200                      | 1,7589                        | 197,05           |
| 250                      | 1,9189                        | 245,05           |
| 300                      | 2,0976                        | 292,70           |
| 360 (Quecksilber siedet) | 2,3125                        | 350,00           |

In der letzten Columne sind die Temperaturen berichtet um die Ausdehnung des Glases, wovon nachher die Rede seyn wird.

Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß in hohen Temperaturen über  $100^{\circ}$  das Quecksilber mit der atmosphärischen Luft und mithin auch mit allen Gasen sich nicht gleichförmig ausdehnt, und daß das gewöhnliche Quecksilberthermometer nicht in allen Temperaturen das wahre Maas für die Temperatur der Luftarten giebt.

Der Siedepunkt des Quecksilbers ist bei  $360^{\circ}$ ; andere Physiker bestimmen denselben anders und sehr verschieden. Dies rührt wohl nicht sowohl von Mangelhaftigkeit ihrer Versuche, als davon her, daß man den Siedepunkt des Quecksilbers am Quecksilberthermometer selbst gemessen hat, und deshalb für den nicht eingetauchten Theil der Röhre eine Berichtigung anbringen muß, welche schwierig ist. Um sie zu vermeiden, wurde hier die Ausdehnung des Quecksilbers nicht an seiner Masse selbst gemessen, sondern ein Gefäß voll Quecksilber in siedendes Quecksilber untergetaucht und nach dessen völliger Erwärmung der Verlust beobachtet, welchen das wieder herausgehobene Gefäß an Quecksilber erlitten hatte. Wenn man nun den Verlust mit der Menge Quecksilber, welche dasselbe Gefäß bei  $0^{\circ}$  fassen konnte, zusammenhielt, so hatte man die Mittel zur Berechnung der Ausdehnung dieser Flüssigkeit von  $0^{\circ}$  bis zu ihrem Siedepunkte, wobei aber die Ausdehnung des Glases berücksichtigt werden mußte. Diese Ausdehnung konnte dann leicht auf ein Thermometer, dessen Inhalt sowohl in der Kugel als in der Röhre von gleicher Temperatur anzunehmen war, übertragen werden. Um aber das Sieden des Quecksilbers in dem untergetauchten Gefäße zu hindern, zog man den Hals desselben in eine sehr enge senkrechte Röhre von et-

wa 6 Centimeter Länge aus. Der Inhalt dieser kleinen flüssigen Säule betrug kaum  $\frac{1}{10000}$  der ganzen Masse,

aber der dadurch auf das Innere des Gefäßes bewirkte Druck hinderte vollständig die Bildung von Dämpfen in demselben, während das Quecksilber um demselben herumsiedete. Es versteht sich von selbst, daß alle übrige nöthige Vorsicht, als Reinigung des Quecksilbers von Feuchtigkeit und Luft, u. s. w. aufsorgfältigste beobachtet wurde. Die Bestimmung 360° für den Siedepunkt des Quecksilbers scheint also die genaueste und richtige zu seyn.

*Ueber die absolute Ausdehnung des Quecksilbers.*

Das Quecksilber dehnt sich von 0° bis 100° C. aus

| Nach Dalton                   | um | $\frac{1}{50}$ | seines Volums |   |
|-------------------------------|----|----------------|---------------|---|
| — Cavendish                   | —  | $\frac{1}{33}$ | —             | — |
| — Shuckburgh                  | —  | $\frac{1}{34}$ | —             | — |
| — Lavoisier und<br>Laplace *) | —  | $\frac{1}{34}$ | —             | — |
| — Haellstroem                 | —  | $\frac{1}{33}$ | —             | — |
| — Deluc                       | —  | $\frac{1}{36}$ | —             | — |
| — Roy                         | —  | $\frac{1}{39}$ | —             | — |
| — Lalande und<br>Delisle      | —  | $\frac{1}{66}$ | —             | — |
| — Casbois                     | —  | $\frac{1}{67}$ | —             | — |

\*) In ihre Versuche soll sich ein Rechnungsführer einge-

Diese Angaben sind sehr verschieden: auch reichen sie nur von  $0^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$ ; um vollkommen und genau den Gang der Ausdehnung des Quecksilbers in der Wärme kennen zu lernen, mußte diese Flüssigkeit in allen Graden der Wärme, deren sie fähig ist, beobachtet werden, und zwar unter Umständen, welche die Vergleichung mit der Ausdehnung des Glases oder einer andern Umgebung ausschlossen.

Dieses Verfahren bei dem Versuch gründete sich auf den unbestreitbaren hydrostatischen Satz, daß wenn zwei flüssige Säulen unter sich in Verbindung stehen, die Höhen derselben sich genau umgekehrt verhalten, wie ihre Dichtigkeiten. Wenn man nun das Quecksilber in die beiden Arme eines Hebers einschließt, von welchen der eine stets auf einem festen Punkte, z. B. auf dem Frostpunkt erhalten wird, während die Temperatur des andern sich zu irgend einem bekannten Punkte erhöht, so kann man aus dem Unterschiede der Höhen beider Säulen leicht die gesuchte Ausdehnung erhalten, ohne auf die Ausdehnung des Gefäßes in der Wärme oder auf dessen Gestalt Rücksicht zu nehmen, indem die Weite der beiden Säulen hier keinen Einfluß hat.

Zu dem Ende wurden zwei enge gläserne Röhren durch eine dritte horizontale mit einander verbunden: durch die Enge der Röhren verminderte man beträchtlich die Masse des Quecksilbers und erleichterte dadurch den Versuch; aber die beiden obern Enden der senkrechten Röhren erweiterte man hin-

---

schlichen haben, nach dessen Berichtigung die Ausdehnung des Quecksilbers  $\frac{1}{11}$  statt  $\frac{1}{12}$  seyn würde,

länglich, um bei der Beobachtung keinen Einfluß der Capillarität berücksichtigen zu dürfen.

Die horizontale Röhre ruhte auf einer starken Eisenstange, welche auf einem starken Gestelle befestigt war und an beiden Enden ein Niveau trug. Auch die beiden senkrechten Röhren waren durch Eisenstangen gehalten.

Die senkrechte Röhre, worin die Temperatur  $0^{\circ}$  unterhalten werden sollte, umgab man mit einem weiten blechernen Cylinder, welcher während des Versuchs mit zerklopftem Eise gefüllt wurde. Der Cylinder reichte bis zur Höhe des Quecksilbers: oben am Rande hatte man eine Klappe angebracht, welche bloß während der Beobachtung geöffnet wurde, um etwas Eis wegräumen und die Spitze der Quecksilbersäule sehen zu können,

Schwieriger war es, den kupfernen Cylinder um die andere Röhre, welche der Hitze ausgesetzt werden sollte, zu befestigen: doch mit Hülfe einer Menge von Schrauben und eines guten Kittes erreichte man es, daß während des Versuchs der Boden des Gefäßes für die erhitzte Flüssigkeit undurchdringlich wurde. Die Flüssigkeit war ein fixes Oel.

Dieser Cylinder wurde mit einem Ofen umgeben, der von dem andern kalten Cylinder hinlänglich entfernt war.

Um die Temperatur des Oelbades zu beobachten, waren darin ein Quecksilberthermometer und ein Luftthermometer angebracht, zwei gut gearbeitete und vorher berechnete Instrumente, deren Vergleichung der Beobachtung alle Sicherheit geben mußte.

Zur Messung der Höhen der beiden Quecksilbersäulen diente ein besonders hiezu verfertigtes Mikro-

meter, womit, wie eine Prüfung zeigte, bei einer Ausdehnung von  $\frac{1}{3330}$  des Quecksilbervolums höchstens um zwei bis drei Einheiten des Nenners gefehlt werden konnte.

Nachdem diese Vorrichtungen in Stand gesetzt worden, füllte man beide Gefäße bis zur Höhe der Quecksilbersäulen, die beiläufig  $0^m,5825$  betrug, das eine mit Eis, das andere mit Oel, und heizte das letztere, woraus durch eine Röhre das überfließende Oel ablaufen konnte. Die erkaltete Röhre blieb während aller Versuche unverrückt auf  $0^\circ$ .

Es wurde eine große Menge wenig von einander abweichender Versuche angestellt, und daraus das Mittel gezogen. Die Resultate der am meisten von einander abweichenden Versuche gaben als Ausdehnung des Quecksilbers für 1 Grad C.

| Temperatur.                   | Maximum.         | Minimum.         |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| von $0^\circ$ bis $100^\circ$ | $\frac{1}{3347}$ | $\frac{1}{3332}$ |
| — $100$ — $200$               | $\frac{1}{3419}$ | $\frac{1}{3431}$ |
| — $200$ — $300$               | $\frac{1}{3289}$ | $\frac{1}{3309}$ |

Und das Mittel aus allen Versuchen war:

| Temperatur, angezeigt durch Luft. | Mittlere Ausdehnung. | Temperatur, angezeigt durch Quecksilber. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| $0^\circ$                         | $0^\circ$            | $0^\circ$                                |
| $100$                             | $\frac{1}{3350}$     | $100$                                    |
| $200$                             | $\frac{1}{3423}$     | $204,61$                                 |
| $300$                             | $\frac{1}{3300}$     | $314,15$                                 |

Die erste Spalte enthält die aus der Ausdehnung



der Luft abgeleiteten Temperaturen, und die letzte die Wärmegrade, welche die Ausdehnung des Quecksilbers anzeigen würde, wenn dieselbe gleichförmig angenommen wird.

Auch hieraus ergibt sich, daß die Ausdehnungen der Luft und des Quecksilbers nicht übereinstimmend und beide für sich wieder nicht gleichförmig fortschreiten. Wenn das Luftthermometer auf  $300^{\circ}$  steht, müßte das Quecksilberthermometer  $314^{\circ}, 15$  zeigen, während das gewöhnliche Thermometer nur  $307, 64$  anzeigt.

#### *Ueber die Ausdehnung fester Körper.*

Kennt man die wahre Ausdehnung des Quecksilbers in der Wärme, so kann man aus der scheinbaren Ausdehnung desselben in Gefäßen von Glas oder andern Substanzen leicht die Ausdehnung dieser festen Körper ableiten.

Um zuerst die Ausdehnung des Glases zu finden, bediente man sich einer sechs Decimeter langen Glasröhre, welche etwa 700 Grammen Quecksilber fassen konnte. Diese Röhre war an einem Ende verschlossen und an dem andern in ein feines Hahnröhrchen ausgezogen, dessen Inhalt nicht in Betracht kommen konnte. Sie war mit sorgfältig vorbereitetem Quecksilber gefüllt, wovon ein Theil nach und nach herauslief, wenn man die Temperatur von dem Frostpunkte bis zum Siedepunkte erhob. Das Gewicht des herausgelaufenen in Verhältniß zu dem sämmtlichen Quecksilber wurde dann genau bestimmt. Wie scharf diese Beobachtungen waren, kann man daraus schließen, daß der Einfluß des Luftdrucks auf den Siede-

punkt des Wassers genau darnach angegeben werden konnte.

Glasröhren aus mehreren Fabriken dem Versuche unterworfen, zeigten keine merkbaren Differenzen der Ausdehnung, so verschieden auch ihr Inhalt und die Stärke der Wände war. Die Resultate dieser Versuche finden sich in nachfolgender Tabelle, worin die erste Columne die Temperaturen nach dem Luftthermometer, die zweite die mittlere scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers in dem Glase, die dritte die absolute Ausdehnung des Glases, nach Volumen berechnet, und die letzte Columne die auf der Ausdehnung des Glases, diese gleichförmig gesetzt, abgeleitete Temperatur enthält.

| Temperatur nach dem Luftthermometer. | Scheinbare Ausdehnungen des Quecksilbers. | Absolute Ausdehnungen des Glases. | Temperaturen nach einem Glasthermometer. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1000                                 | $8480$                                    | $38700$                           | 100°                                     |
| 200                                  | $6378$                                    | $38300$                           | 213,2                                    |
| 300                                  | $6318$                                    | $32900$                           | 352,9                                    |

*Lavoisier* und *Laplace* erhielten für das Glas zwischen 0° und 100° die Ausdehnung  $\frac{1}{6300}$ , wahrscheinlich weil sie das beobachtete Quecksilber siedend ließen: es ist daher ihre fast allgemein angenommene Angabe zu hoch.

Aber die Ausdehnung des Glases nimmt in hohen Temperaturen nach einem steigenden Verhältnisse zu. Man sieht dies aus der letzten Spalte. Ein Glas-

thermometer, oder ein Glasstab, dessen Verlängerung die Temperaturen anzeigt, würde bei  $500^{\circ}$  des Luftthermometers auf  $552^{\circ}$  stehen.

Auf ähnliche Weise die Ausdehnung des Eisens und anderer Metalle zu bestimmen, wollte nicht gelingen: man mußte folgendes Verfahren wählen. Eine Glasröhre von 18 Millimeter Weite und 6 Decimeter Länge verschloß man an einem Ende und befestigte in deren Mitte einen cylindrischen Stab von Schmiedeeisen: darauf blies man das andere Ende der Röhre in ein Haarröhrchen aus, und füllte sie ganz mit sorgfältig vorbereitetem Quecksilber. Wenn sie nun verschiedenen Graden der Wärme ausgesetzt und der Verlust an herausgedrungenem Quecksilber bestimmt wurde, so konnte man daraus die Ausdehnung des Eisens herleiten: denn das herausgedrungene Volumen gab die Summe der Ausdehnungen des Quecksilbers und des Metalls, vermindert um die Ausdehnung des Glases. Zu dieser Rechnung darf man nur die Volume der drei Körper bei dem Frostpunkte wissen. Nun erhält man das Volum des Eisens, wenn man sein Gewicht dividirt durch seine Dichtigkeit bei  $0^{\circ}$ , auf gleiche Weise leitet man das Volum des Glases aus dem Gewichte des bei gleicher Temperatur darin befindlichen Quecksilbers ab. Endlich ist das Volum des Quecksilbers offenbar dem Unterschiede der beiden ersten gleich.

Durch ein ähnliches Verfahren wurde die Ausdehnung des Kupfers gefunden. Die Resultate dieser Untersuchung bestätigten sich durch die Vergleichung der Längen einer Kupferstange und Glasröhre in verschiedenen Temperaturen.

Die Ausdehnung des Platins wurde an einer Kup-

punkt des Wassers genau darnach an  
konnte.

Glasröhren aus mehreren Fab-  
che unterworfen, zeigten keine me-  
der Ausdehnung, so verschieden  
die Stärke der Wände war. Di-  
suche finden sich in nachfo-  
die erste Columne die Tem-  
thermometer, die zweite  
dehnung des Quecksilber-  
die absolute Ausdehnung  
berechnet, und die  
dehnung des Glases  
leitete Temperatur

|                                                 |     |                            |                              |                            |                         |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Temperatur<br>nach dem<br>Luftthermo-<br>meter. | 100 | Ausdehnung des<br>Kupfers. | Kupfer-<br>thermo-<br>meter. | Ausdehnung des<br>Platins. | Platinther-<br>mometer. |
|                                                 |     | 18400<br>1700              | 100°<br>528,8                | 37700<br>36300             | 100°<br>511,6           |

die Gesetze der Wärme  
ein Glaskörper  
wird, wenn man  
in einem  
Verhältnis  
nehmen wollte

den vorigen Untersuchungen  
Temperatur, welche das Luft-  
viert, das Platinthermometer  
thermometer  $314^{\circ},15$ , das  
Glasthermometer  $352^{\circ},9$   
anzeigen, wenn man  
Körper in hoher wie  
Verhältniß der  
g der Scalen  
nehmen wollte,

Wärme der festen Körper  
in niederen Temperaturen.

Der Zeit, da *Black* die Lehre von der spe-  
cificen Wärme aufstellte, haben sich viele Physiker  
mit der Bestimmung der Wärmecapacität der verschie-  
denen Körper beschäftigt. *Wilke's*, *Crawford's*, *Mey-  
er's* und besonders *Lavoisier's* und *Laplace's* Arbeiten  
sind bekanntlich die ausgezeichnetesten. Alle setzen  
voraus, daß die Wärmecapacität der Körper in den  
verschiedenen Temperaturen unveränderlich sey; nur  
*Deluc* giebt für das Wasser eine geringe Veränder-  
lichkeit derselben an. *Dalton* schließt im Zusammen-  
hange seiner scharfsinnigen Wärmetheorie, daß die  
specifische Wärme einer und derselben Masse einer  
Substanz nicht beständig sey, aus dem Grunde, weil  
ein Theil der Wärme zur Ausdehnung verwandt wur-  
de, daß sie aber für ein und dasselbe Volum unver-  
änderlich bleiben müsse.

Diese Annahme ist auf keine Versuche gestützt:  
auch hat noch kein Physiker über die Wärmecapacität

Verföhrung und Glösröhre, deren Ausdehnung bekannt waren, gemessen.

Die mittlern Resultate der Versuche über Kupfer und Platin enthält folgende Tabelle:

|                       |                                        |                        |                                        |                              |                                        |                         |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Luftther-<br>mometer. | Ausdeh-<br>nung des<br>Eisens.         | Eisenther-<br>mometer. | Ausdeh-<br>nung des<br>Kupfers.        | Kupfer-<br>thermo-<br>meter. | Ausdeh-<br>nung des<br>Platins.        | Platinther-<br>mometer. |
| 100°<br>500           | $\frac{1}{28105}$<br>$\frac{1}{22705}$ | 100°<br>572,6          | $\frac{1}{18405}$<br>$\frac{1}{17705}$ | 100°<br>328,8                | $\frac{1}{37705}$<br>$\frac{1}{36305}$ | 100°<br>511,6           |

Nach diesen und den vorigen Untersuchungen würde also in derselben Temperatur, welche das Luftthermometer zu 300 anzeigt, das Platinthermometer  $311^{\circ},6$ , das Quecksilberthermometer  $314^{\circ},15$ , das Kupferthermometer  $328^{\circ},8$ , das Glasmeter  $352^{\circ},9$  und das Eisenthermometer  $372^{\circ},6$  anzeigen, wenn man in der Voraussetzung, daß alle Körper in hoher wie in niedriger Temperatur in gleichem Verhältniß der Ausdehnung fortschreiten, die Theilung der Scalen nach einer solchen Progression vornehmen wollte, wie mit *Dalton* geschehen müßte.

*Ueber die specifische Wärme der festen Körper bei verschiedenen Temperaturen.*

Seit der Zeit, da *Black* die Lehre von der specifischen Wärme aufstellte, haben sich viele Physiker mit der Bestimmung der Wärmecapacität der verschiedenen Körper beschäftigt. *Wilke's*, *Crawford's*, *Meyer's* und besonders *Lavoisier's* und *Laplace's* Arbeiten sind bekanntlich die ausgezeichnetesten. Alle setzen voraus, daß die Wärmecapacität der Körper in den verschiedenen Temperaturen unveränderlich sey; nur *Deluc* giebt für das Wasser eine geringe Veränderlichkeit derselben an. *Dalton* schließt im Zusammenhange seiner scharfsinnigen Wärmetheorie, daß die specifische Wärme einer und derselben Masse einer Substanz nicht beständig sey, aus dem Grunde, weil ein Theil der Wärme zur Ausdehnung verwandt wurde, daß sie aber für ein und dasselbe Volum unveränderlich bleiben müsse.

Diese Annahme ist auf keine Versuche gestützt: auch hat noch kein Physiker über die Wärmecapacität

... man tauchte die er-  
... und beobachtete die  
... dem Wasser hervorger  
... die Wärme wa-  
... und Liern  
... den kommt  
... Sorgfalt, wenn

... es, die Kör  
... wird, genau r  
... befragen. F  
... heute hier  
... und we  
... gegeben wurd

... in he  
... Die Ueber  
... wenn man ihn  
... also nu  
... dadurch  
...



Massé Wasser von bestimmter Temperatur, und bemerkte dessen Erwärmung nach hergestelltem Gleichgewichte. Diese Beobachtung erfordert die größte Genauigkeit. Zu den Versuchen wurde eine so große Menge Wasser genommen, daß die Veränderung der Temperatur desselben nach der Eintauchung des erhitzten Körpers nicht mehr als 5 bis 6 Centesimalgrade betrug; aber zur Bestimmung der Temperatur diente ein Thermometer, womit Hundertheile eines Grades genau gefunden werden konnten. Das Gefäß war von Eisenblech, und durch drei Füße isolirt; es nahm freilich ebenfalls Theil an der Erhitzung; aber da Gewicht und spezifische Wärme desselben bekannt waren, so konnte man auch seinen Einfluß auf den Versuch berechnen.

Das Wasser hatte die Temperatur der Atmosphäre, und da die Menge desselben so groß war, daß nach der Eintauchung des erhitzten Körpers seine Temperatur nicht beträchtlich erhöht wurde, so konnte die äussere Luft keinen merkbaren Einfluß ausüben.

Mit dem Eisen stellte man die ersten und zahlreichsten Versuche an, und erhielt für dessen Wärmecapacität im Mittel folgende Resultate:

| Temperaturen.   | Wärmecapacität. |
|-----------------|-----------------|
| von 0° bis 100° | 0, 1098         |
| — 0 — 200       | 0, 1150         |
| — 0 — 300       | 0, 1218         |

Für die übrigen untersuchten Metalle und das Glas ergaben sich folgende Wärmecapacitäten:

| Wärmecapacitäten *). |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
|                      | von 0° bis 100° | von 0° bis 500° |
| Quecksilber          | 0,0550          | 0,0550          |
| Zink                 | 0,0927          | 0,1015          |
| Antimon              | 0,0507          | 0,0549          |
| Silber               | 0,0559          | 0,0611          |
| Kupfer               | 0,0949          | 0,1013          |
| Platin               | 0,0355 **)      | 0,0355          |
| Glas                 | 0,177           | 0,190           |

Die Wärmecapazität fester Körper verhält sich also wie ihre Ausdehnung: sie nimmt mit den Tem-

\*) Despretz (s. *Chimie p. Thenard*, 2. Ed. IV, 233) hat für einige Metalle folgende gleichbleibende Capacitäten aus ihrer Erkaltung abgeleitet.

| Metalle.         | Wärmecapazität. |
|------------------|-----------------|
| Schmiede - Eisen | 100             |
| Gusseisen        | 113,6           |
| Stahl            | 102,1           |
| Zink             | 84,6            |
| Messing          | 80,6            |
| Zinn             | 48,6            |
| Blei             | 28,6            |

\*\*\*) Im Originalen findet sich die Zahl 355, ein Druckfehler, der auch in *Thenards Chemie* IV, 252, und hieraus wieder in *Wolfs Supplemente zu Klaproths Wörterbuch* IV, 267 übergegangen ist. Die wahrscheinlich richtige Zahl 355 ist hier aus den nachfolgenden Berechnungen abgeleitet.

Masse Wasser von bestimmter Temperatur, und bemerkte dessen Erwärmung nach hergestelltem Gleichgewichte. Diese Beobachtung erfordert die größte Genauigkeit. Zu den Versuchen wurde eine so große Menge Wasser genommen, daß die Veränderung der Temperatur desselben nach der Eintauchung des erhitzten Körpers nicht mehr als 5 bis 6 Centesimalgrade betrug; aber zur Bestimmung der Temperatur diente ein Thermometer, womit Hundertheile eines Grades genau gefunden werden könnten. Das Gefäß war von Eisenblech, und durch drei Füße isolirt; es nahm freilich ebenfalls Theil an der Erhitzung, aber da Gewicht und specifische Wärme desselben bekannt waren, so konnte man auch seinen Einfluss auf den Versuch berechnen.

Das Wasser hatte die Temperatur der Atmosphäre, und da die Menge desselben so groß war, daß nach der Eintauchung des erhitzten Körpers seine Temperatur nicht beträchtlich erhöht wurde, so konnte die äussere Luft keinen merkbaren Einfluss ausüben.

Mit dem Eisen stellte man die ersten und zahlreichsten Versuche an, und erhielt für dessen Wärmecapacität im Mittel folgende Resultate:

| Temperaturen.   | Wärmecapacität. |
|-----------------|-----------------|
| von 0° bis 100° | 0, 1098         |
| — 0 — 200       | 0, 1150         |
| — 0 — 300       | 0, 1218         |

Für die übrigen untersuchten Metalle und das Glas ergaben sich folgende Wärmecapacitäten:

|             | von 0° bis 100° | von 0° bis 500° |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Quecksilber | 0,0550          | 0,0550          |
| Zink        | 0,0927          | 0,1015          |
| Antimon     | 0,0507          | 0,0549          |
| Silber      | 0,0559          | 0,0611          |
| Kupfer      | 0,0949          | 0,1015          |
| Platin      | 0,0335          | 0,0355          |
| Glas        | 0,1772          | 0,1890          |

Die Wärmecapacität fester Körper verhält sich also wie ihre Ausdehnung: sie nimmt mit den Tem-

\*) *Dalton* (s. *Chimie p. Thénard*, 2. Ed. IV, 233) hat für einige Metalle folgende gleichbleibende Capacitäten auf ihrer Erkaltung abgeleitet:

| Metalle.         | Wärmecapacität. |
|------------------|-----------------|
| Schmelze - Eisen | 100             |
| Guß-eisen        | 113,6           |
| Stahl            | 102,1           |
| Zink             | 84,6            |
| Messing          | 80,6            |
| Zinn             | 48,6            |
| Blei             | 28,6            |

\*\*) Im Originalen findet sich die Zahl 356, ein Druckfehler, der auch in *Thénard's Chemie* IV, 232, und hieraus wieder in *Wolff's Supplemente zu Klepperts Wörterbuch* IV, 267 übergegangen ist. Die wahrscheinlich richtige Zahl 355 ist hier aus den nachfolgenden Berechnungen abgeleitet.

peraturen zu, diese nach dem Luftthermometer gemessen. Sie würde, gegen *Crawfords* Meinung, auch noch zunehmen, wenn man den Quecksilberthermometer zur Messung der Temperaturen anwendete.

Wären diese Beobachtungen bei unverändertem Volum der Körper angestellt, was nur für Gasarten möglich ist, so ließen sich hieraus unbedenklich Folgerungen ziehen. Wenn sich indess die Ausdehnung der festen Körper gleichförmig verhielte, so könnte man die zunehmende Wärmecapacität doch nicht der Wärme, wodurch die Volumvermehrung bewirkt wird, zuschreiben, denn in diesem Falle ist das Volum proportional der Temperatur und kann also das Verhältniß der Capacitäten nicht ändern. Nehmen aber die Ausdehnungen in einem wachsenden Verhältniß zu, so müssen auch die Wärmecapacitäten bei hohen Temperaturen an der Veränderung des Ausdehnungsgesetzes Theil nehmen. Soviel ist gewiß, daß man den Einfluß der Ausdehnungen auf die Wärmecapacität nicht übersehen darf, zumal da gerade die Metalle, deren Ausdehnung die größte ist, auch eine größere Aenderung der Wärmecapacität zeigen.

Wenn man nun, wie Mehrere vorschlagen, die Temperatur nach der Menge Wärme schätzt, die ein Körper, im Erkalten frei macht: so würden die verschiedenen Körper, mit dem Luftthermometer verglichen, ganz verschiedene Temperaturen anzeigen. Wäre nämlich die Capacität gleichbleibend, so müßte ein Körper bei der Erkaltung von  $500^{\circ}$  zu  $0^{\circ}$  dreimal mehr Wärme abgeben, als von  $100^{\circ}$  zu  $0^{\circ}$ ; da aber die Capacitäten wachsen, so erhält man auch mehr als die dreifache Wärme.

Wollte man aber die Temperaturen nach der wah-

ren Wärme, welche frei wird, messen, so erhält man bei der Erkaltung nachstehender Körper folgende Wärmegrade, während das Luftthermometer 300° anzeigt:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Luft . . . . .        | 300°  |
| Platin . . . . .      | 517,9 |
| Quecksilber . . . . . | 318,2 |
| Kupfer . . . . .      | 320,0 |
| Glas . . . . .        | 322,1 |
| Antimon . . . . .     | 324,8 |
| Zink . . . . .        | 328,5 |
| Silber . . . . .      | 329,3 |
| Eisen . . . . .       | 332,2 |

*Anmerk. der Übers.* Versuche über die Gasarten und Dünste finden sich noch nicht in der hier ausgezogenen Preischrift: nur vorläufig hat Hr. *Dulong* in *Biot's Traité de Physique* IV. 729, seinen dazu dienenden einfachen und sinnreichen Apparat angegeben.

Nach *Berard* und *Legache* sind die gleichbleibenden specifischen Wärmen der elastischen Flüssigkeiten folgende (*Traité p. Biot* IV. 744 u. 726.):

|                        | Bei gleichen<br>Volumen. | Bei gleichen Gewichten.              |                    |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                        |                          | Atmosphäri-<br>sche Luft<br>= 1,000. | Wasser<br>= 1,0000 |
| Atmosphärische<br>Luft | 1,0000                   | 1,0000                               | 0,2669             |
| Hydrogengas            | 0,9033                   | 12,3401                              | 3,2939             |
| Kohlensäure            | 1,2583                   | 0,8280                               | 0,2210             |
| Oxygengas              | 0,9765                   | 0,8848                               | 0,2361             |
| Stickgas               | 1,0000                   | 1,0318                               | 0,2754             |
| Oxydirtes Stickgas     | 1,3503                   | 0,8878                               | 0,2369             |
| Abbildendes Gas        | 1,5330                   | 1,5763                               | 0,4207             |
| Kohlenoxydgas          | 1,0340                   | 1,0895                               | 0,2884             |
| Wasserdunst            | 1,9600                   | 3,1360                               | 0,8470             |

*Ueber die Gesetze der Erkaltung.*

Nach *Newton* erkalten die Körper im Verhältniß ihres Temperaturüberschusses, so daß die Menge Wärme, welche sie an die umgebenden kältern Körper in gleichen und auf einander folgenden Zeiträumen abgeben, nach einer geometrischen Progression abnimmt. Diesen Satz, der wirklich für geringe Temperaturunterschiede, wie für 40 oder 50 Grad, ziemlich richtig ist, suchten *Kraft* und *Richmann* \*) durch Versuche zu erweisen. *Martine* machte auf die Ungenauigkeit desselben aufmerksam und *Erxleben* zeigte durch sehr scharfe Beobachtungen, die vergessen zu seyn scheinen, daß man sehr irren würde, wenn man auf höhere Temperaturen, wo die Progression immer schneller wächst, *Newtons* Gesetz ausdehnen wollte. *Leslie* nimmt es wieder bei seinen Versuchen an. *Dalton* findet nach Versuchen das Gesetz als annähernd für niedere und als ganz unrichtig für hohe Temperaturen. Statt nun aber ein anderes Gesetz an dessen Stelle zu setzen, suchte er es dadurch mit der Erfahrung in Uebereinstimmung zu bringen, daß er eine neue Thermometerscale erfand, die sich auf die Voraussetzung einer gleichförmigen Ausdehnung gründete. Diese findet nach dem Vorigen nicht Statt. Aber wenn auch seine Scale richtig wäre, so könnte dennoch das *Newtonsche* Gesetz nicht bestehen: denn die nachfolgenden Versuche werden zeigen, daß das Gesetz der Erkaltung nicht für alle Körper gleich ist.

---

\*) Auch *Lambert* in seiner *Pyrometrie*.

Die letzten Untersuchungen sind von *Laroché* \*), der unter andern den Satz aufstellt, daß die Menge Wärme, welche ein Körper auf dem Wege der Strahlung einem kältern in einer bestimmten Zeit mittheilt, schneller abnimmt, als der Temperaturüberschuß beider. Dies ist wieder ganz *Dalton's* Annahme, nur anders ausgedrückt. Ein von erschöpfenden Versuchen hergeleitetes und bestimmt ausgesprochenes Gesetz der Erkaltung fehlt noch: dies zu finden, sind die nachfolgenden und durch das Vorige eingeleiteten Untersuchungen angestellt.

Daß die Erkaltung eine sehr verwickelte Erscheinung ist, erhellt schon aus dem oben Gesagten; es wird daher nöthig seyn, sie möglichst abzusondern, und in ihrer einfachsten Gestalt aufzusuchen.

#### *Ueber die Erkaltung im Allgemeinen.*

Wenn ein Körper im leeren Raum, worin die Wärme durch nichts geleitet wird, erkaltet, so zerstreut sich seine Wärme gänzlich auf dem Wege der Strahlung; wird er aber in die atmosphärische Luft oder in eine andere Flüssigkeit gebracht, so tritt zu der Wärmeausstrahlung die Wärmeentziehung durch die Flüssigkeit hinzu und die Erkaltung geht schneller vor sich. Diese beiden Ursachen der Erkaltung müssen also unterschieden und jede für sich besonders untersucht werden,

Wenn ferner die Erkaltung in ihrer größten Reinheit und Einfachheit betrachtet werden soll, so muß

---

\*) Späterhin folgten noch die Arbeiten von *Despretz*.



der erkaltende Körper so klein seyn, daß in allen Theilen desselben die Wärme als gleich angenommen werden kann; es muß die Erkaltung gleichsam von einem Punkte ausgehen; sonst müßte man auch auf die Leitung und Vertheilung der Wärme im Innern des Körpers Rücksicht nehmen, und die Erscheinung bliebe nicht mehr einfach. Da nun aber mit einem Punkte nicht operirt werden kann, so ist zu untersuchen, ob ein bestimmter Umfang eines Körpers, z. B. einer Thermometerkugel, den Gang der Erkaltung stört. Nicht weniger muß man auch nachsehen, ob die Gestalt des Körpers auf seine Erkaltung Einfluß hat.

Um zuerst zu sehen, ob die Größe der Thermometer, welche zu den Erkaltungsversuchen dienen sollten, den Gang der Erkaltung stört, wurden in einem Apparate, der nachher beschrieben werden soll, drei verschiedene Quecksilberthermometer A, B, C der Erkaltung ausgesetzt, deren Kugel 3, 4 und 7 Centimeter Durchmesser hatte. Jeden dieser Thermometer erhitzte man in verschiedenem Grade, so daß seine Wärme bald 100°, bald 80, 60, 40, 20 Grad höher war als die Temperatur der Atmosphäre, und beobachtete dann die Geschwindigkeit der Erkaltungen oder die Grade, um welche jeder dieser Thermometer in gleichen Zeiträumen fiel. Nachstehende Tabelle enthält die Ergebnisse der Versuche.

| Temperaturüberschüsse. | Geschwindigkeit der Erkaltung. |           |           | Verhältnis der Erkaltungsergebnisse. |             |
|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|
|                        | Therm. A.                      | Therm. B. | Therm. C. | von B zu A                           | von C zu A. |
| 100°                   | 18°, 92                        | 8°, 97    | 5°, 00    | 2, 11                                | 3, 78       |
| 80                     | 14, 00                         | 6, 60     | 3, 67     | 2, 12                                | 3, 81       |
| 60                     | 9, 58                          | 4, 56     | 2, 52     | 2, 10                                | 3, 80       |
| 40                     | 5, 95                          | 2, 80     | 1, 56     | 2, 12                                | 3, 80       |
| 20                     | 2, 75                          | 1, 50     | 1, 73     | 2, 11                                | 3, 77       |

In der ersten Columne finden sich die Grade, um welche jeder der Thermometer A, B, C bei den verschiedenen Versuchen höher stand als die Temperatur der Atmosphäre, in den drei darauf folgenden Columnen sind die Grade angegeben, um welche die drei Thermometer in gleicher Zeit bei den angegebenen verschiedenen Temperaturüberschüssen fielen, und die

Zahlen der beiden letzten Columnen geben das Verhältniß der drei Erkaltungsreihen zu einander an.

Nun ist hier zwar die absolute Menge Wärme, die jeder dieser Thermometer verliert, verschieden, weil sie von verschiedener Größe sind, aber das Verhältniß, nach welchem sie erkalten, ist für alle drei Thermometer gleich, wie die beigesetzten Exponenten zeigen; denn jedes Glied der Reihe B verhält sich zum gegenüberstehenden Gliede der Reihe A, wie 1 zu 2,11 oder höchstens 2,12, und jedes Glied der Reihe C wieder zu jedem entsprechenden Gliede der Reihe A, wie 1 zu 3,77 bis 3,81. Die kleinen Verschiedenheiten der Verhältnißzahlen betragen kein Hunderttheil eines Gradess und sind den unvermeidlichen Fehlern der Beobachtung zuzurechnen.

Quecksilberthermometer von solcher Größe, wie diese, stören also den Gang der Erkaltung nicht; ihre Kugel kann als ein erkaltender Punkt angesehen werden.

Um auch zu erfahren, ob die verschiedene Gestalt des Thermometers oder eines andern Körpers die Erkaltung ändert, wurden drei blecherne Gefäße voll Wasser von gleichem Inhalt, aber von ganz verschiedener Gestalt der Erkaltung ausgesetzt: das eine war kugelförmig, das andere ein Cylinder, dessen Höhe doppelt so groß war, als sein Durchmesser, und das dritte auch ein Cylinder, aber von der halben Höhe seines Durchmessers. Die Resultate sind folgende:

| Übersicht<br>der<br>Temperaturen. | Erkaltungsgeschwindigkeiten |                             |                               | Verhältnis       |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | der<br>Kugel                | des<br>hohen Cy-<br>linders | des<br>niedrigen<br>Cylinders | der<br>2. zur 1. | der<br>3. zur 2. |
| 60                                | 0,90                        | 1,11                        | 1,01                          | 1,23             | 1,14             |
| 50                                | 0,73                        | 0,89                        | 0,80                          | 1,23             | 1,10             |
| 40                                | 0,54                        | 0,66                        | 0,60                          | 1,23             | 1,11             |
| 30                                | 0,38                        | 0,47                        | 0,43                          | 1,23             | 1,13             |
| 20                                | 0,21                        | 0,26                        | 0,23                          | 1,24             | 1,10             |

Der Gang der Progression der Erkaltung ist in allen drei Reihen gleich: denn die entsprechende Glieder der zweiten und ersten Reihe durch einander

dividirt, geben den Exponenten 1,23 bis 1,24, und die Glieder der dritten und zweiten das Verhältniß 1,10 bis 1,12. Die kleinen Unterschiede dieser Exponenten liegen innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler.

Also hat die Gestalt eines Körpers eben so wenig als eine mäßige Ausdehnung desselben auf das eigentliche Gesetz oder die Progression der Erkaltung Einfluß.

Um das Gesetz der Erkaltung von allen Zufälligkeiten frei und rein beobachten zu können, war noch zu bestimmen, ob die verschiedene Substanz der erkaltenden Körper störend einwirkt. Zu dem Ende wurden zuerst verschiedene Flüssigkeiten, nämlich Quecksilber, Wasser, absoluter Alkohol und concentrirte Schwefelsäure unter gleichen Umständen erkaltet. Da es schwierig war, alle diese Flüssigkeiten in Gestalt von Thermometer zu bringen, so schloß man sie in gleich große gläserne Gefäße ein, in deren Mitte ein sehr empfindliches Thermometer stand.

| Temperatur<br>Überschüsse. | Erhaltungsgeschwindigkeiten. |                |                 |                           | Verhältnis der entsprechenden<br>Glieder der Reihen. |                      |                      |
|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                            | des<br>Quecksil-<br>bers     | des<br>Wassers | des<br>Alkohols | der<br>Schwefel-<br>säure | der<br>1ten zur 2ten                                 | der<br>2ten zur 3ten | der<br>3ten zur 4ten |
| 60°                        | 3,05                         | 1,39           | 1,50            | 1,97                      | 0,458                                                | .....                | 0,650                |
| 50                         | 2,74                         | 1,13           | 1,50            | 1,59                      | 0,452                                                | .....                | 0,649                |
| 40                         | 1,89                         | 0,85           | 1,50            | 1,22                      | 0,450                                                | 0,798                | 0,646                |
| 50                         | 1,56                         | 0,62           | 1,09            | 0,89                      | 0,456                                                | 0,801                | 0,954                |
| 20                         | 0,87                         | .....          | 0,69            | .....                     | .....                                                | 0,794                | .....                |

Also auch für solche sehr verschiedenartige Flüssigkeiten bleibt, bis auf nicht zu rechnende Unterschiede der Beobachtungen, die Progression aller Reihen dieselbe, wenn gleich die absolute Menge von Wärme, welche aus jeder dieser Flüssigkeiten frei wird, wegen ihrer verschiedenen Masse und Wärmecapacität nothwendig eine andere ist.

Es bleibt endlich noch der Einfluss der Substanz eines erkaltenden festen Körpers, wie hier des Gefasses, zu untersuchen. Hiezu wurden eine Kugel von Glas und eine andere von Eisenblech, beide mit Wasser gefüllt, der Erkaltung ausgesetzt; die blecherne war etwas grösser als die gläserne.

| Temperatur-<br>überschüsse. | Erkaltung der Kugeln |                  | Verhältnis |
|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
|                             | der<br>gläsernen     | der<br>blecherne |            |
| 60°                         | 1,59                 | 0°,90            | 1,54       |
| 50                          | 1,15                 | 0,75             | 1,55       |
| 40                          | 0,85                 | 0,54             | 1,57       |
| 30                          | 0,62                 | 0,38             | 1,65       |
| 20                          | 0,57                 | 0,21             | 1,76       |

Hier ändert sich der Gang der Erkaltung: das Eisen erkaltet schneller als das Glas, und was besonders bemerkenswerth ist, in höheren Temperaturen kehrt sich die Beschleunigung der Geschwindigkeit wieder um, wovon nachher die Rede seyn wird.

So viel ist indess durch diese vorläufigen Versuche ausgemacht, daß eine Flüssigkeit, wie das Quecksilber, eingeschlossen in Gefäßen von ein und derselben Substanz, wie in Glasröhren, das Grundgesetz der

Erhaltung in seiner Reinheit und Einfachheit zeigt, ohne durch eine mäßige Veränderung der Größe oder der Gestalt des Gefäßes gestört zu werden. Für die nachfolgenden Versuche sind daher gewöhnlich Quecksilberthermometer angewandt worden.

#### *Apparat für die Versuche über die Erhaltung.*

Die beiden Thermometer, welche zu diesen Versuchen dienten, hatten 6 und 2 Centimeter zum Durchmesser der Kugel; mit dem ersten wurden die niedern, mit dem andern die höhern Temperaturen gemessen: wo jenes aufhörte, fing dieses an, das bis 500° hinaufreichte. Sie waren mit höchstmöglicher Sorgfalt angefertigt, unterschieden sich aber von gewöhnlichen Thermometern nur dadurch, daß eine Mittelröhre von sehr kleinem Durchmesser die Röhre der Scale von der Kugel trennte. Wozu dies, wird aus der Beschreibung des nachfolgenden Apparats erhellen.

Zu Versuchen im leeren Raume war es nöthig, das Thermometer schnell in einen hinlänglich großen Raum, worin leicht laerer Raum hergestellt werden konnte, zu bringen. Dieser Raum mußte auch auf einer bestimmten Temperatur erhalten und leicht mit einer Gasart gefüllt werden können.

Hierzu diente ein Ballon von etwa 5 Decimeter Durchmesser, aus Kupfer dünn gearbeitet und mit einem kurzen Halse zur Aufnahme des Thermometers versehen. Dieser Ballon wurde bis an den Rand in eine hölzerne Wanne voll Wasser getaucht und darin durch Queerstäbe festgehalten. Da die Wände desselben sehr dünn waren, so nahmen sie leicht die Tem-



peratur der Wanne auf, und ein Ueberzug von Lampenrufs im Innern des Ballons hinderte den Einfluß der Strahlung auf das Thermometer. Durch Wasserdämpfe vermittelt einer Röhre konnte die Temperatur des Wasserbades erhöht werden.

Auf die Mündung des Ballons paßte genau eine angeschliffene und mit etwas Fett bestrichene Glasplatte, welche in der Mitte durchbohrt war und einen eingeschliffenen Glasstöpsel aufnahm, worin das Thermometer steckte. Glasplatte, Stöpsel und Thermometer waren also ein Stück und fest unter einander verbunden. Ueber das Thermometer wurde eine glockenförmige Röhre gestürzt, die auf die Glasplatte fest anschloß. Von der Spitze dieses engen Cylinders ging eine biegsame bleierne Röhre zu der Glocke einer Luftpumpe; die Röhre stand aber auch durch eine Fortsetzung mit der Glocke einer pneumatischen Wanne in Verbindung, wodurch ein Gas zugeleitet und ein bestimmter gleichmäßiger Druck hervorgebracht werden konnte. Die Glocke hing dazu in einer Rolle. Die Fortsetzung der Röhre hatte ein Mittelstück mit salzsaurem Kalk gefüllt, zur Austrocknung der Luftarten.

Wenn nun die Wasserwanne, worin der eingetauchte kupferne Ballon feststand, die angemessene Temperatur erhalten hatte, und das in der Glasplatte befestigte Thermometer fast bis zum Siedepunkt des Quecksilbers über einem Ofen (doch so, daß die Glasplatte von der Hitze unberührt blieb) erhitzt worden war, so setzte man es schnell auf die Mündung des Ballons. Durch die Zwischenröhre hing die Kugel bis in die Mitte des Ballons herab, indess die Röhre der Scale ganz außerhalb blieb. Ueber die Scale wurde

nun der enge Cylinder gestürzt, welcher schon vorher an die bleierne Röhre geschoben war. Während nun alles sorgfältig verkittet wurde, schöpfte man mit der Luftpumpe die Luft aus, welche durch eine kleine Oeffnung neben dem Thermometer in der Glasplatte ihren Ausgang fand. Wenn die Verdünnung auf höchste getrieben war, so bestimmte man an der Probe die Spannung der wenigen zurückgebliebenen Luft, schloß den Hahn und fing die Beobachtung an.

Dieses war das Verfahren für Versuche im leeren Raum, und in atmosphärischer Luft; wenn sie in Gasarten angestellt werden sollten, so schöpfte man zuerst die Luft aus, liefs das Gas hinein, schöpfte dies wieder aus, und liefs endlich das zum Versuch bestimmte Gas hinein, das jetzt nur mit einer äusserst geringen Menge atmosphärischer Luft vermischt seyn konnte.

Mit einer Secundenuhr wurden die gleichen Zeiträume der Erkältung abgemessen.

Noch wurden einige Berichtigungen an der Berechnung der Erkältung angebracht. Da nämlich die Scale des erhitzten Thermometers, wenigstens auf einige Augenblicke während der Zusammensetzung des Apparats, der Temperatur der Atmosphäre ausgesetzt war, so ging dadurch an der Säule in der Röhre so viel Wärme verloren, als der Stand der kältern Atmosphäre während dieser Zeit entziehen mußte: dies konnte leicht in Rechnung gebracht werden. Auch die geringe Vermehrung der Erkältung, welche während des Versuchs durch das Einsinken des kältern Quecksilbers der Thermometerrohre in die Kugel entstehen mußte, zog man in Rechnung. Endlich reduzirte man die Grade der Quecksilberthermometer auf

den Luftbarometer, vermittelt besonders ausgearbeiteter Tafeln, die aus den vorhergehenden Versuchen entnommen waren.

*Ueber die Erkaltung im leeren Räume.*

Das Vacuum für diese Versuche war so nahe vollkommen, daß höchstens nur ein Druck von 2 Millimeter übrig blieb: um aber richtige Resultate für den völlig luftleeren Raum zu erhalten, wurden vorläufig Erkaltungsversuche in dem mit Luft gefüllten Ballon unter verschiedenem Druck und bei verschiedenen Temperaturüberschüssen angestellt, um daraus die Beschleunigung der Erkaltung, die von der Luft ausgeht, zu bestimmen. Wurde diese Beschleunigung nun von der im künstlichen Vacuo schon sehr genähereten Resultaten abgerechnet, so ergab sich die Erkaltung im völlig luftleeren Räume.

Bei folgenden Versuchen im Vacuo war der Ballon mit schmelzendem Eise umgeben.

| Temperaturüberschüsse. | Erkaltung. |
|------------------------|------------|
| 240°                   | 10, 69     |
| 220                    | 8, 81      |
| 200                    | 7, 40      |
| 180                    | 6, 10      |
| 160                    | 4, 89      |
| 140                    | 3, 88      |
| 120                    | 3, 02      |
| 100                    | 2, 30      |
| 80                     | 1, 74      |

Die erste Reihe, eine arithmetische, enthält die Wärmegrade, um welche bei den verschiedenen Versuchen das Thermometer heißer war als  $0^{\circ}$ , die Temperatur des leeren Ballons und in der zweiten finden sich die Grade, um welche in gleichen kleinen Zeiträumen die Erkaltung bei den verschiedenen angegebenen Temperaturüberschüssen fortschritt, berechnet und berichtigt nach den vorhin angegebenen Grundsätzen.

Der bloße Anblick dieser Reihen zeigt schon, daß nicht, wie das Newton-Richmannsche Gesetz aussagt, die Erkaltung in einer gleichbleibenden geometrischen Reihe fortschreitet, wenn die Ueberschüsse der Temperatur eine arithmetische Reihe darstellen: denn hiernach müßte die Erkaltung bei  $200^{\circ}$  doppelt so groß als bei  $100^{\circ}$ , und bei  $240^{\circ}$  nur dreifach so groß als bei  $80^{\circ}$  seyn, und wir finden schon für jene mehr als das Dreifache und für diese beinahe das Sechsfache. Die Progression der Erkaltung wird also mit den höhern Temperaturen immer mehr beschleunigt.

Schon hier liefse sich das Erkaltungsgesetz bestimmt aussprechen, und durch eine Formel ausdrücken: doch, um das Phänomen von allen Seiten zu betrachten, müßten die Versuche abgeändert vervielfältigt werden. Es könnte nämlich möglich seyn, daß die Erkaltung einen andern Gang befolgte, wenn die Umgebung keine gleichbleibende auf  $0^{\circ}$  stehende Temperatur behauptet. Daher wurde für folgende Versuche die den Ballon umgebende Wasserwanne von  $0^{\circ}$  auf  $20^{\circ}$ , auf  $40^{\circ}$ , auf  $60^{\circ}$  und auf  $80^{\circ}$  erhöht.

| Temperatur-<br>über-<br>schüsse. | Erkältungsgeschwindigkeiten. |         |         |         |         |
|----------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | bei 0°                       | bei 20° | bei 40° | bei 60° | bei 80° |
| 290°                             | 10°, 64                      | 12°, 40 | 14°, 35 | ...     | ...     |
| 220                              | 8, 81                        | 10, 41  | 11, 98  | ...     | ...     |
| 200                              | 7, 40                        | 8, 58   | 10, 01  | 11°, 64 | 13°, 45 |
| 180                              | 6, 10                        | 7, 04   | 8, 20   | 9, 55   | 11, 05  |
| 160                              | 4, 89                        | 5, 67   | 6, 61   | 7, 68   | 8, 95   |
| 140                              | 3, 88                        | 4, 57   | 5, 32   | 6, 14   | 7, 19   |
| 120                              | 3, 02                        | 3, 56   | 4, 15   | 4, 84   | 5, 64   |
| 100                              | 2, 30                        | 2, 74   | 3, 16   | 3, 68   | 4, 29   |
| 80                               | 1, 74                        | 1, 99   | 2, 30   | 2, 73   | 3, 18   |
| 60                               | ...                          | 1, 40   | 1, 62   | 1, 88   | 2, 17   |

Hier sind die Verhältniszahlen der entsprechenden Glieder der ersten und zweiten Reihe, oder der Erkältungsreihen, wobey die Umgebung die Temperaturen 0° und 20° hatte:

1,16..1,18..1,16..1,15..1,16..1,17..1,17..1,18..1,15  
und der Glieder der 2. und 3. Reihe;

1,16..1,15..1,16..1,16..1,17..1,16..1,17..1,15..1,16..1,16  
und der Reihen von 40° und 60°:

... .. 1,15..1,16..1,16..1,15..1,17..1,16..1,18..1,16  
und der beiden letzten:

... .. 1,15..1,15..1,16..1,17..1,16..1,17..1,17..1,15

Der Gang der Erkältung bleibt also in allen Reihen bis auf eine zu übersehende Differenz ebenfalls gleichförmig, wenn die Temperatur der Umgebung sich ändert, und diese Erkältung stellt eine geometrische Reihe dar, während die Temperatur der Umgebung in einem arithmetischen Verhältniß wächst.

Wenn nun aber die Temperatur der Umgebung, statt wachsend, als beständig gesetzt wird, z. B. auf

0° oder den Gefrierpunkt, so muß die Progression der Erkaltung aufgehalten werden in dem Maasse, wie sie durch die Temperatursteigerung der Umgebung beschleunigt wurde, oder, mit andern Worten: Wenn ein Körper in einer leeren und auf einer beständigen Temperatur erhaltenen Umgebung erkaltet, und die Temperaturüberschüsse des erkaltenden Körpers über der Temperatur eine arithmetische Reihe darstellen, so bilden die Erkaltungsgeschwindigkeiten Glieder einer geometrischen Reihe, vermindert um eine beständige Zahl.

Diese beständige Gröfse findet man leicht aus den vorhin angegebenen Verhältnifsgrößen 1,16...1,18...1,15 u. s. w., aus welchen allen 1,165 das Mittel ist für 20 Grade; hieraus die zwanzigste Wurzel gezogen giebt  $\sqrt[20]{1,165} = 1,0077$ . (Diese Zahl sich zu merken, darf man nur daran denken, dafs sie nahe gleich ist dem Quadrat des Coefficienten der Ausdehnung der Gase: denn 1 Volum Gas dehnt sich in hundert Grade zu 1,375 aus, woraus für einen Grad  $\sqrt[100]{1,375}$ , und davon das Quadrat oder  $\sqrt[100]{1,375^2} = 1,007$  beinahe.)

Die beständige Zahl, um welche die Glieder der Erkaltungsreihen vermindert werden müssen, ist also für jeden Grad 1,0077 oder für 20 Grade  $1,0078^{20} = 1,165$ . Aber als Exponent der geometrischen Reihe der Erkaltung des Thermometers wird 2,037 gefunden.

Bezeichnen wir nun die beständige Zahl 10077 mit  $a$  und die Temperaturüberschüsse mit  $t$ , so sind die Erkaltungsgeschwindigkeiten obiger ersten Reihe für die Umgebung auf 0°

$$V = 2,037 (a^t - 1),$$

Venn die Umgebung auf  $20^{\circ}$  steht, wie in obiger weiten Reihe, so muß  $a^t - 1$  noch einmal mit  $a^{20} = 1,0077^{20} = 1,165$  multiplicirt werden, und die Erkaltung wird  $= 2,374 (a^t - 1)$ ; und so fort, wodurch für die Reihen von  $40^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$ ,  $80^{\circ}$  die Coefficienten von  $a^t - 1$  zu 2,766; 3,222; 3,754 anwachsen.

Hiernach berechnet ergeben sich für die vorhin beobachteten Erkaltungsgeschwindigkeiten folgende Reihe:

| Temperaturüber-<br>schüsse<br>oder Wer-<br>the von t. | Geschwindigkeiten der Erkaltung      |                                       |                                       |                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | für $0^{\circ}$<br>$2,037 (a^t - 1)$ | für $20^{\circ}$<br>$2,374 (a^t - 1)$ | für $40^{\circ}$<br>$2,766 (a^t - 1)$ | für $60^{\circ}$<br>$3,222 (a^t - 1)$ | für $80^{\circ}$<br>$3,754 (a^t - 1)$ |
| $240^{\circ}$                                         | $10^{\circ},68$                      | $12^{\circ},46$                       | $14^{\circ},44$                       | .....                                 | .....                                 |
| $220$                                                 | 8,89                                 | 10,56                                 | 12,06                                 | .....                                 | .....                                 |
| 200                                                   | 7,54                                 | 8,56                                  | 9,97                                  | $11^{\circ},61$                       | $13^{\circ},52$                       |
| 180                                                   | 6,03                                 | 7,01                                  | 8,17                                  | 9,52                                  | 11,09                                 |
| 160                                                   | 4,87                                 | 5,68                                  | 6,62                                  | 7,71                                  | 8,98                                  |
| 140                                                   | 3,89                                 | 4,54                                  | 5,29                                  | 6,16                                  | 7,18                                  |
| 120                                                   | 3,05                                 | 3,56                                  | 4,14                                  | 4,82                                  | 5,61                                  |
| 100                                                   | 2,33                                 | 2,72                                  | 3,17                                  | 3,69                                  | 4,30                                  |
| 80                                                    | 1,72                                 | 2,00                                  | 2,33                                  | 2,71                                  | 3,16                                  |
| 60                                                    | .....                                | 1,38                                  | 1,61                                  | 1,87                                  | 2,18                                  |
| 40                                                    | .....                                | 0,85                                  | .....                                 | .....                                 | .....                                 |
| 20                                                    | .....                                | 0,39                                  | .....                                 | .....                                 | .....                                 |

Diese berechneten Reihen stimmen mit den von hin aus Beobachtungen entnommenen Zahlen bis auf nicht zu rechnende Unterschiede so genau überein, daß an der Gültigkeit des aufgestellten Gesetzes nicht zu zweifeln ist: Um indess nichts zu versäumen, wurde das Gesetz an der Erkaltung eines mit Blattzilber belegten Thermometers geprüft, und zwar zuerst in seiner Umgebung von 30° und darauf von 80°. Der Erkaltungsverhältniß dieses mit Silber belegten Thermometers wurde für 0° 0,375 gefunden: dieses mit 1,0077° = 1,165 multiplicirt gab für die Temperatur 30° die Erkaltungsgeschwindigkeit 0,416 (at - 1), und für 80° die Erkaltung 1,0077° X 0,375 (at - 1) = 0,658 (at - 1).

| Temperaturherabsetzung oder Werthe von t. | Geschwindigkeiten der Erkaltung bei 30° |           | Geschwindigkeiten der Erkaltung bei 80° |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
|                                           | beobachtet                              | berechnet | beobachtet                              | berechnet |
| 300°                                      | 3°,05                                   | 3°,11     | ...                                     | ...       |
| 260                                       | 2,59                                    | 2,61      | ...                                     | ...       |
| 240                                       | 2,18                                    | 2,18      | 3°,40                                   | 3°,44     |
| 220                                       | 1,83                                    | 1,81      | 2,87                                    | 2,86      |
| 200                                       | 1,53                                    | 1,50      | 2,35                                    | 2,37      |
| 180                                       | 1,26                                    | 1,23      | 1,92                                    | 1,94      |
| 160                                       | 1,02                                    | 1,00      | 1,56                                    | 1,58      |
| 140                                       | 1,81                                    | 0,80      | 1,27                                    | 1,26      |
| 120                                       | 0,62                                    | 0,62      | 0,99                                    | 1,98      |
| 100                                       | 0,47                                    | 0,48      | 0,75                                    | 1,76      |
| 80                                        | 0,34                                    | 0,35      | 0,56                                    | 0,55      |
| 60                                        | 0,24                                    | 0,24      | ...                                     | ...       |
| 40                                        | 0,15                                    | 0,15      | ...                                     | ...       |
| 20                                        | 0,07                                    | 0,07      | ...                                     | ...       |



Die Richtigkeit des gefundenen Erkaltungsgesetzes bewährt sich hier an einer Scale von mehr als 300°.

Nun kann man sich aber die Temperatur der Umgebung eines erkaltenden Körpers so tief denken als man will: und wenn es möglich wäre, die absolute Erkaltung im leeren Raume, oder die Wärmeverluste eines Körpers ohne allen Ersatz von der Umgebung, zu beobachten, so würde bei einer in arithmetischer Progression wachsenden Temperatur die Erkaltungsgeschwindigkeit unaufgehalten in geometrischer Progression fortschreiten. Erst in diesem gedachten, aber unmöglichen Falle würde das Newton-Richmannsche Gesetz gültig seyn.

#### *Ueber die Erkaltung in den Luftarten.*

Ist die Erkaltung im leeren Raume bekannt, so darf man diese nur von der ganzen Erkaltung in einer Luft abziehen, um die Wirkung, welche der Luft allein angehört, zu erhalten. Aber um zu dem Gesetz der Erkaltung in Luftarten, wobei Körper verschiedener Natur mit verschiedenartigen Gasen unter verschiedenem Druck und bei sehr abweichender Temperatur zusammentreffen können, zu gelangen, bedarf es zahlreicher unter allen Umständen abgeänderter Versuche.

Da vorhin die verschiedenartige Substanz der Körper, Glas und Eisen, im leeren Raume eine auffallende Abweichung bewirkten, so schien die Untersuchung dieser Abweichung in Luftarten vorzüglich wichtig zu seyn. Glas und Silber verhalten sich in

Hinsicht ihrer Ausstrahlung besonders verschieden: man ließ daher ein mit Blattsilber belegtes und ein unbedecktes Thermometer in atmosphärischer Luft und in Wasserstoffgas von bestimmter Elasticität und Temperatur erkalten. Die Elasticität der Luftarten war 0,72 Millimeter und die Temperatur des Ballons  $20^{\circ}$ . Für die ersten Versuche von  $200^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$  in atmosphärischer Luft wurde das große Thermometer, und darauf für das Wasserstoffgas von  $80^{\circ}$  bis  $20^{\circ}$  das kleine Thermometer angewandt.

| Temperatur-<br>überschüsse. | Geschwindigkeiten der Erkaltung<br>des mit Silber bedeckten Thermometers |                                    |                        |                         | Luft-<br>art,                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                             | Sämmtliche<br>Erkaltung                                                  | für den lee-<br>ren Raum<br>allein | für die Luft<br>allein | Sämmtliche<br>Erkaltung |                               |
| 200°                        | 6°, 95                                                                   | 1°, 50                             | 5°, 45                 | 14°, 04                 | in<br>atmosphärischer<br>Luft |
| 180                         | 6, 02                                                                    | 1, 23                              | 4, 79                  | 11, 76                  |                               |
| 160                         | 5, 19                                                                    | 1, 00                              | 4, 19                  | 9, 85                   | in<br>Wasserstoff-<br>gas     |
| 140                         | 4, 52                                                                    | 0, 80                              | 3, 52                  | 8, 05                   |                               |
| 120                         | 3, 50                                                                    | 0, 62                              | 2, 88                  | 6, 46                   |                               |
| 100                         | 2, 80                                                                    | 0, 48                              | 2, 52                  | 4, 99                   |                               |
| 80°                         | 19°, 59                                                                  | 1°, 77                             | 17°, 82                | 22°, 96                 |                               |
| 60                          | 15, 97                                                                   | 1, 29                              | 12, 68                 | 16, 14                  |                               |
| 40                          | 8, 62                                                                    | 0, 87                              | 7, 75                  | 9, 87                   |                               |
| 20                          | 5, 74                                                                    | 0, 57                              | 5, 57                  | 4, 28                   |                               |

In der vierten und siebenten Columne dieser Tabelle finden sich die Erkaltungen, welche der Rechnung nach von den Luftarten allein ausgehen müssen, und welche aus den beiden vorhergehenden Columnen als Unterschiede der gänzlichen Erkaltung und der auch im leeren Raum Statt findenden Erkaltung erhalten werden: ihre Verhältniszahlen sind für das silberne und gläserne, sowohl in atmosphärischer Luft als in Wasserstoffgas bis auf geringe Differenzen die selben, und zeigen, dafs, unter übrigens gleichen Umständen, die Wärmeverluste durch eine Gasart von dem Zustande der Oberfläche des erkaltenden Körpers unabhängig sind.

Um ferner den Einfluß zu prüfen, den die verschiedenen Temperaturen der verschiedenen Gasarten auf die Erkaltung haben können, wurde das Thermometer in atmosphärischer Luft, in Wasserstoffgas und in Kohlensäure von  $20^{\circ}$ ,  $40^{\circ}$ ,  $50^{\circ}$ ,  $80^{\circ}$  Wärme aber gleicher Elasticität und darauf in atmosphärischer Luft von geringerer Elasticität der Erkaltung bei verschiedenen Temperaturüberschüssen überlassen, Die Elasticität war in den drei ersten Fällen beständig gleich 0,72 Millimeter und im letzten Falle = 0,56 M. In der folgenden Tabelle ist bloß die Erkaltung, welche von den Luftarten allein ausgeht, in Rechnung gebracht.

| Temperaturüberschüsse. | Erkaltungsgeschwindigkeiten |         |         |         | Luftarten.                             |
|------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
|                        | bei 20°                     | bei 40° | bei 60° | bei 80° |                                        |
| 200°                   | 5°,48                       | 5°,46   | ....    | ....    | in atmosphärischer Luft bei 0,72 M. M. |
| 180                    | 4,75                        | 4,70    | 4°,79   | ....    |                                        |
| 160                    | 4,17                        | 4,16    | 4,20    | 4°,15   |                                        |
| 140                    | 3,51                        | 3,55    | 3,55    | 3,49    |                                        |
| 120                    | 2,90                        | 2,93    | 2,94    | 2,88    |                                        |
| 100                    | 2,27                        | 2,28    | 2,24    | 2,25    |                                        |
| 80                     | 1,77                        | 1,73    | 1,71    | 1,78    |                                        |
| 60                     | 1,23                        | 1,19    | 1,18    | 1,20    |                                        |
| 160°                   | 14°,26                      | 14°,08  | 14°,18  | ....    | im Wasserstoffgase bei 0,72 M. M.      |
| 140                    | 12,11                       | 12,16   | 12,12   | 12°,08  |                                        |
| 120                    | 10,10                       | 10,13   | 10,20   | 10,19   |                                        |
| 100                    | 7,98                        | 7,83    | 8,03    | 8,05    |                                        |
| 80                     | 6,06                        | 5,97    | 6,01    | 6,00    |                                        |
| 60                     | 4,21                        | 4,17    | 4,18    | 4,20    |                                        |
| 200°                   | 5°,25                       | 5°,17   | ....    | ....    | in Kohlensäure bei 0,72 M. M.          |
| 180                    | 4,57                        | 4,63    | 4°,52   | ....    |                                        |
| 160                    | 4,04                        | 4,06    | 3,97    | 4°,10   |                                        |
| 140                    | 3,39                        | 3,39    | 3,34    | 3,43    |                                        |
| 120                    | 2,82                        | 2,80    | 2,79    | 2,83    |                                        |
| 100                    | 2,22                        | 2,18    | 2,21    | 2,20    |                                        |
| 200°                   | 4°,01                       | 4°,10   | ....    | ....    | in atmosphärischer Luft bei 0,36 M. M. |
| 180                    | 3,52                        | 3,50    | 3°,55   | ....    |                                        |
| 160                    | 3,03                        | 2,99    | 3,04    | 3°,09   |                                        |
| 140                    | 2,62                        | 2,57    | 2,62    | 2,66    |                                        |
| 120                    | 2,12                        | 2,16    | 2,14    | 2,15    |                                        |
| 100                    | 1,69                        | 1,71    | 1,67    | 1,73    |                                        |

Hier ist zwar die absolute Menge von Wärme, welche die verschiedenen Luftarten einem Körper rauben, nicht dieselbe, aber wohl der fortschreitende Gang der Wärmeberaubung, unter gleichen Umständen, d. i. unter gleicher Elasticität und Temperatur der umgebenden Luftarten: es ist also die Erkaltung von der Elasticität und Temperatur der Luftarten abhängig, von welcher chemischen Beschaffenheit diese übrigens auch seyn mögen.

Um die Abhängigkeit des Erkaltungsganges von der Elasticität der Luftarten noch näher und insbesondere zu untersuchen, beobachtete man die Erkaltung des Thermometers in atmosphärischer Luft, im Wasserstoffgase, in Kohlensäure und im oelbildenden Gase nach und nach bei 0,72; 0,36; 0,18; 0,09 und 0,045 Millimeter Druck, aber bei gleicher Temperatur dieser Luftarten.

| Temperatur-<br>über-<br>schüsse. | Geschwindigkeiten der Erkältung |                  |                  |                  |                   | erkäl-<br>tende<br>Luft-<br>arten. |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                  | unter<br>0,72 M.                | unter<br>0,36 M. | unter<br>0,18 M. | unter<br>0,09 M. | unter<br>0,045 M. |                                    |
| 200°                             | 5°, 48                          | 4°, 01           | 2°, 95           | 2°, 20           | 1°, 59            | atmos-<br>phäri-<br>sche<br>Luft   |
| 180                              | 4, 75                           | 3, 52            | 2, 61            | 1, 90            | 1, 37             |                                    |
| 160                              | 4, 17                           | 3, 03            | 2, 21            | 1, 62            | 1, 20             |                                    |
| 140                              | 3, 51                           | 3, 62            | 1, 91            | 1, 40            | 1, 03             |                                    |
| 120                              | 2, 90                           | 2, 12            | 1, 57            | 1, 15            | 0, 84             |                                    |
| 100                              | 2, 27                           | 1, 69            | 1, 23            | 0, 90            | 0, 65             |                                    |
| 80                               | 1, 77                           | 1, 29            | 0, 96            | 0, 70            | 0, 52             |                                    |
| 60                               | 1, 23                           | 0, 90            | 0, 65            | 0, 48            | 0, 35             |                                    |
| 40                               | 0, 75                           | ....             | ....             | ....             | ....              |                                    |
| 20                               | 0, 32                           | ....             | ....             | ....             | ....              |                                    |
| 180°                             | 16°, 59                         | 12°, 86          | 9°, 82           | 7°, 49           | 5°, 81            | Was-<br>ser-<br>stoff-<br>gas      |
| 160                              | 14, 26                          | 10, 97           | 8, 37            | 6, 49            | 4, 95             |                                    |
| 140                              | 12, 11                          | 9, 24            | 7, 11            | 5, 47            | 4, 24             |                                    |
| 120                              | 10, 10                          | 7, 83            | 5, 99            | 4, 64            | 3, 51             |                                    |
| 100                              | 7, 98                           | 6, 23            | 4, 72            | 3, 63            | 2, 80             |                                    |
| 80                               | 6, 06                           | 4, 62            | 3, 58            | 2, 77            | 2, 09             |                                    |
| 60                               | 4, 21                           | 3, 21            | 2, 48            | 1, 88            | 1, 46             |                                    |
| 200°                             | 5°, 25                          | 3°, 64           | 2°, 56           | 1°, 79           | 1°, 25            | Koh-<br>len-<br>säure              |
| 180                              | 4, 57                           | 3, 22            | 2, 25            | 1, 56            | 2, 09             |                                    |
| 160                              | 4, 04                           | 2, 80            | 1, 97            | 1, 37            | 0, 95             |                                    |
| 140                              | 3, 39                           | 2, 38            | 1, 65            | 1, 17            | 0, 80             |                                    |
| 120                              | 2, 82                           | 1, 97            | 1, 36            | 0, 95            | 0, 67             |                                    |
| 100                              | 2, 22                           | 1, 55            | 1, 08            | 0, 76            | 0, 52             |                                    |
| 80                               | 1, 69                           | 1, 17            | 0, 82            | 0, 57            | 0, 40             |                                    |
| 60                               | 1, 18                           | 0, 82            | 0, 57            | 0, 40            | 0, 28             |                                    |
| 200°                             | 7°, 41                          | 5°, 18           | 3°, 64           | 2°, 58           | 1°, 84            | ölbil-<br>den-<br>des<br>Gas.      |
| 180                              | 6, 45                           | 4, 57            | 3, 17            | 2, 22            | 1, 59             |                                    |
| 160                              | 5, 41                           | 3, 86            | 2, 72            | 1, 89            | 1, 34             |                                    |
| 140                              | 4, 70                           | 3, 31            | 2, 35            | 1, 63            | 1, 13             |                                    |
| 120                              | 3, 84                           | 2, 76            | 1, 92            | 1, 38            | 0, 96             |                                    |
| 100                              | 3, 12                           | 2, 21            | 1, 55            | 1, 08            | 0, 78             |                                    |
| 80                               | 2, 34                           | 1, 62            | 1, 15            | 0, 79            | 0, 62             |                                    |

Sucht man das Verhältniß der entsprechenden Glieder der Erkaltungsreihen unter dem verschiedenen Drucke dieser Luftarten, so findet man als mittlere Exponenten

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| für die atmosphärische Luft | 1, 366; |
| für das Wasserstoffgas      | 1, 301; |
| für das kohlen saure Gas    | 1, 431; |
| für das oelbildende Gas     | 1, 415. |

Mit diesen Exponenten bildet die Erkältungsfähigkeit dieser Gase eine geometrische Progression, während auch ihre Elasticität eine geometrische Reihe unter dem Exponenten  $n$  darstellt.

Uebrigens wachsen die Erkältungen jedes einzelnen Gases mit den Temperaturüberschüssen nach einem gleichbleibenden Gesetz, unabhängig von der Elasticität des Gases.

Endlich waren noch die Geschwindigkeiten der Erkaltung, welche jene vier Luftarten bei gleicher Temperatur und Elasticität auf einem verschieden erwärmten Thermometer ausüben, zu beobachten. Ihre Temperatur war  $0^{\circ}$ , und ihre Elasticität beständig gleich 0,72 Millimeter:



| Temperatur-<br>überschüsse. | Erkaltungsgeschwindigkeiten.    |                            |                        |                             | Verhältniß der Reihen           |                                 |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                             | in atmos-<br>phärischer<br>Luft | in<br>Wasser-<br>stoffgase | in<br>Kohlen-<br>säure | in<br>ölbilden-<br>den Gase | der<br>ersten<br>zur<br>zweiten | der<br>ersten<br>zur<br>dritten | der<br>ersten<br>zur<br>vierten |
| 200°                        | 5°, 48                          | • • • •                    | 5°, 25                 | 7°, 41                      | • • • •                         | 0, 958                          | 1, 55                           |
| 180                         | 4, 75                           | 16°, 59                    | 4, 57                  | 6, 45                       | 3, 49                           | 0, 962                          | 1, 56                           |
| 160                         | 4, 17                           | 14, 26                     | 4, 04                  | 5, 41                       | 3, 42                           | 0, 968                          | 1, 30                           |
| 140                         | 3, 51                           | 13, 11                     | 3, 39                  | 4, 70                       | 3, 45                           | 0, 965                          | 1, 55                           |
| 120                         | 2, 90                           | 10, 10                     | 2, 82                  | 3, 84                       | 3, 48                           | 0, 972                          | 1, 52                           |
| 100                         | 2, 17                           | 7, 98                      | 2, 22                  | 3, 12                       | 3, 51                           | 0, 977                          | 1, 37                           |
| 80                          | 1, 77                           | 6, 06                      | 1, 69                  | 2, 34                       | 3, 45                           | 0, 985                          | 1, 52                           |

Die in den drei letzten Columnen aufgeführten Exponenten oder die Zahlen, welche das Verhältniß der entsprechenden Glieder der vier Erkaltungsreihen angeben, sind in jeder Columne nahe gleich und zeigen, daß das Erkaltungsgesetz (in den verschiedenen Luftarten, bei gleicher Temperatur und Spannung ein und dasselbe bleibt und von der chemischen Beschaffenheit und Dichtigkeit derselben unabhängig ist. Aus der Vergleichung dieser Reihen mit den Erkaltungsreihen in dem leeren Raume, worin die Ausstrahlung allein die Wärmeverluste bewirkt, erhellt auch, daß das hier gesuchte Gesetz von dem Ausstrahlungsgesetze durchaus verschieden ist.

Nach mühsamen, oft vergeblichen Rechnungsversuchen, die hier nicht angeführt werden, fand sich endlich, daß die Wärmemengen, welche ein Gas für sich allein, abgesehen von der Ausstrahlung, einem Körper entzieht, in geometrischer Progression wachsen, wenn auch die Temperaturen dieses Körpers in geometrischer Progression zunehmen. Der Exponent der letzten Reihe ist 2, während jene den Exponenten 2,55 hat. Die Richtigkeit dieses Gesetzes kann man an den Reihen der vorigen Tabelle leicht prüfen.

Wenn nun die gefundenen einzelnen Gesetze der Erkaltung in den Luftarten zu einem Ganzen zusammengekommen werden, so sieht man, daß weder die Oberfläche eines erkaltenden Körpers die Menge des Wärmeverlusts bestimmt, noch auch die Dichtigkeit und Temperatur der Luftarten die Erkaltung ändern, sofern nur nicht dadurch der Druck ein anderer wird: so daß am Ende bloß von der Elasticität das Erkälungsvermögen einer Luft abhängt. Diese Elasticität

und die Temperaturüberschüsse des erkaltenden Körpers sind die beiden einzigen Elemente der Erkaltung.

*Wiederholung.*

1) Die verschiedenen Gasarten werden durch die Wärme auf gleiche Weise ausgedehnt, nicht blofs in niedern, sondern auch in höhern Temperaturen bis über 300°.

2) Sie dehnen sich aber nicht mit dem Quecksilber gleichförmig aus: ein Quecksilberthermometer eilt besonders in hohen Temperaturen dem Luftthermometer voraus.

3) Der Siedepunkt des Quecksilbers ist genau bei 360° C seiner eignen Scale, und bei 350° des Luftthermometers.

4) Die Ausdehnung des Quecksilbers bleibt nicht in allen Temperaturen gleichmäfsig: sie beträgt zwischen 0° und 100°  $\frac{1}{5550}$ , zwischen 100° und 200°  $\frac{1}{5425}$  und zwischen 200° und 300°  $\frac{1}{5300}$  seines Volums für jeden Centesimalgrad.

5) Auch die Ausdehnung der festen Körper ist so wenig gleichförmig, dafs in derselben Temperatur, wobei das Luftthermometer auf 300° und das Quecksilberthermometer auf 314, 15° steht, das Platin 311°, 6, Kupfer 328°, 8, Glas 352°, 9 und das Eisen 372°, 6 anzeigt.

6) Nicht weniger nimmt die Wärmecapacität des Quecksilbers und der festen Körper in höhern Temperaturen zu.

7) Könnte man die Erkaltung eines Körpers in

einer leeren, absolut wärmefreien Umgebung beobachten, so würden die Erkaltungsgeschwindigkeiten nach geometrischer Progression wachsen, während die Temperaturen in arithmetischer Progression abnehmen.

8) Bei gleicher Temperatur einer leeren Umgebung nehmen die Erkaltungsgeschwindigkeiten eines Körpers ab, wie die Glieder einer geometrischen Reihe vermindert um eine beständige Zahl, während die Temperaturüberschüsse eine arithmetische Reihe darstellen. Der Exponent der geometrischen Reihe ist bei allen Körpern derselbe und gleich 1,0077 für jeden Grad C.

9) Die Erkältung, welche ein Gas für sich allein, abgesehen von der Ausstrahlung, bewirkt, ist völlig unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche der Körper.

10) Die Erkaltung durch ein Gas allein ändert sich in geometrischer Progression, wenn auch die Temperaturüberschüsse eine geometrische Reihe bilden. Ist der Exponent der ersten 2, so hat diese den Exponenten 2,55 für jede Gasart.

11) Das Erkaltungsvermögen eines Gases vermindert sich nach geometrischer Progression, wenn auch seine Spannung in geometrischer Progression abnimmt. Hat die erste Progression den Exponenten 2, so ist der Exponent der zweiten 1,566 für die atmosphärische Luft, 1,501 für das Hydrogengas, 1,431 für die Kohlensäure und 1,415 für das ölbildende Gas.

12) Das Erkaltungsvermögen einer Gasart ändert sich mit deren Temperatur nur in so fern, als dadurch die Elasticität des Gases eine andere wird; so daß am Ende die Erkaltung eines Körpers bloß von der Spannung des Gases, das ihn umgiebt, abhängig ist.

**Versuche über die Ausdehnung der Gläser  
und Metalle in der Wärme, angestellt von  
La Place und Lavoisier im Jahre 1782.**

(Aus dem Französischen \*) übersetzt von I. L. G. Meincke.)

Durch die Erfahrung derer, die vor 1781 sich mit Versuchen über die Ausdehnung der Körper in der Wärme beschäftigt haben, waren wir bekannt mit den Ursachen der Irrthümer, wodurch die Ergebnisse ihrer Arbeiten unsicher werden; diese suchten wir zu vermeiden,

Zuerst ließen wir mehrere sehr genaue Quecksilberthermometer verfertigen, woran der Punkt des schmelzenden Eises und des siedenden Wassers bezeichnet war. Jeder Grad der 80theiligen Scale hatte eine Länge von etwa 2 Linien und konnte leicht nach dem Augenmaasse in Zehntel getheilt werden. Da wir aber bei aller Sorgfalt, welche der Künstler auf diese Thermometer gewandt hatte, doch noch einige Unregelmäßigkeit in ihrem Gange besorgten, so berichtigten wir sie alle durch Vergleichung mit einer sichern Normalscale und arbeiteten für jedes eine Correctionstabelle aus.

Zur Erwärmung der Körper bedienten wir uns keines erhitzten Luftraumes, da es schwierig ist alle Theile desselben auf einem gleichen Grade der Temperatur zu erhalten: wir zogen eine Waanne vor, die wir anfangs mit zerstoßenem Eise und dann mit Was-

\*) *Traité de Physique* p. Biot, 1816, I, 151.

ser anfällten, und dessen Temperatur wir allmählig vom Eispunkt bis zum Siedepunkt des Wassers steigern konnten. Dieses Gefäß konnte Stangen von sechs Fufs Länge fassen.

Wir operirten in einem Garten an freier Luft. Die Unterlagen unsers Pyrometers bestanden aus grofsen Quadersteinen, und ruheten auf einem gemauerten Grunde von sechs Fufs Tiefe auf festen Erdboden.

Endlich wählten wir zur Vervielfältigung der Bewegung der erwärmten Stangen keine Räder, sondern starke Hebel, die sich nicht biegen konnten. Die Hebel setzten ein sechs Fufs langes, auf einer Achse ruhendes achromatisches Fernrohr in Bewegung. Dieses war gerichtet auf einen in Zolle und Linien gerichteten Maafsstab, der nach Maafsgabe der Versuche bald 100 bald 200 Toisen entfernt gestellt war. Wenn sich eine Stange von sechs Fufs um eine Linie verlängerte, so drehete sich dadurch das Fernrohr so weit, dafs dadurch an dem Zielmaafse in einer Entfernung von 100 Toisen ein Raum von 62 Zoll oder 744 Linien beschrieben wurde: dadurch erhielten wir für die Linie eine Theilung in 744. Wir hätten noch eine doppelt so grofse Genauigkeit erhalten können, wenn wir das Ziel 200 Toisen weit entfernten, wie dies bei unsern ersten Versuchen geschah; allein wir bemerkten bald, dafs die in der Atmosphäre häufig verbreiteten Dünste den Zielpunkt verdunkelten und dafs wir dadurch mehr Genauigkeit verloren, als wir durch die Vergröfserung des Maafsstabes gewannen.

Nach diesen Grundsätzen richteten wir im Allgemeinen den von uns angewandten Pyrometer ein. Jetzt wollen wir eine ausführliche Beschreibung desselben mittheilen.

mmmm Fig. 1. Taf. 2. sind die vier großen auf einer Mauer ruhenden Quadersteine, welche das ganze Instrument tragen. Jeder Pfeiler war 2 Fufs breit und 1 Fufs dick. Zwischen denselben war ein Raum von 3 Fufs, ausgefüllt durch einen aus Ziegeln gebaueten Ofen rs, worauf der längliche Kessel stand, worin die Stangen von 6 Fufs Länge dem Versuche unterworfen wurden.

oo ist das sechs Fufs lange Fernrohr, beweglich in zwei Angeln und gerichtet auf den getheilten Maafsstab, der 100 oder 200 Toisen weit entfernt befestigt war.

Schon der Anblick der Figur zeigt, wie die Stange bei dem Versuche auf das Fernrohr wirkt und dasselbe in Bewegung setzt. Man sieht hier die Stange bb gehalten von starken gläsernen Stäben zx, welche mit Rollen versehen sind, damit die Verlängerung oder Verkürzung der Stange keinen Widerstand findet.

ff ist ein anderer senkrechter Glasstab, durch eiserne Querstäbe mit den steinernen Pfeilern m und m' fest verbunden. An diesen gläsernen Stab lehnt sich, als an einer festen Widerlage, das Ende b der Stange bb' bei den Versuchen,

Das andere Ende b' derselben Stange legt sich bei l an einen ähnlichen Glasstab cl, der aber statt, wie der vorige, fest und unbeweglich zu seyn, bei c mit dem Arme des eisernen Hebels c' sich verbindet, und mit demselben eine gemeinschaftliche Bewegung um die Achse c hat

Die Stange bb' findet also einen unüberwindlichen Widerstand bei b, wo ihr fester Punkt ist, und kann sich nur nach dem andern Ende b' hin verlän-

gern; aber sie kann sich nicht verlängern, ohne den Stab  $cl$  und damit den Punkt  $l$  im Verhältniß der Verlängerung fortzuschieben. Der Punkt  $l$  kann nun nicht weichen, ohne den Punkt  $l'$  um eine entsprechende Höhe zu erheben, und hierdurch wird wieder das auf seiner Achse  $a$  bewegliche Rohr an der Seite des Augenglases bei  $o'$  gehoben, und bei  $o$  geneigt.

Endlich sieht man leicht, 1) daß bei einer sehr geringen Drehung das Rohr auf dem 100 oder 200 weit entfernten Maassstabe einen beträchtlichen Raum beschreibt; und 2) daß wenn die Länge des Hebelarms und die Entfernung des Fernrohres von dem Ziele des Maassstabes bekannt ist, das Verhältniß der Verlängerung der Stange zu den Zollen und Linien des Maassstabes sich leicht berechnen läßt.

Nachdem wir das Instrument beschrieben haben, wollen wir angeben, wie wir operirten, und welche vielfältige Vorsicht wir anwandten, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen.

Zuerst legten wir die Stange  $bb'$ , die wir dem Versuche unterwerfen wollten, an ihren Ort und auf die Stollen  $xx$  der gläsernen Stäbe  $zx$ . Das eine Ende  $b$  lehnte sich an die Glassäule  $ff$  und bildete, wie gesagt, den festen Punkt; das andere Ende  $b'$  wurde in Verbindung gesetzt mit dem Glasstabe  $cl$ , der sich um die Achse  $c$  bewegte. Um zu verhindern, daß die Enden  $b$  und  $b'$  nicht durch eine zufällige Bewegung abglitten, befestigten wir an beiden Enden der Stangen eine kleine Fassung, bestehend aus einem schmalen und biegsamen Kupferstreifen, wie man bei  $nn$  Fig. 2 sieht. Dieses kleine Band um die Stange gewunden und an den Enden gabelförmig abgeschnitten, umfaßte die gläsernen Stäbe und gab dem Appa-



rate hinlängliche Festigkeit ohne die Verlängerung im Geringsten zu hindern.

Waren die Stangen an ihren Ort gelegt, so füllten wir das Gefäß *g* mit zerklopftem Eise. Allein wir bemerkten bald, daß das Eis zuweilen hohle Räume bildete unter der Stange, und daß diese dann von dem Gewicht der obern Eisschichten gedrückt und gebogen wurden, wodurch die Länge eine Aenderung erlitt. Wir entschlossen uns daher, statt Eis kaltes Wasser anzuwenden, und so lange schmelzendes Eis zuzusetzen, bis das Wasser zu Null erkaltet war. Es ist aber bekannt, daß, welche Temperatur auch das Wasser hat, es sich zu Null d. h. bis zum Gefrierpunkt erkaltet, und hier stehen bleibt, wenn man nur mehr Eis zusetzt, als darin schmelzen kann.

Sobald die an verschiedenen Stellen des Gefäßes aufgestellten Thermometer übereinstimmend auf Null standen und unveränderlich stehen blieben, so untersuchten wir, auf welchen Theilstrich des Maafsstabes der horizontale Faden des Fernrohres hinzeigte.

Bei unsern ersten Versuchen zündeten wir Feuer an in dem Ofen *rs*, und erhitzen dadurch allmählig das Wasser des Kessels *g* von Grad zu Grad vom Eispunkte bis zum Sieden; zu gleicher Zeit beobachteten wir das Steigen des Thermometers und das entsprechende Fortrücken des Fernrohres und erhielten von 5 zu 5 Graden übereinstimmende Resultate, sowohl bei steigender als sinkender Wärme. Doch zeigten sich uns nachher einige Unbequemlichkeiten dieses Verfahrens. Die Thermometer gaben nicht an allen Stellen des Bades genau gleiche Grade an, ohngeachtet wir das Wasser sorgfältig bewegten; die Stangen erhitzen sich gemeinlich schneller als die Thermometer, so

dafs also die Wärme des Bades und der Stange gleich unsicher war.

Außerdem hatten wir Gründe zu besorgen, dafs die Wärme des Ofens auf die eisernen Queerstäbe und übrigen Theile des Apparats einwirkte. Wir änderten daher unser Verfahren. Statt das Gefäß durch den Ofen zu erhitzen, ließen wir das Wasser durch einen Hahn ablaufen, und schütteten Wasser hinzu, das in einem beistehenden Hessel kochend erhalten wurde. Dadurch erhielten wir freilich nicht völlig die Hitze des siedenden Wassers, indem sich das Wasser bei dem Ueberschöpfen etwas erkältete, aber es fehlten doch selten mehr als drei bis vier Grad.

Durch dies veränderte Verfahren gewannen wir den Vortheil, den Versuch mehrere Male an einem Tage wiederholen zu können: denn es war leicht heißes Wasser abzulassen, gefrierendes Wasser zuzusetzen und wieder siedendes Wasser nachzuschütten, und so wiederholt unsere Versuche zu berichtigen.

Auf diese Weise haben wir fast alle Versuche drei- und viermal wiederholt, nicht allein an einem Tage, sondern fast immer zu mehreren von einander entfernten Zeiten, so dafs wir selten um mehr als ein oder zwei Hunderttheile einer Linie ungewiß blieben.

Obgleich nun die Schwierigkeiten des ersten Verfahrens uns hinderten die allmähliche Ausdehnung und Zusammenziehung der Körper gleichsam von Grad zu Grad zu beobachten, so waren doch die ersten Versuche nicht vergeblich: sie zeigten uns, 1) dafs ein Körper, welcher vom Frostpunkte bis zum Siedepunkte des Wassers erhitzt und darauf wieder bis zum Frostpunkte erkältet wird, ganz genau wieder seine erste Ausdehnung annimmt; 2) dafs die Ausdehnungen

der Metalle und Gläser genau proportional sind der Ausdehnung des Quecksilbers, so daß eine doppelte Anzahl von Thermometergraden eine doppelte, und eine dreifache wieder eine dreifache Ausdehnung u. s. w. angiebt.

Nur der gehärtete Stahl hat sehr ausserordentliche Abweichungen dar. Zwar haben wir ihn nur bis 65° erhitzt, doch konnten wir uns überzeugen, daß sein Ausdehnungsvermögen nach und nach auf eine merkliche Weise abnimmt. Diese dem Stahl eigenthümliche Eigenschaft schien uns leicht erklärlich: unsere, so wie *Smeatons* und *Berthouds* Versuche beweisen übereinstimmend, daß gehärteter Stahl ausdehnbarer ist als roher; nun ist aber auch bekannt, daß der Stahl sich enthärtet bei dem Glühen und in den Zustand des Rohstahls zurückkehrt: es ist mithin mehr als wahrscheinlich, daß der im kalten Wasser gehärtete Stahl einen Anfang von Enthärtung erleidet, wenn man ihn bis zu 65 Grad erhitzt: er muß folglich, so wie man ihn im Wasser erhitzt, allmählig an Ausdehnbarkeit verlieren, und sich dem ungehärteten Stahle nähern.

Das Glas zeigte sich sehr verschieden nach seiner Güte, nach dem Grade der Kühlung und dem Verhältniß seiner Bestandtheile; wir glaubten hierüber besonders unsere Versuche vervielfältigen zu müssen. Wir fanden es um so ausdehnbarer je mehr es Blei enthielt. Wir bedauerten nur nicht im Stande zu seyn, selbst nach uns bekannten Verhältnissen Gläser zu fertigen, wodurch unsere Versuche an Interesse gewonnen haben würden.

Noch hatten wir bei unsern zahlreichen mit dem Eisen angestellten Versuchen Gelegenheit zu bemerken,

362 La Place und Lavoisier üb. d. Ausdeh. etc.

dafs die Ausdehnbarkeit desselben nach dem verschiedenen Zustande, worin es sich befindet, sehr abweichend sich verhält: und dies bestätigt uns, was wir schon wufsten, dafs das Eisen der Werkstätten selten ein und dasselbe Metall ist. Auch fanden wir, dafs das Zinn von Cornwall weniger ausdehnbar ist als das Ostindische; endlich, dafs sich das Blei mehr als alle übrigen (hier untersuchten festen) Metalle ausdehnt.


Das Platin zu bearbeiten und hämmerbar zu machen, war zur Zeit unserer Versuche noch nicht bekannt: wir konnten daher seine Ausdehnbarkeit nicht untersuchen.

Die Resultate der Versuche sind auf beifolgender Tafel zusammengestellt.

---

## er Wärme.

| Ausdehnung in gemeinen Brüchen ausgedrückt. |                           |                 |       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Glas                                        | rostpunkt bei einem Grade | bei einem Grade |       |
|                                             | in Siedepunkt             | C.              | R.    |
| Spiegelglas                                 | 12                        | 112747          | 89798 |
| Röhre von                                   | 42                        | 114191          | 91333 |
| Eine andere                                 | 14                        | 111408          | 89126 |
| Eine dritte                                 | 50                        | 118991          | 87129 |
| Englische                                   | 48                        | 124834          | 99867 |
| Französische                                | 47                        | 113680          | 91744 |
| Kupfer                                      | 31                        | 780671          | 46446 |
| Ein anderes                                 | 4                         | 78404           | 46723 |
| Messing                                     | 33                        | 73313           | 41810 |
| Ein anderes                                 | 9                         | 72918           | 42334 |
| Weiches                                     | 19                        | 81937           | 63449 |
| Eisendraht                                  | 12                        | 81137           | 64926 |
| Ungehärtet                                  | 27                        | 92699           | 74139 |
| Anderer                                     | 26                        | 92630           | 74104 |
| Gehärtete                                   |                           |                 |       |
| Stahl, . . .                                |                           | 73018           | 58413 |
| Anderer . . .                               |                           | 72139           | 57729 |
| Anderer                                     | 07                        | 80674           | 64332 |
| Blei -                                      | 11                        | 33108           | 28086 |
| Ostindische                                 | 16                        | 31609           | 41287 |
| Englische                                   | 81                        | 46161           | 36929 |
| Cupellen                                    | 14                        | 32363           | 41890 |
| Pariser                                     | 24                        | 32392           | 41914 |
| Fein Gold                                   | 824                       | 68202           | 34361 |
| Pariser                                     | 44                        | 64132           | 31361 |
| Dasselbe                                    | 61                        | 66067           | 32834 |



## N o t i z e n .

- 1) Ueber Entfärbung des in der Nordhäuser Schwefelsäure aufgelösten Indigs durch Hydrogen.

Vom

Dr. *P l e i s c h l* in Prag.

Nach *J. Holt* \*) wird eine Indigauflösung in der concentrirten Schwefelsäure durch Hydrogen, wenn dieses durch Zink oder Eisenfeile in der Auflösung selbst entwickelt wird, desoxydirt und daher entfärbt.

Dieses kann ich durch meine Erfahrung bestätigen.

Ich brachte zu einer Indigauflösung in der Nordhäuser Schwefelsäure in zwei Gefäßen Eisenfeile und granulirtes Zink. Die Entwicklung von Hydrogen erfolgte, weil die Auflösung sehr concentrirt war, natürlich dann erst, als sie mit Wasser verdünnt wurde. Die Entfärbung erfolgte erst, als die Gefäße vor dem Zutritte der atmosphärischen Luft geschützt wurden, durch Zink in 24 Stunden vollkommen, die Indigauf-

---

\*) *Annal. d. Chim. et d. Phys.*, T. VIII, p. 442.

lösung wurde wasserklar; durch die Eisenfeile erst viel später und nicht vollkommen, die vorher satt dunkelblaue Auflösung wurde nur licht himmelblau. Hydrogen in einem andern Gefäße entwickelt, und durch eine ebenfalls mit gleicher Menge Wasser verdünnte Indigauflösung durchzuströmen gezwungen, bewirkte nach langer Zeit nur sehr geringe, kaum bemerkbare Entfärbung. Die durch Hydrogen entfärbte wasserklare Flüssigkeit, der Einwirkung der atmosphärischen Luft durch 2 Tage ausgesetzt, wurde nur weingelb, auch nach 4 Tagen war sie nicht anders gefärbt, die blaue Farbe kam nicht mehr zum Vorschein. Eben so war die licht himmelblaue Flüssigkeit nach 4 Tagen nicht dunkler, im Gegentheile noch lichter blau gefärbt. Nach *Holt* soll aber die blaue Farbe wieder erscheinen. Weil durch Hydrogen allein, wenn man es durch eine Indigauflösung durchströmen läßt, beinahe keine Entfärbung bewirkt wird, so glaube ich, daß das aus der Zersetzung des Wassers sich bildende Eisen- oder Zinkoxyd zur Entfärbung wesentlich nothwendig sey, um die Schwefelsäure zu binden, und dadurch den Indig frei zu machen, in welchem Zustande dann das Hydrogen desoxydirend auf ihn einwirken kann. Ich kann zur Bestätigung meiner Meinung folgenden Versuch anführen.

Schwefelsaure Indigauflösung, welche das Lakmuspapier sehr stark röthete, wurde mit Zinkoxyd zusammengebracht, durch eine halbe Stunde unter öfterem Umrühren stehen gelassen; dann filtrirt, um das überschüssige Zinkoxyd zu entfernen. Die filtrirte Flüssigkeit war schön grün, röthete blaues Lakmuspapier nur sehr wenig, durch Säuren geröthetes wurde sehr schwach blau gefärbt. Durch diese grüne



flüssigkeit wurde Hydrogen durch mehrere Stunden durchgetrieben, wodurch sie bedeutend gebleicht wurde.

*Anmerkung.* Zu diesen Versuchen wurde eine schon vor einem Jahr bereitete Indigauflösung angewandt.

---

## 2) Ueber neue vegetabilische Alkalien.

In dem nächsten Hefte sollen mehrere diesen Gegenstand betreffende Abhandlungen mitgetheilt werden:

1) Schon in der Mitte Mai's 1819 entdeckte Herr Dr. *Brandes* in Salzauffeln ein neues vegetabilisches Alkali in den sogenannten Stephanskörnern (*Delphinium staphisagria*), welches er unter dem Namen *Delphinin* in einer Abhandlung beschrieb, die sich seit mehreren Monaten in meinen Händen befindet. Sonderbare Störungen in der mit Bestellungen überhäuftem Druckerey veranlafsten eine mehrere Monate dauernde Unterbrechung im Drucke dieser Zeitschrift, und dadurch auch die verspätete Mittheilung dieser Abhandlung. Mit derselben zugleich soll mitgetheilt werden:

2) Die Entdeckung eines neuen Pflanzenalkali's in den Saamen des *Veratrum Sabadilla*, vom Herrn Dr. *Meissner* in Halle. Er nennt dasselbe vorläufig *Sabadillin*.

3) Ueber das *Morphium* und die *Mekonsäure* hat Herr *Geyer* in Bremen eine Abhandlung eingesandt, worin er das Eigenthümliche des *Morphiums* als eigene alkalische Gattung bestreitet, und die, wenn gleich dieser ihr Hauptzweck nicht so weit erreicht wird, um volle Ueberzeugung zu bewirken, doch wegen mehreren interessanten Bemerkungen über diesen Gegenstand sich hier anreicht und so eben dem Drucke übergeben wurde, um im folgenden Hefte zu erscheinen.

---

3) Eine neue Schwefelsäure, welche mit Baryt ein leicht auflösliches Salz giebt.

*Gay-Lussac* und *Welther* haben eine neue saure Verbindung des Schwefels und Oxygens, welche in der Mitte liegt zwischen schwefeliger Säure und Schwefelsäure entdeckt. Wenn wir die schweflige Säure ansehen als zusammengesetzt aus 4 Maastheilen Schwefel und 4 Maastheilen Oxygen, die Schwefelsäure aber als eine Verbindung von 4 Maastheilen Schwefel und 6 Maastheilen Oxygen: so wird wahrscheinlich, daß diese in der Mitte liegende Säure aus 4 Maastheilen Schwefel und 5 Maastheilen Oxygen bestehe.

Diese Schwefelinsäure (oder Sulphurinsäure — sulphurin acid) wird erhalten, wenn man einen Strom schwefeligsaures Gas über schwarzes Manganoxyd streichen läßt. Es erfolgt eine Verbindung und der Ueberschuß an Manganoxyd scheidet sich ab durch Auflösung des Mangan-Schwefelin-Salzes

(schwefelinsuren Mangans) im Wasser. Kaustischer Baryt schlägt das Mangan nieder und bildet mit der Schwefelinsäure ein sehr auflösliches Salz, welches regelmäfsig krystallisirt gleich dem salpetersauren oder salzsauren Baryt. Zu der Auflösung dieses Baryt-Schwefelinsalzes wird nun behutsam Schwefelsäure gesetzt, welche den Baryt niederschlägt, während die Schwefelinsäure aufgelöst bleibt im Wasser. Diese Säure läfst sich beträchtlich concentriren. (S. *Thomson's Annales of philos.* May 1819. S. 380).

Wir fügen bei, dafs noch eine vierte saure Verbindung zwischen Schwefel und Oxygen neuerlich dargethan wurde vom Dr. *Herschel* in England.

---

#### 4) Neue Verbindung zwischen Oxygen und Hydrogen.

*Thenard* hat im Verfolge seiner Versuche über oxydirte Säuren (s. B. 24. S. 251) die Existenz einer neuen Verbindung zwischen Oxygen und Hydrogen ausser Zweifel gesetzt. Es ist dieß ein Fluidum, weniger flüssig als Wasser und darin auflöslich nach jedem Verhältnisse. Daher kann es fast wasserfrey dargestellt werden, indem man die Flüssigkeit unter den Recipienten einer Luftpumpe neben Schwefelsäure stellt. In diesem wasserfreien Zustande so concentrirt als möglich ist ihr specifisches Gewicht 1,417. Sie

zerstört, oder bleicht alle organischen Stoffe. Läßt man einen Tropfen davon auf Silberoxyd fallen, so wird das Oxyd zersetzt mit Explosion und öfters unter Lichterscheinung (*Thomsons Annalen a. a. O.*)

---

A u s z u g  
des  
eteorologischen Tagebuches  
vom  
Professor *Heinrich*  
in  
Regensburg.

---

März 1819.

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Substanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phytteamakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Kügelchen zusammenzufliessen, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

Einwirkung der Hitze wird die ganze Masse flüssig, stößt einen starken, unangenehmen, widrigen, etwas scharfen, und schwach betäubenden Geruch aus, welcher keinesweges dem angenehmen Dunste des brennenden Wachses zu vergleichen war. Als Rückstand hinterließ die verbrannte Substanz eine ansehnliche Kohle.

*Alkohol* war in der Kälte fast ohne alle lösende Wirkung auf diesen Stoff; beim Sieden des Alkohols fand aber vollständige Lösung des letzteren Statt. Die Lösung selbst war ganz farbenlos und durchsichtig; beim Erkalten aber trübte sie sich; setzte am Boden und an den Wänden des Glases flockige und blättrige Häutchen ab, ohne indess auch jetzt eine bestimmte Krystallform zu zeigen, aber auch nicht die gallertartige Beschaffenheit, welche das Wachs auszeichnet, wenn sich dasselbe beim Erkalten aus seiner heißen geistigen Lösung niederschlägt.

*Aether* verhielt sich im Wesentlichen wie der Alkohol.

*Wasser*, kaltes, war fast ohne alle Wirkung, als es aber damit der Siedhitze ausgesetzt und dann schnell filtrirt wurde, fand beim Erkalten eine merkliche Trübung statt.

*Terpentinöl* löste diese Materie leicht und schnell.

*Mandelöl* löste sie ebenfalls nach einigem Erhitzen; nachdem letzteres aber kaum einige Minuten gedauert haben mochte, entwickelten sich außerordentlich scharfe, die Lunge heftig reizende Dämpfe, weit stärker als dieses beim Verbrennen dieser Substanz über der Lichtflamme der Fall war.

*Mohnöl* und *Olivenöl* verhielten sich fast eben so wie das Mandelöl. Der scharfe Dampf entwickelte sich

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Substanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phyteumakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platindöfel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Kügelchen zusammenzuzuliefern, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer



| Thermometer. |             |              | Hygrometer. |             |              | W i n d e.   |              |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ma-<br>xim.  | Me-<br>nin. | Me-<br>dium. | Ma-<br>xim. | Me-<br>nin. | Me-<br>dium. | Tag.         | Nacht.       |
| 5,0          | -4,2        | -0,45        | 640         | 478         | 549,0        | WNW 1        | WSW. 1       |
| 1,2          | -2,9        | -0,64        | 554         | 417         | 489,9        | SW. SO. 1    | SO. NO. 2    |
| 3,5          | -0,7        | 1,18         | 652         | 540         | 600,1        | NO. 2        | N. 2         |
| 3,2          | +0,4        | 1,76         | 650         | 577         | 621,9        | NO. 2        | NO. 2        |
| 4,8          | -0,6        | 1,78         | 706         | 588         | 647,8        | N. SO. 1     | SO. N. 2     |
| 4,7          | -0,5        | 2,15         | 707         | 604         | 654,5        | NO. 2        | NO. 2        |
| 4,6          | 0,0         | 2,44         | 758         | 644         | 713,2        | ONO. 2       | ONO. 2       |
| 5,7          | -1,5        | 1,86         | 758         | 637         | 701,6        | NO. 1. 2     | NO. NW. 1. 2 |
| 6,2          | -2,8        | 1,58         | 765         | 607         | 606,2        | WNW. 1       | NW. 1. 2     |
| 7,7          | -2,0        | 2,90         | 750         | 590         | 668,9        | SO. SW. 1    | W. SO. 1     |
| 8,5          | -1,5        | 3,28         | 750         | 500         | 656,8        | O. NW. 1. 2  | WSW. 1. 2    |
| 6,1          | +2,2        | 4,24         | 672         | 540         | 623,2        | SW. NW. 2    | W. 2         |
| 6,2          | +3,2        | 4,40         | 714         | 616         | 661,3        | NW. 2        | WNW. 1       |
| 6,3          | +2,2        | 4,55         | 760         | 645         | 715,4        | NW. 1. 2     | NW. 1        |
| 9,5          | -1,8        | 4,05         | 770         | 590         | 681,5        | SO. NW. 1. 2 | WNW. 1       |
| 11,2         | -0,5        | 5,69         | 786         | 590         | 635,7        | SO. NW. 1. 2 | W. 1. 2      |
| 6,2          | +2,0        | 5,22         | 719         | 658         | 669,0        | SW. NW. 3    | WNW. 4. 5    |
| 2,0          | 0,5         | 1,23         | 725         | 648         | 692,5        | WNW. 4       | WNW. 5. 2    |
| 5,0          | 0,6         | 2,36         | 756         | 655         | 696,5        | SW. SO. 1    | SO. 2        |
| 5,0          | 1,1         | 2,77         | 665         | 531         | 600,5        | SW. 2        | SW. 1        |
| 5,0          | 1,0         | 2,89         | 675         | 554         | 620,4        | SW. 2        | W. 2         |
| 4,5          | 1,2         | 2,57         | 732         | 556         | 648,0        | NW. 2        | W. 1         |
| 6,0          | 0,3         | 2,79         | 745         | 577         | 652,1        | SSW. 1. 2    | W. 1         |
| 7,8          | -1,3        | 3,74         | 745         | 490         | 629,8        | SO. SW. 1. 2 | WSW. 2       |
| 8,2          | +4,6        | 6,58         | 590         | 491         | 556,1        | SW. SO. 1    | SW. NW. 2    |
| 5,7          | 1,6         | 4,37         | 644         | 527         | 597,6        | WNW. 2. 5    | W. 1         |
| 6,8          | 1,2         | 4,54         | 733         | 564         | 666,1        | W. 2. 5      | W. SO. 1     |
| 9,5          | 0,6         | 6,06         | 764         | 605         | 702,9        | SO. SW. 2    | W. 2         |
| 13,8         | 5,4         | 9,95         | 840         | 650         | 768,4        | SO. SW. 1. 2 | W. 3         |
| 10,7         | 5,3         | 8,72         | 810         | 715         | 764,8        | WNW. 5. 4    | W. 2. 1      |
| 10,0         | 6,2         | 8,01         | 726         | 645         | 712,0        | W. 2         | WSW. 1       |
| 13,8         | -4,2        | 3,62         | 840         | 417         | 655,84       | —            | —            |

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechnete, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Substanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas *Phyteumakolla*, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Kügelchen zusammenzufließen, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

# Ueber Pflanzenalkalien.

I. Ueber das

**D e l p h i n i n,**

ein neues Pflanzenalkali.

Vom

**Dr. Rudolph Brandes,**

in Salz-Ufen (Lippe-Detmold).

**D**ie neue Körperklasse der Pflanzenalkalien, welche das Morphinum vielleicht auch das Daphneolin (der besondere von *Vauquelin* in der *Daphne alpina* gefundene Stoff) bilden, wurde kürzlich durch die Herren *Pelletier* und *Caventou* noch durch die Auffindung eines neuen Stoffs in den Krähenaugen und Ignatiusbohnen (*Annales d. Chemie* VIII. 1818. *Repertorium der Pharmazie* V. S. 151) vermehrt, und die Aussicht auf die noch fernere Vermehrung dieser so ausgezeichneten Körper dadurch um so mehr eröffnet. Seit einiger Zeit beschäftigte mich die Untersuchung der Samenkörner von *Delphinium staphisagria*, der sogenann-

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Substanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phyteumakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Kügelchen zusammenzuzuliefern, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

Einwirkung der Hitze wird die ganze Masse flüssig, stößt einen starken, unangenehmen, widrigen, etwas scharfen, und schwach betäubenden Geruch aus, welcher keinesweges dem angenehmen Dunste des brennenden Waxes zu vergleichen war. Als Rückstand hinterließ die verbrannte Substanz eine ansehnliche Kohle.

*Alkohol* war in der Kälte fast ohne alle lösende Wirkung auf diesen Stoff; beim Sieden des Alkohols fand aber vollständige Lösung des letzteren Statt. Die Lösung selbst war ganz farbenlos und durchsichtig; beim Erkalten aber trübte sie sich; setzte am Boden und an den Wänden des Glases flockige und blättrige Häutchen ab, ohne indess auch jetzt eine bestimmte Krystallform zu zeigen, aber auch nicht die gallertartige Beschaffenheit, welche das Wachs auszeichnet, wenn sich dasselbe beim Erkalten aus seiner heißen geistigen Lösung niederschlägt.

*Aether* verhielt sich im Wesentlichen wie der Alkohol.

*Wasser*, kaltes, war fast ohne alle Wirkung, als es aber damit der Siedhitze ausgesetzt und dann schnell filtrirt wurde, fand beim Erkalten eine merkliche Trübung statt.

*Terpentinöl* löste diese Materie leicht und schnell.

*Mandelöl* löste sie ebenfalls nach einigem Erhitzen; nachdem letzteres aber kaum einige Minuten gedauert haben mochte, entwickelten sich außerordentlich scharfe, die Lunge heftig reizende Dämpfe, weit stärker als dieses beim Verbrennen dieser Substanz über der Lichtflamme der Fall war.

*Mohnöl* und *Olivenöl* verhielten sich fast eben so wie das Mandelöl. Der scharfe Dampf entwickelte sich

auch hier, aber wie es schien weit schwächer als beim Mandelöle.

Die Entwicklung dieses scharfen Dampfes, welche vorzüglich nur bei der Siedhitze der fetten Oele zu entstehen schien, da sich weder beim Sieden des Alkohols noch des Aethers und Wassers mit unserem Stoffe dieselbe bemerklich gemacht hatte, versuchte ich näher zu erforschen, um wo möglich Aufschluss darüber zu erhalten, ob diese Eigenschaft von einem besonderen scharfen Principe herrühre, oder eine Eigenthümlichkeit der neuen Substanz sey, oder vielleicht von einer schon beginnenden Zersetzung der letzteren bei der Siedhitze der fetten Oele abzuleiten sey.

Es wurden ohngefähr 6 Gran dieser Substanz in einer kleinen Tubulatretorte mit zwei Drachmen Wasser erhitzt. In die möglichst kaltgehaltene Vorlage ging eine hellbräunlich gelbgefärbte Flüssigkeit über, nach einiger Zeit entwickelten sich dicke Dampf wolken, die Flüssigkeit in der Retorte trübte sich und in der Vorlage verdichtete sich eine dickliche, schwarzbräunliche, äusserst unangenehm, empyreumatisch riechende, ranzig schmeckende, fettige Masse, welche im Alkohol schwer, im Aether leichtlöslich war. Beim Oeffnen des Tubulus stieg aus demselben ein scharfer, Nasen und Lungen heftig reizender, heftigen Husten und mehrere Stunden anhaltenden Kopfschmerz hervorbringender Dampf auf. Das übergegangene Destillat war fast geruch- und geschmacklos, doch war die Vorlage mit unangenehm riechenden nicht sehr scharfen Dünsten erfüllt. Das Wasser schien indessen einen Theil essigsaures Ammoniak zu enthalten. In der Retorte war eine voluminöse Kohle zurückgeblieben.

Da sich hieraus zu ergeben schien, daß das Wasser entweder nicht fähig sey das scharfe Princip dieses Stoffs zu lösen, oder letzteres eine gröfsere Fixität besitze, weil sich, während alles Wasser übergegangen war, dasselbe noch in Dämpfen in der Retorte befand, oder man ferner auch vermuthen konnte, daß dieses scharfe Princip erst während beginnender Zersetzung der besonderen Substanz der Stephanskörner als Produkt hervorgehe, und da nun das Mandelöl oben eine so bedeutende Einwirkung geäußert hatte; so wurden jetzt 8 Gran der Substanz mit zwei Drachmen Mandelöl in einer kleinen Tubulatretorte wie vorhin behandelt. In der Vorlage war eine kleine Menge Wasser vorgeschlagen. Beim Erhitzen entwickelten sich bald Dampfvolken, welche sich im Halse der Retorte verdichteten und als Oeltröpfchen aufs Wasser der Vorlage sanken. Das Destillat besafs den mehrerwähnten scharfen Geruch. Das übergegangene Oel war äusserst unangenehm ranzig, widerlichschmeckend, besafs ebenfalls den scharfen und stechenden Geruch und hatte diesen auch dem vorgeschlagenen Wasser mitgetheilt. Der Luft in einem offenen Schälchen ausgesetzt, verlor sowohl das Wasser als auch das Oel seine Schärfe.

Es scheint aus diesen Versuchen hervorzugehen, daß die Entwicklung des scharfen Principis vorzüglich bei einem gewissen Punkte der Zersetzung unserer Substanz gebildet werde, da sich bei der Destillation mit Wasser dasselbe erst gegen Ende bei eintretender Zerstörung der Substanz entwickelte, und daß vorzüglich jener Punkt, bei welchem dieses scharfe Princip gebildet (?) wird und entweicht, durch jenen des Siedepunkts der fetten Oele mehr fixirt wird, und

vielleicht gerade mit diesem zusammenfällt. Alle andern Substanzen, welche ich ferner noch in den Stephanskörnern fand, hatten nicht diese dem hier behandelten Stoff so eigenthümliche Eigenschaft, jenen scharfen Stoff unter gewissen Bedingungen zu entwickeln. Als ich die Stephanskörner mit Wasser der Destillation unterwarf, so ging eine trübe Flüssigkeit über, welche indessen nur in geringem Grade den scharfen Geruch besaß, nach einiger Zeit sonderten sich daraus einige weißliche Flocken ab. In Essigsäure getauchtes Lackmuspapier wurde durch das Destillat wieder blau gefärbt. Auch ein Streifen geröthetes Lackmuspapier, welches ich mit in dem Tubulus der Retorte befestigte, war nach kurzer Zeit wieder blau geworden.

So sehr wie ich auch anfangs geneigt war, diese Substanz für eine wachsartige anzusehen, wohin manche ihrer Eigenschaften zu deuten schienen; so schienen doch wiederum andere Merkmale gegen eine solche Annahme zu sprechen. Vorzüglich waren es die folgenden ganz ausgezeichneten Verhältnisse, welche sie gegen die Säuren beobachtet.

Die geistige Auflösung dieser Substanz färbte geröthetes Lakmuspapier sogleich und, wie ich mir erinnere, weit schneller als das Morphium, wieder blau.

Zu 2 Gran dieser Materie wurden zwei Drachmen destillirtes Wasser und zwei Tropfen *Salzsäure* hinzugesetzt, und die anfangs das Lakmuspapier röthende Flüssigkeit ließ dasselbe, nach Auflösung des Stoffs unverändert. Es schien sich bei dieser Auflösung noch eine geringe Spur von Oel abzusondern, filtrirt und bei mäßiger Wärme gedunstet, hinterließ



sie eine dichte, nicht krystallisirte, scharf brennend schmeckende, an der Luft Feuchtigkeit anziehende Salzmasse, welche in Wasser aufgelöst durch salpetersaures Silber, durch ätzendes Kali, Ammoniak und kohlenstoffsäures Kali eine Trübung erlitt.

*Salpetersäure* zeigte ganz dasselbe Verhalten, wenn sie in sehr verdünntem Zustande mit diesem Stoffe behandelt wurde. Das dadurch entstehende Salz zog ebenfalls die Feuchtigkeit leicht an, schien nicht leicht krystallisirbar zu seyn, obgleich hin und wieder sich kleine prismatische Anhäufungen zeigten und besaß denselben brennenden Geschmack wie die salzsaure Verbindung. Auch aus der Lösung dieser das Lackmuspapier nicht mehr verändernden Lösung schieden Aetzkali, Aetzammoniak und kohlenstoffsäures Kali weißliche Flocken.

*Schwefelsäure* wurde durch diese Substanz ebenfalls neutralisirt. Das dadurch erhaltene Salz schien der Krystallisation fähig zu seyn, wenigstens konnte man in der beim Abrauchen und Verdunsten der Lösung hinterbliebenen Salzrinde durch eine Loupe prismatische Krystalle bemerken, obwohl sie, wegen der geringen Menge der Substanz, sehr unvollständig erschienen. Auch blieb dieses schwefelsaure Salz an der Luft trocken, besaß aber ebenfalls einen brennenden Geschmack. Die Lösung desselben veränderte das Lakmuspapier nicht, erlitt aber durch Kali, Ammoniak, kohlenstoffsäures Kali und salzsauren Baryt geringe Trübungen.

*Essigsäure* verhielt sich fast wie Salpeter- und Salzsäure.

*Neutrales sauerkleeäures Kali* brachte in der Lösung des essigsauren Salzes einen reichlichen Nieder-

schlag hervor, woraus man wohl folgern kann, daß diese alkalische Pflanzensubstanz mit der Sauerkeelsäure ein in Wasser schwerlösliches Salz bilde.

Es geht aus diesen Versuchen die Eigenthümlichkeit dieser alkalisch und basisch reagirenden Substanz welche in so manchen Eigenschaften dem Wachse sich anschließt, aufs deutlichste hervor, und es scheint daher der Sache am angemessensten diesen neuen Pflanzenstoff jenen oben erwähnten Pflanzenalkalien zuzugesellen, und diesen Stoff selbst mit dem Namen *Delphinin* zu bezeichnen, weil derselbe in einer Art der Pflanzengattung „*Delphinium*“ sich zuerst gezeigt hatte. Ich habe alle diese Versuche mit *Delphinin* wiederholt, welches aus der essigsauren Auflösung durch Ammoniak gefällt worden war, und möglichst ausgewaschen im siedenden Alkohol gelöst, nach Ausscheidung aus der geistigen Lösung durch Erkalten derselben gewonnen wurde, und stets dieselben Resultate erhalten, wie ich den so dargestellten Stoff den obigen wiederholten Versuchen unterwarf, und muß demnach mit Ueberzeugung schliessen, daß alle die obigen ausgezeichneten Eigenschaften diesem Pflanzensstoffe eigenthümlich sind. Man erhält ebenfalls denselben, wenn man die wässrige Auskochung der Stephanskörner durch Ammoniak übersättigt und den erhaltenen Niederschlag mit Alkohol auskocht, diese Auskochung siedend filtrirt und dann erkalten läßt, worauf sich derselbe in weißlichen Flocken ausscheidet. In welchem Zustande sich das *Delphinin* in dem Stephansamen befindet, ist mir noch nicht ganz klar; doch glaube ich, daß es größtentheils ausser Verbindung mit Säuren darin existirte; denn die geistige Auskochung der Samen macht das geröthete Lackmus-

papier bald wieder blau; auch verhielt sich die wässrige Auskochung der Samen mehreremale eben so. Zum Theil scheint indessen das Delphinin auch an Säure gebunden zu seyn, wofür die Delphinin enthaltenden Niederschläge sprechen, welche Ammoniak in den wässrigen Auskochungen hervorbringt. Die geringe Menge, in welcher sich das Delphinin in den Stephanskörnern befindet, hat mir noch nicht erlaubt, eine ausgedehntere Reihe von Versuchen über diesen Gegenstand anzustellen; auch erlauben gehäufte Geschäfte fürs erste nicht, hierzu in kurzer Zeit schon im Stande zu seyn, daher ich hierdurch fürs erste nur auf diese Substanz aufmerksam machen, und sie den entscheidenden Prüfungen der Chemiker empfehlen wollte. Die Art der Darstellung und Reinigung dieser Substanz lassen, wie ich glaube, nicht zu, auf ein mit derselben innig verbundenes bekanntes Alkali zu schließen, von welchem die alkalischen Reactionen abzuleiten wären. Höchstwahrscheinlich sind die qualitativen Bestandtheile dieses Pflanzenalkali's dieselben des Morphiums und Strychnins, von welchen es sich jedoch sogleich schon durch den bemerkten scharfen Dampf, welchen es in der Siedhitze der Oele vorzüglich reichlich ausgiebt, durch den Mangel an Krystallisationsfähigkeit, und durch sein ganz anderes Verhalten gegen Säuren hinreichend unterscheidet. Nicht weniger ausgezeichnet ist der brennende und scharfe Geschmack der Salze, welche das Delphinin bildet, da es im ungebundenen Zustande sich fast ganz indifferent gegen die Geschmacksorgane verhält, welches mir ein Beweis mit zu seyn scheint, daß das mehrbemerkte scharfe Princip, welches das Delphinin unter gewissen Umständen entwickelt, eine Eigenschaft dieses Körpers

sey, welche nicht von einem besonderen damit verbundenen scharfen Stoffe herrührt. Wollte man in-  
 defß ausserdem in dem Stephanssaamen ein besonde-  
 res scharfes Princip annehmen; so möchte ich hierin  
*Pfaffs* Meinung über die Pflanzenstoffe mit flüchtigem  
 scharfem Principe beistimmen, daß, wo auch diese fei-  
 nere flüchtigere Schärfe sich zeigt, derselben auch  
 wohl in den meisten Fällen ein mehr materielles Sub-  
 strat parallel laufe, welches jene scharfen Eigenschaf-  
 ten theilt.

Merkwürdig ist es noch, daß die Auffindung  
 dieser neuen alkalischen Pflanzenstoffe, welche sich  
 zu den wirklichen Alkalien, wie die Metalloide zu  
 den Metallen und wie die organischen Säuren zu den  
 einfachen Säuren verhalten möchten, bis jetzt nur in  
 solchen Pflanzentheilen Statt fand, denen man eine  
 giftige Einwirkung auf den Organismus nicht abspre-  
 chen kann, und daß diese Stoffe selbst mit dem nar-  
 kotischen Princip in naher Beziehung zu stehen schei-  
 nen, wenn auch das Morphin selbst eben nicht giftig  
 zu wirken scheint. Vielleicht reiht sich bei nä-  
 herer Untersuchung auch das die Pupille erweiternde  
 Princip des Bilsenkrauts, welches Herr Dr. *Runze* iso-  
 lirt dargestellt hat, wenn es nicht vielleicht auch die  
 entgegengesetzten Eigenschaften eines mehr als Säure  
 reagirenden Körpers besitzen sollte, an diese Pflanzen-  
 alkalien an. (*Himly's* Bibliothek für Ophtalmologie u.  
 s. w. 1 B. 2 St. S. 416.) Von dem besonderen Stoffe  
 der Krähenaugen, Ignatiushohnen, der falschen Augu-  
 stura ist dieses Princip nach *Himly* (a. a. O.) ganz  
 verschieden.

## II. Ueber ein neues Pflanzenalkali

*(Alkaloid).*

V o m

Dr. W. M e i f s n e r.

Die Reihe leicht zersetzbarer Pflanzenalkalien, zu welcher das Morphinum uns den Weg gebahnt hat, scheint sich mit jedem behutsamen Schritt der Pflanzenanalyse zu vermehren, wie dieß noch neuerlich die Auffindung des Strychnin in der faba St. Ignatii und nux vomica durch Pelletier und Caventou bestätigt. Zu den schon bekannten kann ich nun noch ein neues hinzufügen, welches ich zu Anfang dieses Jahres in dem Sabadillsamen fand, und nicht ohne Schwierigkeiten für einen eigenthümlichen alkalischen Pflanzenkörper erkannte.

Man erhält ihn, indem man den Saamen mit mäßig starken Alkohol ausziehet, diesen bei gelinder Wärme verdampft, oder aus einer Retorte überdestillirt, den harzigen Rückstand mit Wasser behandelt, die braune Auflösung filtrirt, und solange mit kohlenstoffsäuerlichem Kali versetzt, als noch die geringste Trübung entsteht, den Niedersehlag so oft mit Wasser auswäscht, bis dieses ungefärbt abläuft, und in gelinder Wärme trocknet.

Der auf diese Art erhaltene Stoff besitzt eine etwas schmutzig weiße Farbe; keinen bemerklichen Geruch, einen sehr brennenden Geschmack, wobei man noch eine sehr unangenehm kratzende Empfindung im Schlunde bemerkt, die auch entsteht, wenn man kaum

½ Gran auf die Spitze der Zunge legt, und dabei verhütet, daß etwas davon in den Schlund hinabgleitet; sein Zusammenhang ist locker und pulverig, ohne ein krystallinisches Gefüge zu verrathen, wie es mir überhaupt bis jetzt noch nicht gelungen ist, ihn aus seiner Auflösung krystallinisch darzustellen, woran jedoch auch wohl die geringe Menge, mit der ich arbeiten konnte, Schuld seyn kann. Ueber der Alkoholflamme schmilzt er schon bei mäßiger Wärme, bläht sich dabei auf, verbreitet einen eigenthümlichen brenzlichen nicht bemerklich ammoniakalischen Geruch und hinterläßt eine voluminöse Kohle, nach deren Verbrennung eine geringe weiße, das Kurkumapapier nicht bräunende Asche zurückbleibt. An der Luft erleidet er keine Veränderung; geröthetes Lakmuspapier erhält seine blaue Farbe sogleich wieder, wenn man eine durch Wasser angefeuchtete Stelle mit ihm bestreut.

Absoluter Schwefeläther löste ihn nicht merklich auf, dagegen Alkohol sehr leicht; rectificirtes Terpentinöl griff ihn in gewöhnlicher Temperatur nicht an, durch Wärme unterstützt löste es denselben auf, Wasser löste ihn nur schwer und in geringer Menge auf; Schwefel- Salz- Salpeter- und Essigsäure bildeten mit ihm neutrale leicht auflösliche Verbindungen, deren Form ich noch nicht näher beobachten konnte jedoch bemerkte ich, daß seine Sättigungscapacität nur gering war.

Soweit erlaubte mir die geringe Menge des Stoffes seine Eigenschaften zu prüfen, aus denen jedoch seine wahre Natur schon deutlich genug hervorgeht. Er ist in der Oberhaut der länglichten schwarzbraunen Samen des *Veratrum Sabadilla* enthalten, und

zwar ohngefähr zu 1 — 2 Procent; die wässerige Auflösung, aus welcher er durch kohlenstoffsäuerliche wie Aetzalkalien gefällt werden kann, enthält ihn als ein saures Salz, dessen Säure, nach einigen Versuchen zu schliessen, sehr nahe mit der Ampfelsäure übereinkommt.

Auf den thierischen Körper äussert er eine heftige Wirkung, denn schon  $\frac{1}{4}$  Gran bewirkt auf der Zunge ein mehrstündiges anhaltendes Brennen, welches sich bis in den Schlund verbreitet; etwas in die Nase gebracht, erregt ein starkes Niesen, wobei der häufig abgesonderte Nasenschleim wie Wasser herausfließt. Hiernach würde er wohl das eigentliche wirksame Princip der Sabadillsamen seyn, obgleich das sehr oft mit Wasser und Schwefelsäure ausgezogene Hartharz immer noch Brennen auf der Zunge erregte.

Wäre es erlaubt diesem Stoff einen eigenen Namen zu geben, so würde ich vor der Hand Sabadillin vorschlagen; sollte er jedoch auch in anderen Arten von der Gattung Veratrum aufgefunden werden, so würde es wohl besser seyn ihn Veratrin zu nennen. Ueberhaupt scheint es mir auch angemessen, die bis jetzt bekannten alkalischen Pflanzenstoffe nicht mit dem Namen Alkalien, sondern Alkaloide zu belegen, da sie doch in manchen Eigenschaften von den Alkalien sehr abweichen; sie würden daher in dem Abschnitt der Pflanzenchemie vor den Pflanzensäuren ihre Stelle finden.

III. Ueber das  
**Morphium und die Mekonsäure**

von

**F. C. Geyer,**

Provisor einer Apotheke in Bremen \*).

Die folgenden Bemerkungen, obengenannte Entdeckungen des Hrn. Dr. *Sertürner* betreffend, mögen nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Chemiker

\*) Der Abdruck dieser Abhandlung hat sich theils wegen des schon im vorigen Hefte S. 365 angeführten Grundes, theils auch dadurch verspätet, daß einige Pharmaceuten in der hiesigen physikalischen Gesellschaft von Studierenden, welche sich schon früher zu andern Zwecken mit der Darstellung des Morphiums beschäftigten, den Plan hatten, die sehr zahlreichen Versuche des Herrn *Geyer* zu wiederholen. Diese Wiederholung fiel jedoch schon bei den ersten Versuchen, wo es auf Darstellung eines nicht alkalisch reagirenden Morphiums (eine ganz kleine Probe davon hatte Herr *Geyer* die Güte mir zu



neuem auf diesen Gegenstand zu leiten; da diese  
per, die schon interessant durch die Annahme wür-  
, dafs sie die einzig wirksamen Bestandtheile eines

---

übersenden) ankam, nicht befriedigend aus und schon die  
Art und Weise, wie Herr *Ceyer* seine so zahlreichen  
Versuche erzählt, erschwerte das Aufinden dessen, was  
als vorzüglich entscheidend gelten soll. Es ist mit Recht  
nun fast von allen Chemikern und Physikern die Darstel-  
lungsart, welche in Tagebüchern gewöhnlich und zweck-  
mäfsig ist, bei öffentlicher Bekanntmachung der Versuche  
aufgegeben worden, und ich bitte bei dieser Gelegenheit  
alle Herrn Mitarbeiter an dieser Zeitschrift dringend, sich  
derselben nie ohne besonders überwiegenden Grund, der  
in einzelnen Fällen wohl eintreten kann, zu bedienen.  
Wer hat gegenwärtig noch Zeit, alle Versuche eines Che-  
mikers, unentscheidende so gut als entscheidende, durch-  
zulesen? Das Hauptresultat mehrmals wiederholter Ver-  
suche, mit Angabe aller zum Gelingen derselben erforder-  
lichen Vorsichtsmaasregeln, diefs ist es allein, worauf es  
ankommt. Und diese Art der Darstellung, bei welcher  
freilich wochenlange Arbeiten nicht selten mit wenigen  
Zeilen abzufertigen, ist es, welche von den bedeutend-  
sten Naturforschern nun allgemein befolgt wird, und im  
Grunde von diesen stets befolgt wurde.

Ich nehme keinen Anstand Herrn *Ceyer* öffentlich um  
Entschuldigung zu bitten, dafs die Mittheilung seiner Ab-  
handlung, welche schon gegen Ende Mays 1818 einge-  
sandt wurde, sich so lang verspätete. Ausser den eben  
angegebenen Gründen, war daran auch Ursache, dafs ich  
bald darauf, als diese Abhandlung eintraf, eine kleine  
Reise zu machen hatte und Herr Professor *Bischof* (nun  
zu Bonn), welcher während seines Aufenthaltes in Er-  
langen das Redactionsgeschäft ein Jahr lang mit mir theil-  
te, eben mit seiner Arbeit über vegetabilische Chemie be-

der wichtigsten und ältesten bis dahin immer nicht genau genug gekannten Heilmittels wären, interessanter noch durch die Hypothese des Hrn. Dr. *Sertürner* wurden, daß das Morphinum ein neues, und als eine sehr zusammengesetzte Verbindung sich besonders auszeichnendes Alkali sey. Zwar pflichten ihm darin die folgenden Bearbeiter des Morphinum bei, und es soll dasselbe schon dazu dienen \*), den von *Berzelius* für die metallische Natur der Grundlage des Ammoniums

beschäftigt, die Redaction dieser seinen damaligen Studien verwandten Abhandlung zu übernehmen versprach.

Mich selbst zogen angehäufte Arbeiten lange Zeit von dem Studium der weitläufigen Arbeit des Herrn *Geyer* ab; und ich gestehe es, daß seine Versuche selbst wenn sie alle unbedingt zugegeben werden (wie ich denn an deren Genauigkeit gar nicht zweifle), mir nicht volle Ueberzeugung gewährten. Dagegen schienen mir aber die Ansichten selbst, von denen Herr *Geyer* ausgeht, schätzensinnig und in jeder Hinsicht beachtungswerth. Eben daher glaube ich wird die Darlegung dieser Ansichten und dessen, was derselbe als Hauptresultat seiner Versuche betrachtet, den Lesern willkommen seyn, und sie werden es dann mit desto größerem Dank aufnehmen, wenn es dem Hrn. Verf. gefällt, die Redaction seiner zahlreichen Versuche in der Art zu übernehmen, daß, was entscheidend ihm ist für seine Ansichten, einzig und allein hervorgehoben und daß zugleich, (was ihm wohl nun zweckmäßig scheinen möchte) die Untersuchung ausgehnet wird auf die neuerdings dem Morphinum beigefügten vegetabilischen Alkalien,

d. H.

\*) *Thomson's Annals of Philosoph.* Aug. 1817.

aufgestellten Hauptgrund zu entkräften; dennoch wage ich es folgendes dagegen zu erinnern.

Ehe ein neu entdeckter noch nicht hinreichend gekannter Stoff, die bis dahin bestehende Vorstellung über die Natur der Alkalien als Metalloxyde zu verändern, oder gar die Einfachheit der metallischen Stoffe im Allgemeinen zweifelhaft zu machen, Veranlassung geben sollte, würde es doch höchst nöthig seyn, daß man sich davon überzeuge, ob der neue Stoff diese alkalische Reaction nicht einem integrirenden Theile seiner Mischung verdanke, der ausser dieser Verbindung hinreichend als Alkali bekannt ist; und dies um so mehr, da Wasserstoff und Stickstoff von Anfang unter den Elementen dieses Stoffs aufgeführt wurden. Eine solche diese Sache aufklärende Analyse des Morphiums, wie der Mekonsäure, ist bis jetzt nicht erschienen und bis diese erscheint, dürfte jede andre aus Analogien hergeleitete Definition der Natur des Morphiums nicht unhaltbarer seyn, als die von Herrn Dr. Sertürner aufgestellte Hypothese. Indess fühle ich ganz, wie sehr viel Gewicht letztere durch die theils stillschweigende, theils öffentliche Billigung großer Chemiker erhalten hat; nur die Resultate, die ich in den folgenden Versuchen erhielt, die ich der Prüfung der Chemiker hiemit übergebe, stimmten so wenig zu ihr, daß ich nicht länger diese Arbeit zurückhalten, nicht länger auf die Untersuchung eines Geübteren wie ich, zu harren mich entschließen konnte. Möge bei dem allen Hr. Dr. Sertürner von der vollkommensten Achtung überzeugt seyn, die ich für ihn hege; sollten auch, wie ich nicht zweifle, die von ihm benannten Körper sich bei der nähern Prüfung, nicht der von ihm aufgestellten Hypothese gemäß befinden,

so bleibt ihm immer das Verdienst, ein neues Gebiet der Chemie, die nähere Kenntniß der, narkotische Eigenschaften zeigenden, Pflanzenstoffe, aufgeschlossen zu haben.

Würde das Morphinum ein für sich bestehendes aus elementarischen Stoffen zusammengesetztes Alkali seyn, so dürfte es die alkalische Reaction auf gelbe Pflanzenpigmente, durch die Behandlung mit den am indifferentesten sich verhaltenden Körpern, als Wasser und Weingeist, nicht verlieren. Dieses ist gleichwohl der Fall. Läßt man das ziemlich reine noch nicht krystallinische Morphinum in einem oben offenen Gefäß, in Stubenwärme längere Zeit mit wässrigem Weingeist übergossen, stehen, so erhält man durch nachherige Lösung im kochenden Alkohol und Krystallisation ein in völlig weißen, seidenglänzenden, sechsseitigen Prismen, mit auf beiden Enden gerader Abstumpfung und gestreiften Seitenflächen krystallisirendes Salz, welches ziemlich schwer im kalten, aber leicht löslich im heißen Alkohol ist, und dessen concentrirte Lösung auf Rhabarberpapier durchaus nicht reagirt \*). Auch dadurch, daß ich etwas Morphinum

---

\*) Es drängen sich bei diesem und dem folgenden Versuch Einwendungen auf, worüber mir Herr Geyer am 3. Jun. 1819. folgendes schrieb:

„Was die Darstellung des nicht alkalischen Morphinum anbetrifft, so muß ich gestehen, daß der dabei angeführte Hauptversuch, zufällig nur von mir beobachtet wurde. Ich hatte nämlich etwas Morphinum mit wässrigem Alkohol in einem 12 Unzen Glase *unverschlossen* mehrere Monate stehen. Nur nach und nach entwickelten sich bei mir die Gründe, weshalb das Morphinum, nicht dem Kali

t dem vierten Theil Weinsteinsäure und einigen Un-  
n Wasser zusammen mehrere Tage in einem oben

und Natron, wie es damals geschah, zu zuzählen sey. Ich fand um diese Zeit, daß etwas Morphium durch Behandlung mit weniger Weinsteinsäure und, nach Verhältniß, vielem Wasser, seine Alkalinität verlor, ohne bei dem Umkrystallisiren seine Krystallgestalt verloren zu haben und ohne daß sich Weinsteinsäure darin auf finden liefs. Als ich jetzt jenes mehrere Monate mit Alkohol gestandene Morphium umkrystallisiren liefs, zeigte auch dieses dieselbe Krystallgestalt, dasselbe äussere Ansehen, aber, nach dem Lösen im Alkohol, keine alkalische Reaction, und ich glaubte nun meiner Sache gewifs zu seyn, ohne daß ich nöthig hätte, den letzten Versuch, die Veränderung des alkalischen in das basische Morphium durch wässerigen Alkohol, wozu es mir ohnehin an Zeit fehlte, zu wiederholen. Allerdings habe ich übrigens bei diesem Versuch keineswegs Kohlensäure abgehalten, wenn diese nicht etwa schon durch den überstehenden Alkohol abgehalten wurde. Auch glaube ich nicht, daß dieses von Einflufs seyn könnte, da, wie sehr auch *Brandes* dasselbe behaupten mag, das Morphium mir gar keine Verwandtschaft zur Kohlensäure zeigte, und ohnehin in beiden obigen Versuchen das Morphium *ungelöst* blieb, und da im Fall resorbirte Kohlensäure das Verschwinden der Alkalinität verursacht hätte, deren, durch Uebergießen des basischen Morphiums mit Säuren, zu erforschende Menge im Verhältniß zu der verschwundenen Alkalinität stehen müfste, auch durch Fällen eines basischen, in Säuren gelösten Morphiums durch Aetzalkalien, dieses wieder in den alkalischen Zustand versetzt seyn müfste.

Und was ist *Serführners* zweites Morphiumoxyd, das hier erst nach Einsendung meiner Abhandlung bekannt wurde (*i. Gilbert's Annalen der Physik Bd, 29, S. 61*), anders als basisches Morphium? “

*Coyer.*

offenen Gefäß digerirte, erhielt ich nach endlicher Abscheidung durch *genau zur Neutralisation der Säure hinreichendes* Ammoniak, und nachherige durch Lösung in Alkohol bewirkte Krystallisation, ein ähnliches, völlig weißes, nicht alkalisch reagirendes Salz. Dafs aber die Reaction auf gelbe Pflanzenpigmente keinem der übrigen Alkalien fehlt, dürfte doch gewifs seyn; so wie auf der andern Seite die Eigenschaft des Morphiums sich mit den Säuren zu salzähnlichen Körpern zu verbinden, allein nicht hinreicht, es zu den Alkalien zu zählen; wäre ja doch sonst das von *Wollaston* entdeckte Blasenoxyd (cystic oxyd), das sich sowohl mit Säuren als mit Alkalien zu krystallisirenden salzähnlichen Körpern verbindet in dem einem Fall ein Alkali, in dem andern eine Säure; ein Fall, der bekanntlich bei den Metalloxyden öfters vorkommt.

Einen zweiten Grund gegen die Annahme, das Morphinum sey ein alkalischer Stoff, möchte dessen Auflöslichkeit unter Anwendung der Wärme in ätherischen Oelen abgeben, die schon *Desrosne* \*) bemerkte, und die sich mir bestätigte; in der Kälte scheidet es sich mit einem Theil Oel verbunden aus dieser Lösung ab, und krystallisirt nach einiger Zeit aus der letzten flüssigen Verbindung, in gewöhnlicher Form, wie aus der Lösung in Alkohol oder Naphtha,

---

\*) Schon *Fossa* schied 1798 denselben salzartigen Stoff in Verbindung mit vegetabilisch - thierischem Stoff aus dem Opium ab (Berliner Jahrbuch für die Pharmazie 1803, p. 190) und *Desrosne* stellte ausser den nach ihm benannten Salz, welches ich noch nicht kenne, auch das Morphinum dar, wie aus seinen Versuchen erhellt (*Tremsdorffs Journal der Pharm.* 12ter B. 1tes Heft). G.

und macht, während der völligen Vereinigung mit dem Oele, dieses nicht zur Seife.

Drittens möchte gegen diese Hypothese eingewandt werden können, daß das Morphiu sich nicht wie alle Alkalien mit der Kohlensäure verbindet. Als ich fast neutrales schwefelsaures Morphiu durch neutrales kohlenensaures Kali zersetzte und den Niederschlag einige Zeit mit einer Lösung des letztgenannten Salzes kalt digeriren liefs, war bei nachherigem Lösen dieses Morphiumniederschlag in Säuren keine Spur von Aufbrausen, oder auch nur Entweichen von einzelnen Gasblasen, zu bemerken.

Viertens ist die Alkalinität des Morphiums nicht mächtig genug, um, wie doch alle Alkalien thun, die rothe Farbe des Lackmus zu bläuen; wird in eine auf Veilchensyrup und bei schnellem Eintauchen auf Lackmuspapier nicht reagirende, essigsäure Morphiumlösung, etwas Lackmuspapier gelegt, so entzieht ein Theil der an das Morphiu gebundenen Säure dem Lackmus den ihn bläuenden Kalk, und Papier und Flüssigkeit werden roth; diese Röthung dauert selbst nach dem anhaltendsten Schütteln der Lösung im kalten wie im heißen Zustande mit überschüssigem Morphiu fort.

Fünftens kann man, wenn man die so sehr verschiedenen Angaben über die Sättigungscapacität desselben unter einander vergleicht, schon vor dem Versuch sich des Gedanken nicht erwehren, daß das Morphiu von verschiedener alkalischer Mächtigkeit vorkomme, besonders da es so leicht ist, neutrale Verbindungen der Alkalien mit den Säuren darzustellen. Nach Hrn. *Robiquet* sättigen 2,5 Grammen Morphiu 0,45 Grammen einer Schwefelsäure von 66° Beaumé

offenen Gefäß digerirte, erhielt ich  
 Abscheidung durch genau zur  
 Säure hinreichendes Ammoniak, und  
 Lösung in Alkohol bewirkte Krystalli-  
 sches, völlig weißes, nicht allzu  
 Dafs aber die Reaction auf  
 keinem der übrigen Alkalien  
 seyn; so wie auf der  
 des Morphioms sich mit  
 Körpern zu verbinden  
 den Alkalien zu zählen  
 Wollaston entdeckte  
 sich sowohl mit  
 sirenden salzähnlichen  
 Fall ein Alkali  
 der bekanntlich  
 Einen  
 Morphin  
 Auflösl  
 schen  
 te,  
 es  
 I  
 stehenden  
 mit zwei

Dr. Sertürner angegebenen  
 ziehen des Opiumpulvers mit de-  
 Abscheiden des unreinen Morphioms  
 und Reinigung desselben durch ab-  
 Aetzammoniak und Naph-  
 zuletzt durch Krystallisation desselben aus  
 alkoholischen Lösung, stellte ich mir eine  
 Menge Morphin dar, das ich in schwach wein-  
 gelblichen Krystallen erhielt. Die Gestalt dersel-  
 was durchgehends das sechsseitige Prisma, mit  
 gegenüber stehenden breiten und vier gegenüber  
 stehenden schmalen Seitenflächen, an beiden Enden  
 mit zwei auf die breiten Seitenflächen aufsitzenden Zu-  
 schärfungsflächen. Besonders an beiden Enden bra-  
 chen sie das Licht sehr stark, oft mit Regenbogenfar-

\*) Bei diesen wie bei folgenden Bestimmungen des Sättigungs-  
 vermögen wurde des Herrn Bergraths *Dübereiner* Aequi-  
 valentscale zum Grunde gelegt, nach welcher das Hy-  
 drogen als Einheit angenommen wird.



derselben bräunte das Rhabarber-

llung des Hrn. *Robiquet* ange-

ls habe das durch Magnesia

lbst mehr Alkalinität ge-

ausgeschiedene, so

auf folgende Weise

zen Opium, drei Unzen con-

(von 1,030 spec. Gew.) und vier

zusammen kalt abgeriebene und klar

ng wurde, nachdem der Rückstand mit

zen derselben Essigsäure und 2 Pfund Was-

delt, später auch mit hinreichendem Wasser

t worden war, bis zum Neutralisationspunkt

orstechenden Säure mit kohlenaurer Bitter-

setzt, wozu von letzterer  $7\frac{1}{2}$  Drachme verwandt

Der dadurch ausgeschiedene zum Theil

rtige Niederschlag wurde mehreremale mit

em Weingeist ausgezogen, bis dieser nur we-

urch gefärbt wurde. Das jetzt noch Rückstän-

rde durch Behandeln mit siedendem Alkohol

Auflöslichen befreit, und diese Lösung durch

zur Krystallisation befördert. Ich erhielt hier-

ur 30 Gran Morphinum. Nach diesem Behan-

siedendem Alkohol blieb ein grauer, erdiger

er 90 Gran wog. Einige Gran dieses Rück-

mit destillirtem Essig übergossen, lösten sich

gsam und ohne alles Aufbrausen; mit concen-

chwefelsäure erhitzt, entwich schweflige Säur-

es wurde ein kohlenartiger Körper ausgeschie-

de Lösungen sowohl die mit Essig als die mit

lsäure bereitete, gaben nach dem Filtriren die

(= 0,543 saurer Masse); die Verbindungszahl des Morphiums würde hiernach 274 seyn \*).

Nach Hrn. Hofrath *Vogel* sättigen 60 krystallisirte Weinsteinsäure 100 Morphiums, wornach die Verbindungszahl des Morphiums 120 seyn würde.

Die Angaben des Hrn. *Choulant* stimmen selbst unter einander nicht, und möchten deshalb wohl nicht mit der nöthigen Genauigkeit angestellt worden seyn; da der stöchiometrische Werth des Morphiums nach dessen Analyse des schwefelsauren Morphiums 68,13; nach der des weinsteinsauren 54,4 und nach der des salzsauren Morphinum 38,1 seyn würde.

Nach einer vom Hrn. Dr. *Sertürner* angegebenen Methode, durch Ausziehen des Opiumpulvers mit destillirtem Essig, Abscheiden des unreinen Morphiums durch Ammoniak und Reinigung desselben durch abwechselndes Behandeln mit Aetzammoniak und Naphtha, sowie zuletzt durch Krystallisation desselben aus der heißen alkoholischen Lösung, stellte ich mir eine kleine Menge Morphinum dar, das ich in schwach weingelbgefärbten Krystallen erhielt. Die Gestalt derselben war durchgehends das sechsseitige Prisma, mit zwei gegenüber stehenden breiten und vier gegenüber stehenden schmalen Seitenflächen, an beiden Enden mit zwei auf die breiten Seitenflächen aufsitzenden Zuschärfungsflächen. Besonders an beiden Enden brachen sie das Licht sehr stark, oft mit Regenbogenfar-

---

\*) Bei diesen wie bei folgenden Bestimmungen des Sättigungsvermögen wurde des Herrn Bergraths *Dübereiner* Äquivalentenscale zum Grunde gelegt, nach welcher das Hydrogen als Einheit angenommen wird,

ben. Die Lösung derselben bräunte das Rhabarberpapier ziemlich stark.

Da in der Abhandlung des Hrn. *Robiquet* angeführt wird, es schiene als habe das durch Magnesia abgeschiedene Morphinum selbst mehr Alkalinität gezeigt, als das durch Ammouiak ausgeschiedene, so stellte ich auch etwas Morphinum auf folgende Weise dar.

Eine, aus acht Unzen Opium, drei Unzen concentrirte Essigsäure (von 1,030 spec. Gew.) und vier Pfund Wasser zusammen kalt abgeriebene und klar filtrirte Lösung wurde, nachdem der Rückstand mit noch 2 Unzen derselben Essigsäure und 2 Pfund Wasser behandelt, später auch mit hinreichendem Wasser ausgesüßt worden war, bis zum Neutralisationspunkt der hervorstechenden Säure mit kohlensaurer Bittererde versetzt, wozu von letzterer  $7\frac{1}{2}$  Drachme verwandt wurden. Der dadurch ausgeschiedene zum Theil schaumartige Niederschlag wurde mehreremale mit wässerigem Weingeist ausgezogen, bis dieser nur wenig dadurch gefärbt wurde. Das jetzt noch Rückständige wurde durch Behandeln mit siedendem Alkohol von dem Auflöslichen befreit, und diese Lösung durch Erkalten zur Krystallisation befördert. Ich erhielt hierdurch nur 30 Gran Morphinum. Nach diesem Behandeln mit siedendem Alkohol blieb ein grauer, erdiger Satz, der 90 Gran wog. Einige Gran dieses Rückstandes mit destillirtem Essig übergossen, lösten sich nur langsam und ohne alles Aufbrausen; mit concentrirter Schwefelsäure erhitzt, entwich schweflige Säure und es wurde ein kohlenartiger Körper ausgeschieden; beide Lösungen sowohl die mit Essig als die mit Schwefelsäure bereitete, gaben nach dem Filtriren die

gesättigte schön kirschrothe Farbe der Mekonsäure mit Eisenoxyd. Mit Aetzkalk und etwas Wasser zusammen gerieben gab dieser Rückstand bei dem Nähera von Salzsäure stark weisse Nebel. Die weitere Untersuchung desselben im Verfolge.

Das nach dem Abscheiden dieses Morpium haltigen Satzes in der Lösung noch zurückseyende Morpium wurde dann besonders durch Aetzammoniak geschieden, wodurch ich noch 25 Gran gut krystallisiertes Morpium erhielt. Unter dem durch Bittererde und dem durch Ammoniak ausgeschiedenen Morpium fand dem Aeussern nach nur die Verschiedenheit Statt, das das mit Bittererde ausgeschiedene und nur mit Weingeist behandelte etwas weisser war, das es Seidenglanz besafs und das es nicht, wie das mit Ammoniak ausgeschiedene, mit Regenbogenfarben spielte. Beiderlei Morpium gab mit gleichviel Aetzkalk und einigen Tropfen Alkohol zusammengerieben, bei der Annäherung von Salzsäure, ohne bemerkbaren Unterschied, weisse Nebel; beide reagirten nach ihrem ersten krystallinischen Ausscheiden dem Anschein nach gleich stark auf gelbe Pflanzenpigmente.

Von dem durch kohlen saure Bittererde ausgeschiedenen Morpium wurden 25 Gran mit 15 Gran Weinstein säure, gemäfs der vom Hrn. Hofrath *Vogel* angegebenen Sättigungscapacität, mit einigen Unzen Wasser über dem Feuer gelöst. Die Lösung reagirte stark sauer auf Lackmuspapier.

Fünf Gran des mit Ammoniak dargestellten Morpiums wurden mit anderthalb Unzen Wasser in einem Glase übergossen; es wurden gleichfalls in zwei Drachmen Wasser 10 Gran Weinstein säure gelöst, und von letzterer Lösung der Morpiumlösung tropfenweis zu-

gesetzt. Ein jeder Tropfen hielt etwa  $\frac{1}{10}$  Gran. Nach den ersten drei Tropfen, so wie nach den einigemal darauf folgenden tropfenweisen Zusätzen der Weinstein säurelösung fand nach kurzem Schütteln und einigem Erhitzen bald Neutralität Statt; als endlich abermals drei Tropfen zugesetzt worden waren, während dem Anschein nach etwa  $\frac{1}{2}$  des Morphiums ungelöst auf dem Boden lag, reagirte die Flüssigkeit sauer gegen Lackmuspapier: es wurde deshalb von jetzt an keine Weinstensäure mehr zugesetzt, und mit dem Schütteln und Erhitzen der Lösung bis zum Sieden, fortgefahren. Aber auch nach dreistündigem anhaltenden Behandeln war noch immer etwas Morphinium ungelöst. Die Röthung, die die Flüssigkeit mit Lackmuspapier hervorbrachte, schien bedeutender jetzt, als gleich nach dem letzten Zusatz der Säure, und der Zusammenhalt der Flüssigkeit hatte bedeutend zugenommen, so daß sie jetzt etwa die Consistenz einer Lösung von einer Drachme arabischen Gummi in einer Unze Wasser besaß. Zugleich bemerkte ich, da ich nach dem jedesmaligen Erhitzen der Flüssigkeit bis zum Sieden diese dann schnell zukorkte, daß bei der nachher durch das Erkalten entstehenden verdünnten Luft, das Ausscheiden eines öligen Stoffs aus dem Morphinium veranlaßt wurde, welcher die Wände des oben leeren Glases beschlug, so daß dort keine Flüssigkeit haftete.

Nimmt man an, daß, wie ganz sicher ist, nur die letzten drei Tropfen ( $= \frac{3}{10}$  Gran) zuviel hinzukamen und daß bis zu diesem Zeitpunkt  $4\frac{1}{2}$  Gran Morphinium gelöst worden waren, so werden, da in allem von der Weinstensäurelösung zwanzig Gran ( $= 1,5$  Säure) gebraucht wurden, um diese  $4\frac{1}{2}$  Gran zu neutralisiren, zu 100 Gran Morphinium  $34,2$  Weinstensäure,

oder zu 72 krystallisirte Weinsteinssäure 209,9 Morphinum zur Neutralisirung erfordert werden.

Es wurden jetzt 10 Gran eines durch Bittererde abgeschiedenen Morphiums mit 1 Unze Wasser übergossen; dann von einer, aus einer Unze Wasser und 10 Gran Weinsteinssäure angefertigten Lösung, 48 Gran (= 1 Gran Weinsteinssäure) hinzugesetzt. Durch anhaltendes Schütteln und Erhitzen dieser Flüssigkeit bis dahin, daß ein Tropfen der Lösung auf Lackmuspapier gebracht, keine saure Reaction zeigte, nachheriges Filtriren, scharfes Aussüßen und Wägen mit dem vorher abgewogenen Filtrum fand sich, daß, um den in Arbeit genommenen 1 Gran Weinsteinssäure zu neutralisiren, 2,8 Gran Morphinum verwandt worden waren. Hiernach würden 72 krystallisirte Weinsteinssäure 201 Morphinum zur Neutralisirung bedürfen.

Da diese Bestimmung ziemlich nahe mit der durch vorhergehenden Versuch gefundenen Zahl zusammentrifft, so möchten die Prämissen zur Berechnung im vorherigen Versuch keinen bedeutenden Fehler verursacht haben, obgleich ich die im letzten Versuch gefundene Sättigungscapacität für die richtigere meines Morphiums halte. Zugleich fand sich hiedurch, daß die von mir vermuthete verschiedene Basicität des Morphiums, wenn es auf verschiedenen Wegen bereitet wurde, wenigstens bei dem meinigen nicht Statt fand. Jedoch ist mit der Basicität die dem krystallinischen Stoff des Opiums nicht wesentlich eigenthümliche Alkalinität, die bei verschiedenem Morphinum sicher verschieden ist, nicht zu verwechseln. Letztere, oder die Ursache der alkalischen Reaction des Morphiums auf gelbe Pflanzenpigmente, ist Folge der Einwirkung des zur Abscheidung des Morphiums

angewandten Alkali auf den im unreinen Morpium im Ueberschufs befindlichen vegetabilisch - thierischen Stoff und dadurch bewirktes Zusammentreten von Ammoniak, sobald ein als Säure sich verhaltender Körper (hier in diesem Fall gelbes Pflanzenpigment) in die Lösung dieses Morpiums gebracht wird. Das alkalisch reagirende Morpium unterscheidet sich schon durch Krystallisation, Farbe, Glanz und durch leichtere Löslichkeit im kalten Alkohol von dem blos basischen Morpium, wie man durch das Vergleichen der Beschreibung des letzteren (S. 386) mit der des alkalischen Morpiums (S. 390) finden wird. In dem alkalisch reagirenden Morpium scheint gegen den einen Bestandtheil desselben, den vegetabilisch - thierischen Stoff, der andere Bestandtheil, das basische Morpium, als Säure aufzutreten. Aber auch nach dem Abscheiden dieses die alkalische Reaction verursachenden vegetabilisch - thierischen Stoffes, enthält das basische Morpium vegetabilisch - thierischen Stoff in seiner Grundmischung und scheint eine Verbindung der letztern im Minimum mit dem zweiten als Säure sich verhaltenden Bestandtheil zu seyn.

Hierüber folgende Versuche.

Wurde der zum Reinigen des (ohne Ammoniak dargestellten) Morpiums angewandte Weingeist mit flüssigem Halogen versetzt, so zeigte sich sogleich und stärker nach einiger Zeit, der, der vegetabilisch - thierischen Materie mit diesem Reagens, nach *Chevreuil*, eigenthümliche Niederschlag von dunkler Farbe. Wurde etwas desselben braunen Weingeistes mit Gallustinktur versetzt, so erhielt ich einen copjösen weißgelblichen Niederschlag, der in mehrerer Gallustinktur wieder auflöslich war, der getrocknet ein graues feinsan-

diges Pulver darstellte, das auf dem warmen Ofen schmolz, und im Tiegel unter Aufblähen und dem den verbrennenden Horn eigenthümlichen Geruch zu Kohle wurde. \*

Wurden 10 Gran alkalisch reagirendes Morphinum mit 10 Gran Aetzkalk und einigen Tropfen Alkohol zusammengerieben, so zeigte angenäherte Salzsäure durch entstehende weißse Nebel sogleich das Entwickeln von Ammoniak an. Als ich diese Mengung jetzt mit einer Unze Alkohol in ein Glas zusammenbrachte, gab selbst bei starkem  $\frac{1}{4}$  Stunde dauernden Sieden genäherte Salzsäure keine Spur von entweichendem Ammoniak zu erkennen; es wurde deshalb das Gemenge, nach dem Verdunsten des Alkohols, wieder in die vorige Reibschale gebracht, worauf fortgehend sich Ammoniak entband; so dafs es scheint, als wenn der Zugang der atmosphärischen Luft zum Entstehen, vielleicht auch nur zum Abscheiden des Ammoniaks in diesem Fall, Bedingung sey. Nach drei Tagen erst, unter fortwährendem Befeuchten mit Alkohol, endigte das Entweichen von Ammoniak; es hatte sich rings herum an dem Rande des Gefäßes ein gelbgrüner Ansatz gebildet, und der Kalk war kohlen-sauer geworden. Ob dies nur zum Theil oder mit dem sämmtlichen Kalk der Fall war, ob er zugleich Hydrat geworden, konnte ich für jetzt nicht ausmitteln. Das Gemeng wog jetzt 24 Gran; daher Gewichtsvermehrung 4 Gran. Wäre der ganze Kalk zum kohlen-sauren Hydrat geworden, so hätte, in so fern das entwichene Ammoniak keinen bedeutenden Unterschied in der Berechnung machen würde, das Gemenge jetzt 34 Gran wiegen müssen. Die Hälfte desselben wurde mit 1 Unze Wasser abgerieben und filtrirt. Die Lö-



sung sah gelbgrünlich aus, schmeckte wie metallisch, reagirte weder auf Lackmus noch auf Rhabarberpapier, und gab in gelinder Wärme etwa zur Hälfte verdunstet, ein Krystallhäutchen, welches das Ansehen einer an der Luft stehenden Aetzkalklösung mit deren Häutchen hatte; nach dem völligen Verdunsten dieser Lösung blieb ein flockiger  $\frac{2}{3}$  Gran betragender Rückstand, der sich zum größten Theil in wenigem Wasser löste, und dessen abermals eingedickte Lösung mit oxalsaurem Kali stark sich trübte und mit Schwefelsäure erhitzt, die, an Intensität jedoch geringere und und mehr ins Gelbe sich neigende, rothe Farbe gab, die das Morphium, mit der Schwefelsäure erhitzt, hervorbringt. Als ich den bei diesem Versuch erhaltenen Kalkrückstand nochmals mit Wasser abrieb, hatte auch dieses, jedoch weniger, davon gelöst.

Die andre Hälfte obiger Verbindung, aus Aetzkalk und Morphium bestehend, 12 Gran wiegend, wurde mit Alkohol ausgezogen; dieser hatte  $2\frac{1}{2}$  Gran eines, nach Erkaltung des Alkohols, in feinen Nadeln krystallisirenden Salzes, ausgezogen, welches freilich der Krystallisation nach wie unverändertes basisches Morphium aussah, das in heißer Lösung auf Rhabarberpapier nicht reagirte, das zu Kohle verbrannt, mit destillirtem Essig ausgesüßt und diese Lösung mit oxalsaurem Kali versetzt, keine Trübung hervorbrachte; dennoch aber glaube ich, daß es einen nur zu geringen Gehalt an Kalk besitzt, um aus einer solchen Menge dargestellt werden zu können, besonders wenn man noch hinzunimmt, daß vielleicht die Kohle den Kalk einhüllte und ihn dadurch der Lösung durch schwache Essigsäure entzog.

Da der letztgenannte Versuch, das Lösen des

Morphiumkalks in einem kleinen Kölbchen über der Flamme eines Lichtes angestellt wurde, verbrannte der wenig Morphinum haltige Kalk unter schwachem Verpuffen ähnlichem Geräusch zu einem in Stücken zusammengebackenen Kohle haltigen Kalk und bestätigte dadurch die vermuthete Verbindung des basischen Morphiums mit Kalk. Würde der Kalk nicht in wirklicher Verbindung mit einem Theil des Morphiums gewesen seyn, so würde, da der Alkohol in weit überschüssiger Menge darüber sott, das Morphinum gelöst und nicht verbrannt seyn; oder doch wenigstens, da der Morphinumkalk als Pulver in das Glas geschüttet worden war, auch ohne Zusammenhang mit Kalk verbrannt seyn.

Hier wäre also wirklich unter Ausscheidung von Ammoniak eine Verbindung des 2ten Bestandtheiles im alkalisch reagirenden Morphinum mit Kalk bewirkt worden, und dieser müßte hier doch gegen den Kalk als Säure auftreten.

(Der Herr Verf. geht nun zur Zerlegung des Morphiums mit concentrirten Säuren über. Und dieser Theil der Arbeit, der sich auch auf die Mekonsäure bezieht, scheint einer Revision und Verarbeitung des Einzelnen, was mit großer Ausführlichkeit angeführt ist, zu einem Ganzen zu bedürfen, damit der Plan und Gang der Analyse leichter überschaut werden könne. Der Hr. Verf., dem es, wie man deutlich sieht, um Enthüllung der Wahrheit zu thun, wird sich dieser Arbeit nicht entziehen. Wir theilen indess die von ihm erhaltenen Resultate mit. *J, H.*)

Fassen wir die durch eine große Reihe von mir angestellter Versuche erhaltenen Erfahrungen in einem Resultate zusammen, so findet sich, daß keine der Productionen des Pflanzenreichs mehr vielleicht die

Eigenschaften der von *Fourcroy* und *Vauquelin* angenommenen vegetabilisch - thierischen Materie besitzt, als das Opium. Dem gemäß verhält es sich auch, wenn wir es dem Einwirken irgend eines chemischen Processes unterwerfen. Immer wird es in jedem Augenblick von einer Stufe zur andern verändert, die mannigfaltigsten Verbindungen bilden, je nach Art und Dauer des angewandten chemischen Processes, zu welchem, bei einem nur durch Sonnenwärme eingetrockneten Pflanzensaft, schon die Lösung in Wasser zu rechnen ist; so daß dann bei dem durch Wärme oder kräftiger einwirkende Potenzen gesteigerten Process, neue und sich immer mehr von der Natur der im Opium vorhanden liegenden nähern Bestandtheile, entfernende Producte erhalten werden. Immer aber wird man die Masse der Kräfte schwächen, je nach dem Abscheiden eines oder mehrerer Stoffe; immer wird man aus einer bestimmten Menge Opium um so weniger des zuletzt abzuscheidenden Stoffes erhalten, je mehr Ausbeute die Anwendung des früheren Processes gab. Alle die aufgezählten salzartigen Substanzen in dem Opium und wohl auch das Caoutchuk und das Oel, liegen schwerlich neben und mit einander verbunden in demselben; sie alle sind Folgen von Zersetzungen und neu hervorgerufene Verbindungen \*).

---

\*) Als ich kürzlich aus 8 Unzen eines, zu 20 Gran stark Brechen erregenden, Ipecacuanhapulver, die Emetine zu zu bereiten versuchte, und ich, um Schwefeläther zu ersparen, das Pulver nur einmal mit 6 Unzen Aether digerirte, indem ich glaubte, daß ich den im Aether und Alkohol löslichen, riechenden Stoff, mit geringerm Auf-

Ursprünglich besteht, meiner Meinung nach, das Opium aus einer mit Wasser verbundenen, Schwefel-, Eisen- und Kalkhaltigen Stickstoffkoble mit Ueberschuss an Kohle; die bei dem ersten Lösen im Wasser sich zu einem in vegetabilisch-thierischem Leim gelösten Gerbestoffleim verbindet; diese Verbindung zerfällt bei dem Einwirken einer alkalischen Base, die sich zum Theil mit dem vegetabilisch-thierischen Leim verbindet; zum Theil das Entstehen von Ammoniak veranlaßt. Zugleich geht die Ausbildung des sich jetzt erst constituirenden Morphiums, eines oxydirten, \*) Gerbestoffleims, und im gleichen Schritt mit dieser

Wand an Aether aus der Emetine selbst würde abgehoben werden, erhielt ich durch Concentration der alkoholischen Tincturen eine braune Flüssigkeit, die mit kohlensaurem Baryt behandelt nur zu einem sehr geringen Theil durch neutrales, wie durch saures essigsaures Blei gefällt und keineswegs entfärbt wurde; so daß ich nach fernerm Behandeln des mit Bleioxyd verbundenen Stoffs durch Hydrothionsäure und Abrauchen bis zur Extractconsistenz 12 Gran Emetine erhielt. Daß es hiernach nicht sehr wahrscheinlich ist, daß nur dieser Stoff die Brechen erregende Wirkung der Ipecacuanha besitzen soll, darf ich wohl kaum erwähnen, so wie daß die Emetine höchst wahrscheinlich ein Product sey. G.

\*) Desrosne erhielt durch Destillation des Morphiums, wie des andern nach ihm benannten Salzes, einerfließ Producte, woraus mir wahrscheinlich wird, daß das Desrosnesche Salz basisches nicht alkalisch reagirendes Morphinum sey. Da unter den Producten beider zugleich sich kohlensaures Ammoniak fand, so giebt dies den Beweis für die Annahme, daß das Morphinum auch Oxygen enthalte. *Tremisdrffs Journal der Pharmacie*, 12. Bd. 1. Hft. p. 245.

Oxydation, die Hydrogenation des andern Bestandtheiles der Lösung, einer Verbindung von vegetabilisch-thierischen Stoff mit wenigem Gerbestoff vor sich. Die letztere Verbindung bleibt, nach Ausscheidung des Morphiums gelöst und enthält nun wahrscheinlich und analog dem Zugesehnen des Schwefels, Eisens und Kalks in der rothfärbenden Substanz des Bluts auch den Schwefel, den Kalk und das Eisen in sich liegend, die zum Entstehen wie zur Figirung der rothfärbenden Säure im Opium, Bedingung sind, und die durch Hofrath Bucholz \*) bei dessen Untersuchung des Opiums auch aufgefunden worden sind. Beide aber, das Morphium wie die Mekonsäure enthalten in sich Kohlenstoff und Stickstoff, ersteres in dem Cyanogen bildenden, letztere in dem Kohlenstickstoff gebenden Verhältniß; da wir nun aber, selbst nach den vortreflichen Arbeiten Ittners, Gay-Lussacs, und Grothufses über die Blausäure, diese nach ihren mannigfaltigen Modificationen und Verbindungen noch lange nicht genug kennen lernten, da wir einige der bekannten Kohlenstickstoff- und Cyanogenverbindungen bei dem Behandeln einzelner Producte des Opiums entstehen sehen, da wir drittens nicht wissen, wie die Thätigkeit des lebenden Thierorganismus ganz verschieden von dem Chemismus diese Stoffe umbildet, so denke ich würde es am zweckmäßigsten seyn, einzelnen aus dem Opium producirten Stoffen die Wirkung des Ganzen nicht zuzuschreiben und sie ausschluß- oder vorzugsweise in medicinische Anwendung bringen zu wollen.

Es möge mir nur noch erlaubt seyn, an einige

---

\*) Tromsdorffs Journal der Pharm. 8, Bd, 1. Hft. p. 50,  
Journ. f. Chem. u. Phys., 25. Bd, 4. Heft

flüchtige Säure, so wie die Proustsche rosenfarbene Säure \*) (blasensteinsaures Ammoniak) ähnliche Verbindungen sind?

Ob nicht auch das von *Klapproth* untersuchte Wasser des Sees bei *Lulostin* \*\*), von rother Farbe, die er von dem Pflanzeneiweißstoff der *Ulva prunifor- mis* ableitet, eine, durch Zersetzung dieses vegetabilisch-thierischen Stoffs entstandene, Schwefelkohlenstoffstoffs-eisen-Verbindung enthalten haben mag?

Ob nicht auch das Mineralwasser zu *Lemington Priors* in England \*\*\*) ; das *Adolfsberger* und *Poslaer* Mineralwasser in Schweden \*\*\*\*), und das *Schmarzowker* Mineralwasser in Ungarn \*\*\*\*\*), so wie die von Professor *Boeckmann* bemerkte Veränderung des Weines durch, vorher zum Filtriren faulen Wassers angewandte, Kohle ähnliche Modificationen der genannten Verbindung seyn mögen? — Das Alles überlasse ich der Prüfung der Leser.

---

\*) *Scherers* allgem. Journ. d. Chem. IV. B. p. 458,

\*\*) Ebendas. V. B. p. 463. Analyse von *Lambe*.

\*\*\*) *Gebiens* Journal für Chemie und Physik, I. Band, pag. 1.  
Analyse von *Berzelius*.

\*\*\*\*) Ebendas. I. B. p. 18. Analyse von *Winterl*.

\*\*\*\*\*) Neues allgem. Journ. d. Chem. und Phys. II. Band,  
pag. 243.

IV. Ueber ein  
**n e u e s A l k a l i**

von

**Pelletier und Caventou.**

(Uebersetzt aus den Annales de Chimie et de Physique 1818.  
 Tom. 8. p. 323 vom Dr. G. Osann.)

Bei der Analyse der St. Ignatzbohnen und der Krähenaugen stellten wir aus diesen beiden Samen die Substanz dar, von welcher deren Wirkung auf den thierischen Organismus abhängt. Diese Substanz, welche weiß, krystallisirbar und von unerträglicher Bitterkeit ist, bildet viereckige Blättchen oder vierseitige Prismen mit einer vierflächigen, etwas plattgedrückten pyramidalen Zuspitzung. Im Wasser ist sie schwer, im Alkohol leicht auflöslich und besteht, wie die meisten der vegetabilischen Stoffe aus Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Sie ist vorzüglich ausgezeichnet durch alkalische Eigenschaften, ähnlich dem Morphinum, von dem sie sich doch wesentlich unterscheidet. Sie stellt die blaue Farbe des durch Säure gerötheten Lackmuspapier wieder her und bildet mit Säuren neutrale, mehr oder weniger leicht krystallisirbare Salze. Mit verdünnter Salpetersäure behandelt, verbindet sie sich zu einem salpetersauren Salze, aber concentrirte Salpetersäure wirkt zersetzend auf ihre Elemente, die Auflösung wird blutroth, nach einiger Zeit gelb und gibt Kleesäure: Das essigsaure Salz ist sehr auflöslich im Wasser, das schwefelsaure weniger und im rhomboidalen Blättchen krystallisirbar.

Diese Substanz wirkt auf den thierischen Organismus, wie ein Weingeistertrakt aus Krötenaugen, aber viel heftiger.

Die Ordnung der vegetabilischen Säuren ist mäßig, die der alkalischen hingegen auf das Morphin beschränkt; jedoch hat *Vauquelin* die alkalischen Eigenschaften eines Stoffes bekannt gemacht, welchen er bei einer Analyse der *Daphne alpina* erhielt. Unsere Substanz bildet eine neue Art dieser Ordnung, welche zahlreich werden könnte und welche zuerst entdeckt wurde von *Vauquelin*. Um hietan zu erinnern und unserm Stoff einen Namen zu geben, welcher Umschreibungen erspart, schlagen wir vor ihn *Vauqueline* zu nennen. Wir glauben, daß dieser Name besser gewählt ist als ein anderer, der gar nichts bezeichnet, oder Eigenschaften angiebt, welche man auch an andern Körpern findet.

#### Nachschreiben des Uebersetzers.

Damit der Leser über die letzte Bemerkung der Hrn. *Pelletier* und *Caventou* hinsichtlich auf die erste Entdeckung dieser neuen Gattung alkalischer Pflanzenstoffe von *Vauquelin*, selbst urtheilen könne, wollen wir hier einen kurzen Auszug aus der angeführten Analyse mittheilen. *Vauquelins* Abhandlung über die *Daphne alpina* befindet sich in den *Annales du Museum d'histoire naturelle* 1812. S. 177 und in den *Annales de Chimie* vom Jahr 1812, Tom. 84. S. 173.

Ein heißer Aufguß von Alkohol auf die Rinde der *Daphne alpina*, welcher sich grün färbte, ließe bei der Destillation eine dicke Flüssigkeit zurück von grüngelber Farbe, in welcher Stückchen von Harz



herumschwammen. Das Harz wurde von der Flüssigkeit durch Ausspülen mit Wasser getrennt. Nahn *Fauquelin* von diesem Harz etwas auf die Zunge, so brachte es nach Verlauf einiger Zeit einen scharfen Geschmack hervor, welcher sich bis in den Schlund zog und 20 Stunden mehr oder weniger heftig anhielt. Dasselbe Harz verband sich mit den Alkalien, ohne seine Schärfe zu verlieren. Es wurde sofort im Alkohol aufgelöst, der Alkohol von demselben durch Destillation getrennt und der Rückstand mit Wasser behandelt, welches ein scharfes Princip in sich aufnahm. Dieses scharfe Princip geht mit Wasser bei der Destillation über, nicht aber mit Alkohol, wenn es darin aufgelöst ist.

Von diesem scharfen Princip nun, welches auf geröthetes Lackmuspapier gleich einem Alkali reagirte, handelt es sich hier und wir wollen daher das, was *Fauquelin* hierüber sagt, wörtlich hersetzen.

„Wasser, welches diesen Stoff enthielt, hatte einen scharfen Geschmack, der aber erst nach einer Stunde sich bemerkbar machte, nachdem man es auf die Zunge genommen, indess an Lebhaftigkeit zunahm mehrere Stunden lang und erst nach 24 bis 30 Stunden aufhörte.“

„Das Verhalten dieses Stoffes gegen Reagentien ist folgendes:

1) Er stellt die Farbe des gerötheten Lackmus wieder her; er muss daher ein Alkali enthalten, oder eine Substanz, welche eben so wirkt. Veilchensaft indess bleibt unverändert.

2) Er fällt das essigsaure Blei weiß, und der Niederschlag erhält, wenn man ihn umrührt, ein

scharflich glänzender Ansehn, wie eine gute Auflösung von Talgseife.

3) Weder Kalkwasser noch Barytwasser bringen eine Trübung hervor, welches beweist, daß diese Flüssigkeit kein kohlensaures Alkali enthält.

4) Schwefelsaures Kupfer schlägt weisse, ein wenig in das Grüne übergehende Flocken nieder.

5) Eine schwache weisse Trübung erfolgt mit salpetersaurem Silber, allein die Flüssigkeit wird nach Verlauf einer gewissen Zeit rösenröth. *Es fragt sich, sind es einige Spuren Ammoniak, enthalten in dem Wasser, welche die Wirkung, von der wir gesprochen, hervorbringen, oder ist es die scharfe Substanz selbst? Ich bin ziemlich geneigt es zu glauben.*

Uebrigens fand *Vauquelin* in der *Daphne alpina* noch ausser *Kieselerde*, *phosphorsaurem* und *kleezau-rem Kalk* und *Eisenoxyd*, eine bittere in graulich glänzenden Blättchen krystallisirende Materie, eine färbende Materie, und endlich, was in Beziehung auf die in der vorhergehenden Abhandlung vom Herrn *Geyer* aufgestellte scharfsinnige Ansicht besonders zu bemerken, eine schleimige Materie, von der er hervorhebt, daß sie nicht zur Classe der Gummiarten gehöre, sondern *vegetabilisch - thierisch* sey (*un composé animalisé*), weil sie bei der Zersetzung eine beträchtliche Menge Ammoniak gab.

Zweckmäfsig möchte es noch seyn, die allgemeine Bemerkung, mit welcher *Vauquelin* diese Abhandlung schliesst, wörtlich mitzuthellen. „Alle scharfen und ätzendsten vegetabilischen Substanzen, sagt er, scheinen entweder ölig oder harziger Natur zu seyn;

und was nicht minder beachtungswerth, diejenigen Pflanzen, welche scharfe oder giftige Stoffe enthalten, haben wenig oder gar keine Säure in sich, weswegen also die Pflanzen, in welchen keine Säure vorkommt, Mistrauen einflößen müßten, während weniger Besorgniß nöthig ist bei denen, welche eine Säure in sich schliessen.“

Der Leser sieht aus dem Angeführten, daß *Vauquelin* der Entdeckung der nun geltend gewordenen neuen Gattung von Pflanzenalkalien allerdings nahe war, die Sache aber durchaus nicht in der Allgemeinheit, wie dieß von *Sertürner* geschah, auffaste. Er stellte nicht einmal Verbindungen von Säuren mit jenem Stoffe dar, und die Wiederherstellung des gerötheten Lackmus ist die einzige alkalische Eigenschaft, welche seiner Substanz zukommt, die nicht einmal auf den für alkalische Einwirkung so empfindlichen Veilchensaft reagirte. Und welches schwankende Kriterion ist überhaupt die Wirkung auf Pigmente. Schwefelsaures Uran z. B. bräunet nach *Bucholz* das Curcumapapier, gleich den Alkalien; wird man darum von einer Gattung salzartiger Alkalien sprechen, gesetzt auch, daß dieses schwefelsaure Uran einige Säuren neutralisiren, d. h. mit ihnen dreifache Salze bilden sollte?

Was die scharfen Pflanzenstoffe anlangt: so war man schon längst aufmerksam darauf, daß die Schärfe einiger derselben durch Säuren abgestumpft werde. Selbst in den gemeinen Haushaltungen wußte man z. B. längst, daß man die Schärfe des Meerrettigs durch Zusatz von Essig vermindern kann. Kein Chemiker aber hat darum ein eigenthümliches alkalisches

Princip in dem Meereswässrig angenommen, ebenso wenig als im Alkohol, der in der Salzsäure die Salzsäure (Hydrochlorine) so vollkommen bindet, daß (selbst unter Einfluß von Wasser) keine Spur von saurer Reaction mehr wahrzunehmen.

Wenn nun der Name *Fauquelins*, welchen die Herren *Pelletier* und *Caventou* ihrem neuen Alkali beilegen, bezeichnen soll, wie sie sagen, daß *Fauquelin* diese neue Gattung von Alkalien zuerst entdeckt habe: so bezeichnet dieser Name ein wenig mehr, als in der Abhandlung *Fauquelins*, die wir eben im Auszug gaben, aufgefunden werden kann. Auf der andern Seite glauben wir auch nicht, daß der uns die Wissenschaft so verdiente *Fauquelin* den Herren *Pelletier* und *Caventou* sonderlich Dank wissen werde für die Ehre, welche sie ihm anthun, indem sie einen so giftig wirkenden Stoff nach seinem Namen nennen. Eben darum ist es wohl zweckmäßiger dieses neue Alkali, da es in den Krähenaugen (*Strychnos nux vomica*) zuerst aufgefunden wurde, mit *Buchner* (Repert. für Pharmacie B. 5. S. 153) *Strychnin* zu nennen.

## V. Ueber das Strychnin.

Aus einem Briefe des Herrn Professor *Steinmann* in Prag an den Herausgeber.

Prag d. 2. Aug. 1819.

Ich habe vor Kurzem das Strychnin dargestellt; allein der hohe Preis der *Faba St. Ignatii*, und die kleine Menge des Strychnins, die man daraus erzieht, hinderten mich mehrere Versuche der franz. Chemiker zu wiederholen. Die Auscheidung gelingt nicht

gut, und man erspart den Aether, wenn man die *Radura Fabae St. Ign.* geradezu mit Alkohol von 0,830 spec. Gew. kocht, das filtrirte Decoct erkalten und einige Tage stehen läßt, um eine vollständige Abscheidung des Cerins zu bewirken, hierauf die Tinktur zum Extract eindickt, dieses in Wasser auflöst, und aus dieser Auflösung das Strychnin durch Aetznatron und Magnesia fället. Das gefällte gut ausgewaschene weiße Pulver, in absolutem Alkohol aufgelöst, liefs das Strychnin, nach dem Verdampfen des Alkohols bei der Lufttemperatur in strahlförmig aus einander laufenden feinen Nadeln zurück, deren Zusammenhäufung und übriges äusseres Ansehen viel Aehnlichkeit mit dem des Wawellits besitzt. Noch schöner krystallisirt das schwefelsaure Strychnin. Das Verhalten dieses Stoffes gegen Salpetersäure und mehreres Andere fand ich ganz übereinstimmend mit den Angaben der Herren *Pelletier* und *Caventou*.

---

## VI. Auszug eines Schreibens

v o m

Herrn Hofrathe *Wurzer*.

Marburg d. 14. Oct. 1819.

Abermals wurde ein neues *Alkali* im Pflanzenreiche aufgefunden! Herr *Van-Mons* schreibt mir, daß er es im *Sabadillsamen* entdeckt habe. Der Same, worin er das Alkali fand, war lange als Pulver aufbewahrt gewesen, und durch die Zeit so verschimmelt, und gewissermassen zusammengebacken, daß es ganz das Aussehen hatte, als habe ein Vegetationsproceß

in demselben begonnen. — Diefs Laugensalz unterscheidet sich von allen übrigen seit kurzem aufgefundenen Alkalien. Herr *Van-Mons*, weifs noch nicht, ob dasselbe sich im *gesunden* Sabadillaamen findet, oder ob es erst während des Verderbens sich in demselben entwickelt \*). Obschon diese Entdeckung in beiden Fällen von gleichem Interesse ist; so beschäftigt er sich doch nunmehr damit, diefs unverzüglich auszumitteln. —

\*) Wir wissen aus der vorhergehenden Abhandlung des Hrn. *Meissner*, dafs ersteres der Fall ist. Schon im vorhergehenden Hefte S. 365 ist diefs erwähnt und es kann daher kein Zweifel seyn, dafs Herrn Dr. *Meissner* die Priorität dieser Entdeckung gebühre, da er schon am 10. Aug. 1819, seine hier abgedruckte Abhandlung einsandte.

d. H.

Chemische Untersuchung  
des  
K a r p h o l i t h s  
vom  
J o s. S t e i n m a n n,  
Professor der allgemeinen und speciellen technischen Chemie  
am technischen Institute zu Prag.  
(Gelesen in der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.)

Der verewigte *Werner* stellte in seinem letzten Mineralsysteme vom Jahre 1816 \*) eine neue Fossilien-Gattung auf, welcher er den Namen *Karpholith* (Strohstein) beilegte, und sie bei seinem Talkgeschlechte unter der *Sippschaft des Strahlsteins* einordnete. Der Fundort dieses Fossiles ist *Schlackenwald* in Böhmen. Die zur nachstehenden Untersuchung angewandeten Fragmente verdanke ich der gefälligen Mittheilung des k. k. Herrn Gubernial- und Commerzrathes *K. A. Neumann*. Ihre äußere Charakteristik stimmte vollkommen mit der überein, welche der Herr Edelstein-Inspector *Breithaupt* im oben angeführten Werke von dem *Karpholith* entworfen hat, und welche ich hier entlehne.

\*) Abr. Gottl. *Werner's* letztes Mineralsystem, Freybutg und Wien 1817.

## Aeusere Kennzeichen des Karpholiths.

„Die Farbe ist gewöhnlich *hochstrohgelb*, selten dem *wachsgelben* sich nähernd.

*Derb* und zwar vorzüglich in Gangtrümmern; inwendig meist *starkschimmernd*, von *Perlmutterglanze*. Im Bruche ist er *sehr zart*, stets *büschel- oder sternförmig auseinander laufend*, *faserig*, und giebt daher auch *splittrige* und *keilförmige* Bruchstücke.

*Derb* bestehet er zum Theil aus *groß- grob-* und bis *klein- eckigkörnigen* abgesonderten Stücken. Uebrigens ist er *undurchsichtig*, von einem *geringen* (?) *Härtegrad*, der sich aber, wegen der *ungemein leichten Zerspringbarkeit*, nicht näher bestimmen läßt. Nicht sonderlich schwer im *mittlern Grade*. *Specifisches Gewicht*: 2,935.“

In Hinsicht der Härte des Fossiles fand ich, daß es sich ohne Schwierigkeit im Calcedonmörser zum feinsten Pulver zerreiben läßt, was vorzüglich von der großen Sprödigkeit der Fasern herrühret, übrigens aber ritzen Fragmente an den Stellen, wo mehrere Fasern in eine Spitze zusammen liefen, das Glas sehr deutlich. Das specifische Gewicht eines ganz reinen Stückes,  $107\frac{1}{2}$  Gran schwer, fand ich bei der Temperatur  $16^{\circ}$  Cent. und dem Barometerstand  $0^{\text{m}}.746$  gleich 2,923; also nur wenig von der Bestimmung des Herrn *Breithaupt* abweichend.

Ich brachte ein kleines Stückchen Karpholith auf eine glühende Kohle, welche mittelst des Ermannschen Gebläses mit Oxygengas angefacht wurde, es schmolz nach einigen Minuten, ohne sich aufzublähen, bloß unter mäßigem Aufschäumen, zu einer braunen undurchsichtigen Emailperle; mit kohlensaurem Na-



von schmilzt es vor dem gewöhnlichen Löthrohr zu einem grünen Email. Salzsäure hat auf kleine Stückchen des Fossils weder in der gewöhnlichen Temperatur, noch beim Erhitzen eine Einwirkung. 30 Gran am feinsten Pulver zerriebenen Karpholiths wurden mit reiner concentrirter Salzsäure eine Viertel-Stunde gekocht; die Säure färbte sich schwachgelb, an dem Pulver war aber weder ein Gelatinisiren, noch sonstige Veränderung oder Verminderung wahrzunehmen. In der von dem Pulver klar abgegossenen Säure zeigte blausaures Eisenkali eine Spur von Eisen an; Ammoniak bewirkte blos eine schwache Trübung.

Es wurde sonach die Zerlegung durch ein Alkali gewählt, und nach einem vorläufigen Versuch zur Erforschung der Qualität der Bestandtheile das nachstehende Verfahren befolgt.

## A.

1. 5 Grammen Karpholith in kleinen Stücken wurden im Platintiegel eine halbe Stunde lang geglühet. Das Fossil hatte an Härte zugenommen, und seine strohgelbe Farbe mit einer röthlichbraunen vertauscht. Der Gewichtsverlust betrug 0,56 Grammen, auf 100 Theile demnach 11,2.
2. Ein ganzes Stückchen Karpholith, 2,43 Grammen schwer, wurde in einer kleinen Glasretorte mit Vorlage und pneumatischem Apparat nach und nach bis zum Glühen der Retorte erhitzt. Es sammelte sich Wasserdunst in der Vorlage, und nach dem Uebergehen der Luft der Gefäße fand weiter keine Gasentwicklung Statt. Das Fossil hatte 0,253 Grammen an Gewicht verloren; nachdem es nochmals im Platintiegel heftig geglühet

würden, betrug der Verlust 0,385 Grammen, folglich auf 100 Theile 11,36.

Nimmt man den sämtlichen Glüheverlust für Wasser, und das Mittel aus beiden Versuchen: so erhält man den Wassergehalt des Karpholiths zu 11,36 auf 100 Theile.

### B.

a. 10 Grammen ungeglüheten zum feinsten Pulver zerriebenen Karpholiths wurden mit der dreifachen Menge an der Luft zerfallenen kohlensauren Natrons innig gemengt, und im Platintiegel eine halbe Stunde lang heftig geglüht. Das Gemenge war unvollkommen geschmolzen, von grüner Farbe.

Mit Wasser aufgeweicht, und mit Salzsäure digerirt, löste sich alles vollkommen zur klaren Flüssigkeit auf, welche, zur Trockniss verdampft, beim Wiederauflösen in angesäuertem Wasser farblose Kieselerde zurückließ, die ausgeglüht und noch warm gewogen wurde. Ihr Gewicht war mit der in d erhaltenen zusammen genommen 3,755 Grammen.

b) Die von der Kieselerde gesonderte Flüssigkeit wurde zuerst, um eine Fällung der möglicher Weise vorhandenen Talkerde zu verhindern, reichlich mit Salmiak, und hierauf so lange mit Aetzammoniak versetzt, bis dieses vorherrschte. Der entstandene braune Niederschlag wurde sogleich von der Flüssigkeit getrennt, und gut ausgewäst.

c) Die sämtliche Flüssigkeit wurde hierauf zur Trockniss verdampft, und durch anhaltendes Glühen der trocknen Salzmasse alles salzsaure Ammoniak verflüchtigt. Der Rückstand ließ beim

Auflösen im Wasser eine geringe Menge braunen Pulvers zurück, welches sich wie Manganoxyd verhielt, in Salzsäure aufgelöset, und der Flüssigkeit in f zugesetzt wurde. Die wässrige Auflösung, von der das Manganoxyd geschieden worden, blieb sowohl kalt, wie zum Sieden gebracht, auf den Zusatz von kohlensaurem Natron ungetrübt; woraus die Abwesenheit von Kalk und Talk in dem Fossile hervorgehet.

- d) Der (in b) durch Fällung mit Aetzammoniak erhaltene braune Niederschlag wurde noch feucht in eine Auflösung von Aetznatron gebracht, und damit bis zum Kochen erhitzt. Aus der alkalischen Auflösung wurde die Thonerde durch Salmiak gefällt. Die erhaltene Thonerde wurde nach dem Trocknen in Salzsäure aufgelöst, wobei eine geringe Menge Kieselerde zurückblieb, welche der in a erhaltenen beigefügt wurde; aus der salzsauren Auflösung neuerdings mit Ammoniak gefällt, getrocknet und ausgeglühet wog sie 2,648 Grammen.
- e) Der im Aetznatron unaufgelöst gebliebene Theil des Niederschlags (in b), löste sich in Salzsäure unter Entwicklung von Chlorin vollkommen auf. Die Auflösung wurde mit Ammoniak genau neutralisirt, und hierauf das Eisenoxyd durch bernsteinsaures Ammoniak gefällt. Man erhielt 1,385 Grammen getrockneten bernsteinsauren Eisenoxys, welche nach dem Ausglühen in einem kleinen Porcellantiegel 0,627 Grammen rothen, dem Magnete nicht folgsamen Eisenoxys zurückblieben.
- f) Die von dem bernsteinsauren Eisen befreite Flüssigkeit wurde sammt dem Aussüßwasser bis zu

beiläufig 16 Gentiliter bei gelinder Wärme verdampft, die salzsaure Manganauflösung c hinzugefügt, und der Mangangehalt aus der kochenden Flüssigkeit durch kohlen-saures Natron gefällt. Das an der Luft getrocknete weiße kohlen-saure Manganoxyd wog 2,887 Grammen, welche nach anhaltendem heftigen Ausglühen im Platintiegel 1,853 Grammen licht röthlich braunen Mangan-oxys zurückliessen.

Eine vorläufige mit 4,8 Grammen gegläuhten Steinpulvers unternommene Untersuchung, so wie eine spätere, wo das Fossil, um einen möglichen Alkali-gehalt aufzufinden, durch kohlen-sauren Baryt aufgeschlossen worden war, gaben beide ein von dem angeführten sehr wenig abweichendes Resultat, und letztere zeigte insbesondere die Abwesenheit von Kali und Natron.

Dem Angeführten zufolge sind somit 100 Theile Karpholiths zerlegt worden in:

|                        |   |   |       |
|------------------------|---|---|-------|
| Kieselerde (a) und (d) | - | - | 57,55 |
| Thonerde (d)           | - | - | 26,47 |
| Manganoxyd (f) und (c) | - | - | 13,53 |
| Eisenperoxyd (e)       | - | - | 6,27  |
| Wasser (A)             | - | - | 11,56 |
|                        |   |   | <hr/> |
|                        |   |   | 99,97 |

Wenn auch in dieser Aufzählung der Bestandtheile des Karpholiths kein Ueberschufs gefunden wird: so kann doch schwerlich angenommen werden, daß Eisen und Mangan in demjenigen Oxydationszustande in dem Fossile vorhanden waren, in welchem sie ausgeschieden worden sind. Die strohgelbe Farbe des Fossils, welche sich beim Ausglühen in ein dunkles Braun verändert, gestattet die Annahme: daß bei-

de Oxyde als Protoxyde; und der Widerstand des Fossils gegen die Einwirkung der Salzsäure: dafs sie als Protoxydsilikate in ihm vorhanden seyn möchten. Dieses angenommen, so kommen statt 6,27 Theilen Eisenperoxyd \*) 5,64 Eisenprotoxyd in Rechnung zu bringen. Das rothbraune Pulver, welches durch anhaltendes Glühen der Manganoxyde erhalten wird, hält *Berzelius* (in Folge einer Untersuchung der Manganoxyde von *Arfwedson*) in seinem Briefe an *Gay-Lussac* \*\*) für eine Zusammensetzung aus Protoxyd und Deuteroxyd, analog dem schwarzen Eisenoxyd im Magneteisenstein; und es soll nach ihm bestehen aus 100 Theilen Mangan und 37,47 Theilen Oxygen; dagegen das mit den Säuren Salze bildende Protoxyd aus 100 Mangan und 28,105 Oxygen, das (schwarze) Deuteroxyd aus 100 Mangan und 42,16 Oxygen und endlich das Hyperoxyd (Graubraunsteinerz) aus 100 Mangan und 56,21 Oxygen. Demnach wären 137,47 Theile rothbraunes Manganoxyd gleich 128,105 Theilen Protoxyd, welches Verhältnifs, auf die oben erhaltene Menge rothbraunen Oxyds angewendet, 17,09 Theile Protoxyd anzeigt.

Gehen wir nach dieser Berichtigung zur Betrachtung der stöchiometrischen Verhältnisse über, so erhalten wir, wenn die Bestimmungen des Oxygenthaltes der Kieselerde und Thonerde gleichfalls nach *Berzelius* neuester Bestimmung \*\*\*) zum Grunde gelegt werden, folgendes Resultat;

---

\*) *Berzelius* in *Schweiggers Journal für Chemie und Physik* B. XV, S. 284 und 286.


\*\*) *Annales de Chemie et de Physique* Tom. VI, p. 204.

\*\*\*) *Schweiggers Journ. f. Ch. u. Phys.* B, XXIII, Heft 5.

100 Theile Karpholith enthalten

|                | Theile  | Oxygengehalt |          | Oxygengehalt |
|----------------|---------|--------------|----------|--------------|
|                |         |              | nach der | Berechnung.  |
| Kieselerde     | 37,53   | 18,88        | 15       | 18,90        |
| Thonerde       | 26,48   | 12,35        | 10       | 12,26        |
| Manganprotoxyd | 17,09   | 3,75         | 3        | 3,78         |
| Eisenprotoxyd  | 5,64    | 1,26         | 1        | 1,26         |
| Wasser         | 11,36   | 10,03        | 8        | 10,08        |
| Verlust        | 1,90    |              |          |              |
| Summa          | 100,000 |              |          |              |


Das Manganprotoxyd enthält somit den Oxygengehalt des Eisenprotoxyds sehr nahe 3mal, das Wasser 8mal, die Thonerde 10mal, und die Kieselerde 15mal. Ferner ist die Oxygenmenge des Wassers die doppelte von der des Mangan- und Eisenprotoxyds zusammengenommen. Wäre der gesammte Oxygengehalt der Thonerde, des Mangan- und Eisenprotoxyds gleich dem Oxygengehalt der Kieselerde, so ließe sich annehmen: daß alle drei Oxyde als Basen, mit der Kieselerde, als Säure, zu Silikaten verbunden seyen, in welchen der Oxygengehalt der Säure dem der Base gleich wäre. Allein der Oxygengehalt dieser dreibasischen Oxyde wird erst dem der Kieselerde gleich, wenn man den des erhaltenen Eisenprotoxyds doppelt nimmt. Es ist nemlich  $12,35 + 3,75 + 1,26 \times 2 = 18,82$ . Sonach müßte man annehmen, daß der Karpholith zusammengesetzt sey aus: 10 Verhältnissen Thonsilikat, 3 Verhältnissen Mangansilikat, 1 Verhältniß Eisenbisilikat und 8 Verhältnissen Wasser, und die Formel für ihn würde seyn:



Herr Professor v. Freysmuth sagt gelegentlich

seiner Analyse eines faserigen Mesoliths \*): „Statt die Zeolithe als Verbindungen anzusehen, in welchen die nächsten Bestandtheile lauter aus *sehr* *differen-* *ten* Körpern bestehende, gleichsam *neutrale* *secun-* *däre* Verbindungen (Silikate, allenfalls auch Hydrate) sind: scheint man vielmehr annehmen zu müssen, daß das Thonsilikat (dessen Bestandtheile bekanntlich in geringerem Gegensatz stehen) *als solches*, und nachdem alle Kieselerde *ihm* zugetheilt worden, die Funktion des elektrisch-negativen oder sauren (Bestandtheils übernehme, und sich nun als Säure besonderer Art mit einer einfachen (Kalk oder Natron-) oder einer zusammengesetzten (Kalk und Natron-) Base vereinige, allenfalls noch in die Verbindung (Krystall-) Wasser aufnehmend.“

Wollte man diese Ansicht auf den Karpholith anwenden, so würde der Oxygehalt des sauren Bestandtheils (des Thonsilikats) 31,24 betragen, also ein Geringes mehr als das Sechsfache der beiden basischen Oxyde (5,01), und der des Wassers (10,03) das Doppelte von ihnen; und die Formel in der von *Freyssmuth* vorgeschlagenen Art ausgedrückt wäre:



Die Oxygenmenge der zwei basischen Oxyde, welche durch die Analyse erhalten worden, ist etwas geringer als  $\frac{1}{2}$ , und eben so die des Wassers geringer als  $\frac{1}{3}$  von der des Kiesels und Thons zusammen ge-

---

\*) Chemische Untersuchung eines faserigen Mesolithes von Dr. Jos. von Freyssmuth. Für die Abhandlungen der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag, 1818.

nommen. In Betreff des Wassergehalts ist jedoch zu bemerken, daß dieser nicht ohne Grund ein wenig grösser angenommen werden könnte, als ihn der Glühungs-Verlust anzeigt. Der Umstand, daß die gelbliche Farbe des Fossils in Braun umgeändert wird, deutet offenbar auf eine höhere Oxydation des Mangans und Eisens. Ist aber eine solche eingetreten, so muß eben deshalb der durch das entwichene Wasser entstandene Verlust (der Wasser-Gehalt) zu gering befunden werden; und es möchte daher diesem Umstande zum Theil zuzuschreiben seyn, daß bei der Sorgfalt, mit welcher die Analyse angestellt worden, sich nach Reduktion der erhaltenen Oxyde auf Protoxyde der nicht unbeträchtliche Verlust von 1, 9 auf 100 ergibt. Da sich aber dieser mögliche Irrthum mit Sicherheit nicht berichtigen läßt, so habe ich eine solche Berichtigung unterlassen, und an dem wirklich erhaltenen Resultate nichts verändert.

Uebrigens gehet aus vorstehender Untersuchung hervor: daß der Karpholith als eine eigene Gattung betrachtet werden müsse; da er in Hinsicht auf Qualität und Quantität seiner Bestandtheile mit keiner bekannten Fossilien-Gattung übereinkommt.

Ob er die ihm in *Werners* Systeme angewiesene Stelle zu behalten habe, wäre deshalb zu bezweifeln, weil in ihm ein Talkgehalt gänzlich fehlet, der allerdings erforderlich scheinen möchte bei Fossilien, welche einmal die Aufschrift Talkgeschlecht in einem Systeme tragen, dessen Hauptabtheilungen auf chemische Differenz der Bestandtheile gegründet sind. Allein von dem fehlenden Talk abgesehen, könnte man in Ansehung des beträchtlichen Mangan- und Eisengehalts und der äußern Charakteristik geneigt seyn, ihn



in die Nähe des *Byssoliths* (*Häuy's Amianthoide*) zu stellen, womit er aber in Hinsicht des chemischen Verhältnisses der Bestandtheile keineswegs übereinstimmt. Hr. *Breithaupt* will den Karpholith hauptsächlich wegen seiner Farbe, der leichten Zerspringbarkeit und des größern specifischen Gewichts von den Zeolithen ausgeschlossen wissen. Dieses allerdings mit Recht, wenn bloß die *Gattung* Zeolith gemeint ist. Wäre aber hier die ganze *Werner'sche Sippschaft* des Zeoliths gemeint, so möchten die angeführten Gegen Gründe kein Hinderniß seyn, indem unter der Sippschaft des Zeolithes Fossilien von verschiedenen Farben, Härtegraden und specifischen Gewichten vorkommen, wie denn, um ein Beispiel anzuführen, der Prehnit ein dem des Karpholiths sehr nahe kommendes specifisches Gewicht (2,9) besitzt. Auch von Seite der chemischen Composition (wenn nicht lediglich auf Qualität gesehen wird) möchte nicht viel Einspruch gegen die Einreihung zu den Zeolithen gemacht werden können. Die Fossilien der *Sippschaft Zeolith* sind insgesamt Zusammensetzungen aus vorwaltendem Thonsilikat mit 1, 2 oder 3 andern Silikaten, oder einem und dem andern Bisilikat, und Wasser. Die neben dem Thon vorhandenen basischen Oxyde sind: Kali, Natron, Kalk, Baryt, Eisenoxyd, und von diesen bald 1, bald 2, bald 3 vorhanden, so zwar, daß das eine das andere fehlende zu ersetzen scheint, wie die Untersuchungen von *Gehlen*, *Fuchs* und von *Frey-smuth* dargethan haben. Nach *Klaproth's* Analyse besteht der blättrige Prehnit aus Kiesel-erde, Thonerde, Kalk, Eisenoxyd und Wasser in einem solchen Verhältnisse, daß *Berzelius* \*) daraus die

\*) *Schweiggers Journ. f. Chem. u. Phys.* B, XII, S. 59.

Formel  $9 AS + 3 CS + FS + Aq$  ableitet, und nach *Laugier's* Analyse der fasrige aus denselben Bestandtheilen in dem Verhältnifs:

$15 AS + 6 CS + FS + 2 Aq$ ; wir haben oben für den Harpholith die Formel gefunden:

$10 AS + 3 MS + FS^2 + 8 Aq$ ; mithin ein Verhältnifs, welches, wenn man annimmt, dafs bei dem Harpholith das Manganoxyd an die Stelle des Kalks getreten ist, nicht viel mehr von dem des Prehnits abweicht, als die Prehnite selbst untereinander. Man könnte es daher in *dieser Hinsicht* gar wohl rechtfertigen, wenn man den Harpholith in die *Sippschaft* oder *Familie des Zeoliths* einreihete.

Chemische Untersuchung  
eines  
fasrigen Mesolithes  
(Werner's Faserzeolith),

von Hauenstein in Böhmen.

Von

Dr. Joseph von Freysmuth,

Professor der Chemie und Pharmacie an der Universität zu Prag.

(Geleitet in der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.)

Bei Hauenstein im Ellbogner Kreise hat Herr Dr. Zelenka einen ausgezeichnet schönen Faserzeolith (den auch noch der verstorbene *Werner* als solchen erklärte) in dem dortigen Klingstein aufgefunden, und die Gefälligkeit gehabt, mir davon zur chemischen Untersuchung mitzuthemen.

Hinsichtlich der äußern Beschaffenheit kommt dieser Faserzeolith ganz mit *Werner's* Faserzeolith (*Hofmann's* Mineralogie II. S. 233) überein; zu Salzsäure und Kleesäure, so wie vor dem Löthrohre verhält er sich genau so, wie jene Zeolithgattung, welche

Hr. Prof. *Fuchs* (*Schweigger's Journ. d. Chem.* XVIII. 17) mit der Benennung „*Mesolith*“ bezeichnet; hingegen weicht er von letzterem hinsichtlich der *Dichtigkeit*, wie sie Hr. Prof. *Fuchs* angiebt, bedeutend ab. Die des böhmischen Mesolithes fand ich nemlich bei der Temperatur von  $+ 17^{\circ} 5 \text{ C}$ , und bei dem Barometerstande von 0,758, anstatt 2,65 nur = 2,535 \*). Ich halte es daher nicht für überflüssig, mit einigen Worten das Verfahren anzugeben, welches ich bei Bestimmung der Dichtigkeit dieses Wasser einsaugenden Fossils befolgt habe.

Das Fossil wurde in kleinen Bruchstücken in ein Fläschchen von bekanntem Wassergehalte gebracht, mit Wasser übergossen, so unter die Glocke der Luftpumpe gestellt, und nun die Luft so lang ausgepumpt, als sich noch Bläschen entwickelten. Jetzt erst wurde das Fläschchen vollkommen mit Wasser angefüllt, das Ganze auf einer sehr feinen Wage gewogen, und das spezifische Gewicht auf übrigens bekannte Weise berechnet. Die Menge des angewendeten Mesolithes betrug zehn Grammen. Stellte ich den Versuch ohne Anwendung der Luftpumpe an, so fand ich das Eigengewicht noch geringer, nämlich nur 2,284.

#### Z e r l e g u n g.

3. Acht Grammen Mesolith von Hauenstein wur-

---

\*) Sollte die Angabe des spezifischen Gewichtes in der Abhandlung des Herrn Prof. *Fuchs* (a. a. O.) nicht etwa durch einen Druckfehler zu groß seyn, und statt 2,65 etwa 2,263 stehen müssen? Diese Vermuthung wird durch Vergleichung der Dichtigkeitsangaben der Zeolithe in *Hofmann's Mineralogie* (II, 243) sehr wahrscheinlich.

den in kleinen Stücken im Platintiegel durch eine halbe Stunde roth geglüht. Das Fossil blähte sich hierbei kaum merklich auf, vielmehr sinterten die Absonderungsstücke etwas zusammen, ohne sich jedoch zu krümmen. Die Stückchen erschienen oberflächlich etwas geflossen, waren sehr hart und blendend weiß. Der Gewichtsverlust betrug 1,13 Grammen, also auf 100 Theile 14,125.

Etwas von dem geglühten Fossile fein gepulvert in Salzsäure eingetragen, bildete zwar nicht in der Zeit von wenig Minuten eine Gallerte, wie dies bei dem ungeglühten Fossile Statt findet; doch blieb derselbe Erfolg bei längerer Einwirkung beider Stoffe nicht aus.

2. Andere acht Grammen zum ziemlich feinen, schneeweißen Pulver zerrieben, wurden mit mäsig starker Salzsäure übergossen. Schon in wenig Minuten war alles zu einer durchsichtigen, etwas wenig gelblich gefärbten Gallerte aufgelöst. Diese wurde bei sehr mäsig warmer Wärme zur Trockne verdunstet; die grobpulverige weiße Masse mit Wasser, dem ein wenig Salzsäure zugesetzt war, aufgeweicht; das Ganze, wegen vollständigerer Abscheidung der Kieselerde, abermal zur Trockne verdunstet, mit angesäuertem Wasser aufgeweicht, und nun erst das Unauflösliche durchs Filter geschieden, und wohl ausgewaschen.

A. Die erhaltene wässerige Auflösung war wasserklar und wurde in einem zu verstopfenden Gefäße mit reinem Ammoniak gefällt, welches einen häufigen weißen Niederschlag bewirkte.

a. Die abfiltrirte Flüssigkeit wurde sammt den Waschwassern bis auf eine angemessene Menge gelinde verdunstet, und nun kochend mit koh-

*lensäurem Ammoniak* gefällt, wobei abermal ein weißer Niederschlag erschien.

α. Die von letzterm rückständige Flüssigkeit wurde bei mäßiger Wärme zur Trockne verdunstet; die erhaltene Salzmasse im Platintiegel zur Verjagung des entstandenen Salmiaks anfangs mäßig, dann bis zum Glühen erhitzt; der Rückstand im Wasser gelöst, und durch Filtriren von einer unbestimmbaren Menge eines unlöslichen, dem Ansehen nach in Eisenoxydhydrat bestehenden Körpers, befreit. Die Flüssigkeit, in einem Schälchen bei gelinder Wärme verdunstet, schoß bis auf den letzten Tropfen zu hohlen, vierseitigen, treppenartigen Pyramiden an, welche, im bedeckten Silbertiegelchen verknistert, dann stark gegläht, 1,15 Grammen am Gewichte betrogen; in wenig Wasser gelöst, in einer gesättigten Platinlösung keine Fällung verursachten, und also salzsaures Natron waren. Dieser Menge salzsauren Natrons entsprechen 0,6151 Grammen, oder auf 100 Theile Fossil, 7,688 reines Natron.

β. Der bei a durch Fällung mit kohlensäurem Ammoniak erhaltene Niederschlag wurde mit verdünnter Salzsäure behandelt, worin er sich mit Zurücklassung eines geringen Rückstandes, welcher dem bei 2. erhaltenen beigefügt wurde, leicht und unter Aufbrausen auflöste. Die erhaltene Auflösung mit etwas Ammoniak und Alkohol versetzt, und mit *Schwefelsäure* gefällt: lieferte eine Menge Gyps, welche nach heftigem Glühen im Platintiegel 1,366 Grammen

betrug, wofür 0,567 Grammen, oder auf 100 Theile Fossil 7,087 reiner Kalk in Rechnung gebracht werden müssen.

b. Der bei A durch Fällung mit Ammoniak erhaltene Niederschlag, noch feucht in mäßig starker Salzsäure aufgelöst, hinterließ einen geringen Rückstand, welcher ebenfalls dem ersten, bei 2 erhaltenen, beigegeben wurde. Die salzsaure Auflösung, durch kohlensaures Ammoniak heils gefällt, gab einen Niederschlag, der sich in heisser Kalilösung bis auf eine nicht zu sammelnde Menge Eisenoxyd auflöste, und aus der Auflösung durch Salmiak gefällt, dann gewaschen und gegläht, 2,205 Grammen reiner Thonerde darstellte. In 100 Theilen Mesolith wären demnach 27,562 Thonerde enthalten.

B. Der bei 2. erhaltene unauflösliche Rückstand betrug nach Beifügung der bei  $\beta$  und b erhaltenen, gegläht, 3,565 Grammen, und verhielt sich als reine Kieselerde. 100 Theile Mesolith würden daher 44,562 dieses Körpers enthalten.

Nach den erzählten Versuchen ist also die Zusammensetzung des faserigen Mesoliths von Hauenstein folgende:

|                        |   |   |   |   |               |
|------------------------|---|---|---|---|---------------|
| Kieselerde             | - | - | - | - | 44,562        |
| Thonerde               | - | - | - | - | 27,562        |
| Kalk                   | - | - | - | - | 7,087         |
| Natron                 | - | - | - | - | 7,688         |
| Wasser als Glühverlust | - | - | - | - | 14,125        |
| Eisenoxyd              | - | - | - | - | eine Spur     |
|                        |   |   |   |   | <hr/> 101,024 |

Vergleicht man das Ergebnifs dieser Analyse mit dem der Untersuchungen der Herren *Fuchs* und *Gehlen*: so mufs das böhmische Fossil wohl jener Zeolithgattung beigezählt werden, welche diese Gelehrten *Mesolith* nennen, und im Systeme zwischen Natrolith und Skolezit stellen. Eine strengere Vergleichung würde indessen, wenn man bei Anordnung der Fossilien *blos* nach chemischen Grundsätzen verfahren wollte, dazu führen: das böhmische Fossil als *besondere Art* dieser Gattung anzusehen, welche von dem Natrolith der Herren *Fuchs* und *Gehlen* zu ihrem *Mesolith* den unmittelbaren Uebergang bildet, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

|            | Natrolith | böhmischer<br>Mesolith | Mesolith<br>v. <i>Fuchs</i><br>u. <i>Gehlen</i> | Skolezit |
|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Hieselerde | 48,0      | 44,6                   | 47,0                                            | 46,5     |
| Thonerde - | 26,5      | 27,6                   | 25,9                                            | 25,7     |
| Kalk - -   | —         | 7,1                    | 9,8                                             | 14,2     |
| Natron -   | 16,2      | 7,7                    | 5,1                                             | —        |
| Wasser -   | 9,3       | 14,0                   | 12,2                                            | 13,6     |

Man sieht, wie der Natrolith, indem er Kalk aufnimmt, und dagegen eine gewisse Menge Natron verliert, zum böhmischen Mesolith wird, wie dieser an Kalkgehalt zunehmend, während sich gleichzeitig der Natrongehalt noch mehr vermindert, durch den Mesolith der Herren *Fuchs* und *Gehlen*, endlich in Skolezit übergeht, wo der Natrongehalt ganz verschwunden und durch Kalk ersetzt ist.

Die Abweichung in der Kalk- und Natronmenge zwischen dem böhmischen und den andern bisher un-



versuchten Mesolithen ist zu bedeutend, als daß sie zufällig gehalten, oder etwa den unvermeidlichen Unvollkommenheiten analytischer Arbeiten zugeschrieben werden könnte. Ersteres auch wohl darum nicht, weil, wie sich leicht finden läßt, die Verhältnisse beider Bestandtheile mit den Gesetzen der bestimmten Mischungsverhältnisse sehr wohl stimmen; letzteres um so weniger, da selbst bei minderer Genauigkeit, bei der verschiedenartigen Beschaffenheit dieser Bestandtheile, nicht wohl gerade von dem einen proportional mehr, von dem andern proportional weniger gefunden werden konnte. Ueberdies hat eine wiederholte Untersuchung bis auf ein Minimum dieselben Resultate gegeben.

Gehen wir in die stöchiometrische Betrachtung der Zusammensetzung des Mesolithes ein, so ergeben sich nicht unwichtige Resultate. Betrachten wir zunächst den *Natron*- und *Kalk*gehalt des Mesolithes, so finden wir, daß in den früher untersuchten Mesolithen *zwei* Verhältnistheile *Kalk*, gegen *einen* Verhältnistheil *Natron* vorhanden sind. Im *böhmischen* Mesolith betragen beide Bestandtheile *gleiche* stöchiometrische Werthe, oder, um die Menge derselben mit der in den übrigen Mesolithen zu vergleichen, es sind im böhmischen Mesolith — alles Uebrige gleichgesetzt — *anderthalb* Verhältnistheile *Kalk* gegen *anderthalb* Verhältnistheile *Natron* zugegen. Berechnet man nämlich die Menge des Natrons aus der gefundenen Menge *Kalk* (1 Antheil *Kalk* = 35,5; 1 Antheil *Natron* = 39,1), so ergibt sich die Menge des *Natrons*,

$35,5 : 7,087 \doteq 39,1 : 7,8$  statt 7,69 wie die Untersuchung gab. Berechnet man umgekehrt die Menge des *Kalkes* aus der gefundenen *Natronmenge*, so fin-

## F r e y l s m u t h

9,1 : 7,688 = 35,5 - 6,98 statt 7,087, dem  
aufgefundenen \*).

Es ergibt sich daraus, daß die Sättigungswerthe der im böhmischen Mesolith vorkommenden Mengen Kalk und Natron, beide *zusammengenommen*, vollkommen gleich sind den Sättigungswerthen des Kalks und Natrons *zusammengenommen* in den übrigen bisher untersuchten Mesolithen, so abweichend auch das Verhältniß dieser beiden Bestandtheile *unter sich* ist. Es ergibt sich daraus ferner, daß die Sättigungswerthe (des Kalkes und Natrons *zusammengenommen* in beiderlei Mesolithen gerade so viel gegen die anderweitigen Bestandtheile betragen, als das *Natron einzeln* im Natrolith, und der *Kalk einzeln* im Skolezit. Es ist nemlich 7,688 Natron + 7,087 Kalk, ein Äquivalent für 16,2 Natron im Natrolith, und für 14,2 Kalk im Skolezit \*\*). Es möchte daher auch die An-

\*) In der That habe ich die Menge des Kalkes bei zwei andern Analysen um ein Geringes kleiner gefunden, als in der erzählten; es könnte daher bei dieser wohl vielleicht etwas Wasser bei dem Ausglühen des Gypses zurückgeblieben seyn. Demungeachtet habe ich an dem Ergebnisse der angeführten Analyse nichts ändern wollen, weil diese bis zu Ende ohne den geringsten Unfall durchgeführt worden ist, was bei den übrigen nicht der Fall war.

\*\*\*) In der Berechnung der gegenseitigen Sättigungswerthe der Bestandtheile in den drei genannten Fossilien, nach dem Sauerstoffgehalte der Bestandtheile, ist Hr. P. Fuchs nicht durchaus auf gleiche Weise verfahren. Während er nämlich beim Natrolith den Natrongehalt, und beim Skolezit den Kalkgehalt = 1 setzt, gegen 6 Antheile Kieselerde

nahme des Herrn Prof. *Fuchs*, daß das Natron und der Kalk vicariirende Bestandtheile seyen, mehr Beachtung verdienen, als ihr Herr *Fuchs* selbst zugestehen will; ja diese Annahme wird eben durch die Analyse des böhmischen Mesolithes beinahe zur Gewißheit. Der verschiedene Wassergehalt des Kalkes und Natrons, welchen Herr *Fuchs* als Einwurf gegen diese Annahme aufstellt, scheint kein Moment von solcher Wichtigkeit zu seyn, da wir ja über die Constitution dieser Fossilien noch nicht soweit im Reinen sind, um entscheidend aussagen zu können, ob das vorfindige Wasser dem Thonsilikate, oder dem Kalk und Natron, oder am Ende wohl gar der (ternären) Verbindung des Thonsilikates mit einer Base angehöre.

Herr Prof. *Fuchs* findet in dem Umstande, daß der Wassergehalt sich nach der Menge des Kalkes und Natrons richtet, einen vorzüglichen Beleg für die Ansicht: der Wassergehalt gehöre eigentlich dem Kalk und Natron an. Wirklich möchte sich auch gegen die Triftigkeit dieses Beweises wenig einwenden

---


und 3 Antheile Thonerde; nimmt er, um Brüchen auszuweichen, an, daß in seinem Mesolith 2 Antheile Kalk und 1 Antheil Natron, mit 18 Antheilen Kieselerde und 9 Antheilen Thonerde verbunden seyen. Diese verschiedenen Ausdrücke gleicher Verhältnisse hindern für den ersten Anblick die Vergleichung dieser so nahe verwandten und unmittelbar in einander übergehenden Fossilien; und man muß deshalb erst — wie Herr *Fuchs* später bei Aufstellung der Formeln selbst thut — eine Reduction vornehmen, durch Division der Bestandtheile des Mesolithes mit 5.

lassen. Um so mehr fällt es mir aber auf, daß der Wassergehalt des böhmischen Mesolithes sich dieser Regel nicht fügt. Nach ihr müßten in 100 Theilen des letztern für den Kalk (diesen im Zustande des Trihydrates angenommen) 6,74; für das Natron (als Bihydrat) 4,45, zusammen also 11,17 Theile Wasser zugegen seyn, statt 14,125, welche ich bei wiederholten Versuchen gefunden habe, und welches, wie beim Skolezit, einer Menge von *drei* Aequivalenten Wasser, gegen *ein* Aequivalent Base (diese sey nun Kalk, oder aus Kalk und Natron zusammengesetzt), entspricht.

In die kleinen Abweichungen des Kiesel- und Thonerdegehaltes, wie ich ihn in-dem böhmischen Mesolithe, verglichen mit den übrigen Mesolithen, gefunden habe, glaube ich nicht eingehen zu müssen; sondern will mir darüber nur eine Bemerkung erlauben. Sowohl aus den vier von den Herren *Fuchs* und *Gehlen* angestellten Analysen, als aus der meinigen, ist ersichtlich: daß bei größerm Kieselgehalte, der Thongehalt abnimmt; und umgekehrt, wie der Thongehalt zunimmt, die Menge der Kieselerde sich in dem Maße verringert, daß die *Summe* der Sättigungswerthe beider immer dieselbe bleibt, und also auch hier das eine als das Complement des andern aufzutreten scheint. Dies fällt freilich hier, bei geringerer Abweichung, weniger auf, als bei dem Kalk und Natron; wird aber wirklich merkwürdig bestätigt, durch Betrachtung früherer Zeolithanalysen, wo die Verhältnisse zwischen Thon- und Kieselerde viel größere Abweichungen darbieten. In dieser Ansicht bin ich vorzüglich durch die Analyse eines *stark verwitterten* Mesolithes von Hauenstein (die indessen noch der Wiederholung, womit ich mich eben beschäftige, bedarf)

bestärkt worden; indem ich hier den Kieselgehalt *stark vermindert*, den Thongehalt *stark vermehrt* angetroffen habe, ohne daß jedoch die *Summe der Sättigungswerthe* beider Bestandtheile sich bei Vergleichung mit frischem Mesolith verschieden gezeigt hätte; — ein Umstand, der beiläufig auch für die von Mehrern angenommene Umwandlung der Kieselerde in Thonerde zu sprechen scheint.

Drückt man die Bestandtheilverhältnisse des Natrolithes, der beiden Mesolithen und des Skolezites (alle *vor Fuchs* und *Gehlen* untersuchten nicht beachtend) in den Buchstabenformeln, wie sie *Berzelius* leichterem Vergleichung wegen in die Mineralogie eingeführt hat, aus; die basischen Bestandtheile Kalk und Natron nicht als Hydrate, sondern als Silikate annehmend: so erhält man folgende Schemen:



Berücksichtigt man jedoch die unlängbare wechselseitige Veränderlichkeit des Kalk- und Natrongehaltes; und, wenn man die frühern Zeolithanalysen, so wie meine noch nicht vollständig bestätigte, des verwitterten Mesolithes, geltend machen will, auch die gegenseitige Veränderlichkeit des Kiesel- und Thonerdegehaltes: so möchte man wirklich versucht werden, die Constitution der drei erwähnten Zeolithgattungen ganz anders, auf eine bisher in der Mineralogie freilich nicht übliche Weise — die deshalb aber wohl nicht für ungereimt zu erklären seyn möchte — anzusehen.

Statt die Zeolithe als Verbindungen anzusehen, in welchen die nächsten Bestandtheile lauter aus zwei *sehr differenten* Körpern bestehende, gleichsam *neutrale* secundäre Verbindungen (Silikate, allenfalls auch Hydrate) sind: scheint man vielmehr annehmen zu müssen, daß das Thonsilikat (dessen Bestandtheile bekanntlich in geringem Gegensatze stehen) *als solches*, und nachdem alle Kieselerde *ihm* zugetheilt worden, die Function des elektrisch-negativen oder sauren Bestandtheils übernehme, und sich nun als Säure besonderer Art mit einer einfachen (Kalk oder Natron), oder einer zusammengesetzten (Kalk und Natron) Base vereinige, allenfalls noch in die Verbindung (Kristall-) Wasser aufnehmend.

Der saure Bestandtheil (also das Thonsilikat) kann nun eben so gut, wie der basische im Mesolith, in seiner Zusammensetzung (also den entfernten Bestandtheilen des Zeoliths) hinsichtlich des quantitativen Verhältnisses variiren, wenn nur die *Summe* der Sättigungswerthe keine Aenderung erleidet, und also für den sauren Bestandtheil *neun*; für den basischen *einem* Oxygenwerthe entsprechen muß. Nach dieser Ansicht würden sich die Formeln für die genannten Zeolithe in folgende verwandeln:

für den *Natrolith*  $9\left(\frac{+A}{+}S\right) + N + 2\text{Aq.}$

*Mesolith*  $9\left(\frac{+A}{+}S\right) + \left(\frac{+N}{+}C\right) + 3\text{Aq.}$

*Skolezit*  $9\left(\frac{+A}{+}S\right) + C + 3\text{Aq.}$

Ob übrigens die Bestandtheilverhältnisse der nächsten Bestandtheile auch den Gesetzen der bestimmten Mischungen folgen oder nicht: möchte vor der Hand um so eher unentschieden gelassen werden dürfen, da die ganze Ansicht, so wie alle unsre Ansichten über

die Constitution mehrfach gemischter Körper, bisher keinen Anspruch auf objective Gültigkeit machen kann, und von der verschiedenen Vorstellungsart eines Jeden abhängt. Eben deshalb habe ich aber auch um so weniger Anstand genommen, meine Ansicht mitzutheilen, da sie vielleicht doch zur Erklärung einiger Anomalien in der Zusammensetzung der Mineralien führen kann.

Aus allem bisher Gesagten möchte ich aber auch nicht dafür stimmen, den böhmischen Mesolith, ungeachtet einiger Abweichung in den Verhältnissen, von dem der Herren *Fuchs* und *Gehlen* *specifisch* zu unterscheiden; was übrigens, wenn man es thun wollte, durch die Beiwörter „*natrolithartiger*“ und „*skolezitartiger*“ passend bezeichnet werden könnte.

Ist der geschmolzene salzsaure Baryt  
ein Chlorid oder ein salzsaures  
Salz ?

Vom

Dr. P l e i s c h l in Prag.

Die Arbeiten *Davy's*, *Gay-Lussac's* und *Thenard's* begründeten eine neue Ansicht über die Natur der oxydirten Salzsäure und der salzsauren Salze. Die meisten Chemiker sehen nun das Chlorin (oxydirte Salzsäure) als einfach und den größten Theil \*) der salzsauren Salze als primäre Verbindungen aus Chlorin und einem Metalle bestehend an; doch fehlte es nie an Gegnern, welche die ältere Ansicht als die wahrscheinlichere und begründetere mit triftigen Beweisen vertheidigten, an ihrer Spitze steht *Berzelius* \*\*),

---

\*) Denn manche sind wahre hydrochlorinsäure Salze, wie z. B. hydrochlorinsäure Magnesia.

\*\*\*) *Gilbert's Annalen der Phys.*, B. 50.



*Murray, Hildebrandt, Rudolfs, Lampadius* und *Ure* stellten mehrere Versuche an, welche die Gegenwart von Oxygen in dem Chlorin beweisen sollten; aber ihre Versuche würden von den Vertheidigern der neuen Ansicht wiederholt und Resultate erhalten, welche dieser neuen Ansicht ganz das Wort sprechen. So z. B. (um nur die letzteren anzuführen) folgerte *Dr. Ure* \*) aus seinen Versuchen, daß Wasser ein wesentlicher Bestandtheil des salzsauren Gases sey; denn er erhielt; als er salzsaures Gas durch Glasröhren, in welchen Eisen oder andere Metalle sich befanden, streichen liefs, *Wasser*, und das Metall ward in ein Muriat verwandelt.

*Humphry Davy* bewies aber, daß die Wasserbildung aus der Verbindung des Hydrogens des salzsauren Gases mit dem Oxygen ganz zufällig sey, und daß das Oxygen aus dem Alkali und dem Bleioxyde des Glases, so wie aus der atmosphärischen Luft, welche noch immer in dem Apparate vorhanden ist, herühre; denn je mehr man diese Quellen des Oxygens vermeidet, um so geringer ist nach *Davy* die Wasserbildung.

*Hr. A. Vogel* \*\*) in München las in der k. Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung über die zusammengesetzte Natur der salzsauren Salze. Er fand durch mehrere und wiederholte Versuche, daß geschmolzenes Hornsilber, geschmolzenes salzsaures Zinn, Mangan, und geschmolzener salzsaurer Baryt durch

---

) Annal. d. Chim. et d. Phys. T. VII. Fev, 1818, p. 217.

\*\*) *Gilbert's Annal, d. Phys.* Neueste F. 1819, St. 1. S. 45 u. ff.

geschmolzene Phosphorsäure in der Glühhitze zersetzt werden, wobei er die Entwicklung von Salzsäure beobachtete. Denselben Erfolg sah er, wenn statt der Phosphorsäure die eben genannten Körper mit glasi- gem, saurem phosphorsaurem Kalk glühend zusam- mengebracht wurden. Er glaubt, da *H. Davy* seine Hypothese der Chlorinmetalle größtentheils auf die Unmöglichkeit gegründet hat, die Chlorinverbindun- gen durch verglaste Phosphorsäure zu zerlegen, so dürfte eine andere Ansicht über die zusammengesetzte Natur dieser Verbindungen anzunehmen seyn.

Hr. *Fogel* sagt, zum Schlusse seiner Abhand- lung: „Die vom Hrn. *Dulong* angekündigte Thatsache, daß die stark geglühte Phosphorsäure eine Quantität Wasser enthält und zwar so viel, daß der Sauerstoff desselben ein Drittel des in der Säure befindlichen Sauerstoffs beträgt, wird bei der Erklärung nicht ohne Nutzen seyn: nur muß ich bemerken, daß hiebei eine Täuschung zum Grunde liegen kann, weil sich die Phosphorsäure in einer hohen Temperatur verflüchtigt“ \*).

Die Erfolge dieser Versuche von einem so au- gezeichneten Chemiker machten mich in meiner An- sicht der Dinge schwanken, und ich beschloß zu mei- ner subjectiven Ueberzeugung einige Versuche anzu- stellen, welche ich hier öffentlich mitzutheilen wage.

---

\*) Die Feuchtigkeit der Phosphorsäure bei der Weißglüh- hitze bestätigt auch *Davy* durch seine neuesten Arbeiten, *The philosophical Magazine etc.* Dec. 1818, wovon ein Auszug in den *Annal. d. Chim. et d. Phys.* Tom. X, p. 218.

Die Thatsache von *Dulong* \*) läßt freilich noch immer eine andere Erklärung zu, und bietet den Vertheidigern der Hypothese, daß die geschmolzenen salzsauren Salze keine secundären Verbindungen, keine Salze, sondern primäre Verbindungen aus zwei Einfachen (Unzersetzten) nämlich Chlorin und dem Metalle bestehend seyen, einen erwünschten Ausweg dar, indem sie sagen können, die Salzsäure habe sich aus dem Chlorin (des Silberchlorides \*\*) z. B. und dem Hydrogen des Wassers, welches in der Phosphorsäure enthalten sey, erst während des Versuches gebildet.

Ich hoffte, dieser Einwurf sollte dadurch entkräftet werden, wenn stöchiometrisch gezeigt würde, daß in der, aus dem zum Versuche angewandten Chloride durch die wasserhaltige Phosphorsäure erhaltenen Salzsäure, nach dem angenommenen Bestandtheilverhältniß von Chlorin und Hydrogen in derselben, eine viel größere Menge Hydrogen vorhanden sey, als das in der glasigen Phosphorsäure enthaltene Wasser liefern konnte, d. h. wenn gezeigt würde, daß die aus dem [zum Versuche angewandten Körper erhaltene Menge Salzsäure so beträchtlich sey, daß das in der Phosphorsäure enthaltene Wasser zu ihrer Bildung durchaus nicht hinreiche, die Salzsäure daher als solche mit einer Base zu einer wahren secundären Ver-

---

\*) *Annal. d. Chim. et d. Phys.* T. II. p. 141 sqq.

\*\*) Ich glaube anstatt Chlorinsilber, Silberchlorid sagen und schreiben zu sollen, weil man nicht Oxygensilber, sondern Silberoxyd zu sagen beliebt hat, und der Consequenz wegen also auch Merkurchlorid, Kalinchlorid u. s. w. wie Merkuroxyd; Kalinoxyd sagen sollte.

bindung vereinigt in dem untersuchten Körper bereits vorhanden war, und nicht erst während des Versuches gebildet werden konnte.

Nach [Dulong \*)] beträgt der Wassergehalt der glasigen Phosphorsäure so viel, daß die Oxygenmenge des Wassers dem dritten Theile der Oxygenmenge der Säure gleich ist. Nach den neuesten Versuchen von Berzelius \*\*) besteht die Phosphorsäure aus 44,05 Phosphor und aus 55,95 Oxygen, mit diesem Bestandtheilverhältniß stimmt das von Dulong angegebene sehr nahe überein; denn er fand in 100 Theilen Phosphorsäure 44,48 Phosphor und 55,52 Oxygen. Legt man das Berzeliussche Verhältniß zum Grunde, so betrüge die Oxygenmenge im Wasser der Phosphorsäure 18,65. Dieses Oxygen erfordert aber, um Wasser zu bilden, 2,3512 Hydrogen, beide verbunden geben 20,38 Wasser \*\*\*).

Nach der Ansicht von Davy \*\*\*\*) besteht das salzsaure Gas aus einem Verhältnißtheil (Antheil = 1,25) Hydrogen, und aus einem Antheile Chlorin = 44 (oder aus gleichen Volumtheilen von beiden), daher würden 2,351 Hydrogen, welche im Wasser der Phosphorsäure vorhanden sind, 82,052 Chlorin erfordern, um 84,583 salzsaures Gas zu bilden. Fände sich nun durch directe Versuche eine bedeutend größere

---

\*) am angeführten Orte.

\*\*) Annal. d. Chim. et Phys. T. II. p. 222.

\*\*\*) Nach Dulong sind in 100 Theilen trockener Phosphorsäure 20,6 Wasser enthalten.

\*\*\*\*) Elemente des chemischen Theiles der Naturwissenschaften. Uebersetzung v. Wolf, 1, Bd. 1 Abtheil. S. 225.

Menge salzsaures Gas, so wäre dies ein offener Beweis, daß die Salzsäure aus dem angewandten Silber-, Mangan-, Zinn-, Barytchlorin durch die Phosphorsäure entwickelt worden wäre, und diese Verbindungen müßten dann als salzsaure Salze angesehen werden.

Doch ist auf diesem Wege zu keinem ganz sicheren Resultate zu gelangen, weil wir die Zusammensetzung der Phosphorsäure noch nicht ganz mit Gewißheit kennen. So fand *Davy* \*) bei seinen neuesten Untersuchungen ein von dem *Dulong* und *Berzelius* ziemlich weit abweichendes Verhältniß der Oxygenmenge in der Phosphorsäure; ja beinahe Jeder, welcher über die Zusammensetzung der Phosphorsäure arbeitete, fand ein anderes Bestandtheilverhältniß, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

|          | <i>Thomson</i> | <i>Dulong</i> | <i>Berzelius</i> | <i>Davy</i> |
|----------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Phosphor | 100            | 100           | 100              | 100         |
| Oxygen   | 121,28         | 124,8         | 127,04           | 134,5       |

Um dem Wassergehalte der Phosphorsäure, welche durch Oxydation des Phosphors mittelst der Salpetersäure bereitet wird, auszuweichen, wollte ich eine wasserlose Phosphorsäure durch Ausglühen des phosphorsauren Ammoniaks bereiten; ich mußte jedoch auch diesen Gedanken wieder aufgeben, weil nach den Versuchen von *Dulong* \*\*) die auf diese

---

\*) Im Auszuge in den *Annal. d. Chim. et d. Phys.* T. X. p. 207.

\*\*) *Traité de chimie élémentaire* p. *Thenard* T. I, p. 570. II. edit. Sollte es wohl eine Verwechslung seyn mit dem Wassergehalt der Phosphorsäure? Denn in dem Auszug

Weise bereitete Phosphorsäure auch nach längerem Glühen noch immer etwas Ammoniak zurückhält, und daher immer wieder die Bildung der Salzsäure aus dem Hydrogen des Ammoniaks und dem Chlorin des angewandten Chlorides möglich wäre und erklärt werden konnte.

Um allen diesen Einwürfen zu entgehen, und mir eine subjective Ueberzeugung zu verschaffen, ob geschmolzenes Hornsilber, geschmolzener salzsaurer Baryt und Kalk u. s. w. Chloride oder salzsaure Salze sind, wandte ich ganz wasserlose Borasäure \*) an, welche mir hiezu am geeignetesten zu seyn schien, und welche auch schon vom *Gay-Lussac* und *Thenard* zu gleichem Zwecke angewandt wurde.

Da es unter meinen Verhältnissen durchaus nicht möglich war, mir ein Platinrohr zu diesen Versuchen zu verschaffen, so konnte ich auch reine, ganz entscheidende Versuche hierüber nicht anstellen, die Geräthe, welche mir zu Gebote standen, waren ein Platintiegel und ein Platinlöffelchen.

Die zu den Versuchen verwandte Borasäure war aus Borax (borasaurem Natron) durch Salzsäure gefällt, und in dem Platintiegel ausgeglüht worden, das erhaltene Borasäureglas wurde im destillirten Wasser gelöst und krystallisirt. Von diesem schneeweissen

---

aus *Dulong's* Arbeit a. a. O. steht nichts von Ammoniakgehalt und das Original *Mémoires d'Arcueil* T. III. steht mir nicht zu Gebot.

\*) Ich ziehe vor im Sprechen und Schreiben statt der so übel klingenden Boraxsäure, Borasäure oder Borinsäure zu gebrauchen.

Borasäurehydrat wurde allmählig in kleinen Portionen auf dem Platinlöffelchen so viel geschmolzen, bis das Löffelchen vom hellen wasserklaren Borasäureglas angefüllt war.

10 Grammen reiner, schön krystallisirter salzsaurer Baryt (genau gewogen) wurden in dem Platintiegel durch eine Stunde in der Weisglühhitze erhalten, noch heiß auf die Wage gebracht und genau tarirt, zeigte sich beim Auswägen der Tara ein Gewichtsverlust von 1,570 Grammen als Krystallwasser, daher sind in 100 Theilen krystallisirten salzsauren Baryts 15,70 Krystallwasser enthalten.

Ein anderer Versuch mit 5 Grammen auf dieselbe Weise angestellt, zeigte einen Gewichtsverlust von 0,782 Grammen, daher in 100 Theilen Krystallwasser = 15,64, welches mit dem Resultate Anderer ziemlich genau übereinstimmt; denn *Bergmann* und *Rose* fanden 16,5; *Kirwan* 15,06; *Buchholz* 16; *Berzelius* 14,799 Krystallisationswasser in 100 Theilen salzsauren Baryt.

Die Borasäure wurde nun durch eine Stunde in starker Glühhitze erhalten (der Platinlöffel glühte ganz weiß), am Ende floß sie ruhig ohne aufzuschäumen, in diesem ruhig fließenden Zustande wurde sie noch längere Zeit erhalten. Zu gleicher Zeit wurde der salzsaure Baryt im Platintiegel durch eine Stunde der Weisglühhitze ausgesetzt. In diesem Zustande wurde die Borasäure zu dem salzsauren Baryt gebracht, im Augenblicke des Zusammentreffens entstanden weißse Dämpfe, welche nicht im geringsten den erstickenden Geruch verbreiteten, welcher das Chlorin vor allen übrigen Gasarten auszeichnet, und der sich auch bei sehr geringen Mengen dieses Gases leicht bemerken läßt; doch rochen diese Dämpfe auch nicht nach

Salzsäure. Darüber gehaltenes blaues, und um es empfindlicher zu machen, befeuchtetes Lackmuspapier wurde etwas geröthet, um einen darüber gehaltenen Glasstab mit Aetzammoniak bildete sich ein weißer Beschlag, dieser wurde in eine verdünnte salpetersaure Silberlösung gebracht, worauf alsogleich ein käsiger flockiger Niederschlag erschien, welcher am Lichte violett wurde.

Herr v. *Steinmann*, Professor der allgemeinen und speciellen Chemie am technischen Institute zu Prag, hatte die Güte, meinen Versuch durchzusehen und mir zu raten, diesen Versuch zu wiederholen, und eine große Menge Borasäure mit wenig salzsaurem Baryt zusammenzubringen, und noch neuerdings zu glühen, was ich auch that und folgende Versuche anstellte.

Um die Natur der in dem obigen Versuche entwichenen Dämpfe näher kennen zu lernen, wurden 4 Grammen Borasäurehydrat in dem Platintiegel über einer Weingeistlampe bis zum Glas geschmolzen, hierbei entwichen Dämpfe, welche trockenes blaues Lackmuspapier rötheten (die Röthung verschwand nach einiger Zeit wieder), an darüber gehaltene trockene und mit Aetzammoniak befeuchtete Glasstäbe einen Beschlag bildeten, welcher sich als Borasäure zu erkennen gab.

Um mich noch mehr zu überzeugen, nahm ich wieder 4 Grammen Borasäurehydrat in den Platintiegel, setzte einen Helm darauf, legte eine kleine Vorlage vor und erhitzte sie langsam mit der Weingeistlampe. Es destillirte Wasser herüber, welches schwach sauer schmeckte und blaues Lackmuspapier stark röthete, nach 2 Tagen war das Lackmuspapier nur mehr



sehr schwach geröthet. Eben so verhielt sich eine Lösung von Borasäure; wahrscheinlich bleibt das Lackmuspapier nur so lange roth, so lange noch Wasser genug vorhanden ist, um die Borasäure gelöst zu erhalten; wie aber das Wasser allmählig verdampft, wird die Borasäure starr und wirkt nicht mehr auf das Lackmuspigment, daher das Verschwinden der Röthung. In dem Helme fand sich ein starres Sublimat, welches jedoch nicht gesammelt und für sich gewogen werden konnte. Der vorher tarirte Helm hatte getrocknet 0,10 Grammen am Gewichte zugenommen, welches auf 100 Theile gerechnet 2,5 Grammen beträgt, dieses als Borasäurehydrat angesehen, gäbe wasserlöse Borasäure 1,125. — Im Wasser gelöst zeigte es sich als Borasäure, mit salzsaurem Baryt entstand nur dann eine Trübung, wenn Ammoniak hinzugesetzt wurde, in welchem Falle durch die doppelte Wählziehung der borasäure Baryt erst entstehen konnte. Die in diesen und den vorigen Versuchen beobachteten Dämpfe waren daher nur Borasäure, nicht Salzsäure, wie ich anfangs zu glauben geneigt war. Freilich kann man hier fragen, warum in dem ersten Versuche sich die Borasäure nicht schon früher verflüchtigte, warum erst bei dem Zusammenkommen der Borasäure mit salzsaurem Baryt. Vielleicht war eine Spur von Wasser zugegen, vielleicht ist der Contact hinreichend, eine geringe Menge flüchtig zu machen. Alles diess ist möglich, ich weiß es jedoch nicht, und kann den Grund dieser Erscheinung nicht angeben, auch würde sie bei den späteren Versuchen ungeachtet alle Aufmerksamkeit auf sie gerichtet war, nicht mehr wahrgenommen.

Ich wolte zugleich sehen, wie viel denn eigent-

lich der Wassergehalt in dem Borasäurehydrat beiräuge; nach *Berzelius* \*) sind in 100 Theilen krystallisirter Borasäure 44 — 45 Theile Wasser enthalten, wovon die Hälfte Krystallwasser ist. Zu dem Ende wurden die obigen 4 Grammen Borasäurehydrat nun durch  $\frac{1}{2}$  Stunden in der Weißglühhitze erhalten; hierauf herausgenommen, noch heiß auf einer genauen Wage tarirt, und die Tara auf einer feinen genauen Mendelsohnschen Wage abgewogen, wobei sich ein Gewichtsverlust von 1,84 Grammen zeigte, daher blieben noch 2,16 Grammen wasserlose Borasäure. Dieser Versuch wurde zweimal wiederholt, und beidemal genau derselbe Verlust gefunden; 100 Theile krystallisirte Borasäure verlieren daher durch heftiges Ausglühen 46 Theile. Man könnte annehmen in 100 Theilen krystallisirter Borasäure seyen enthalten 54 Theile wasserlose Borasäure, verbunden mit 4 Antheilen Wasser ( $11,25 \times 4$ ) = 45, und 1 Borasäure wäre durch die entweichenden Wasserdämpfe mechanisch mit fortgerissen worden, wie es der vorige Versuch mit dem Helme zeigt.

Die in dem obigen Versuche erhaltenen 2,16 Grammen ganz wasserloser Borasäure wurden in dem Platintiegel neuerdings durch  $1\frac{1}{2}$  Stunden in der Weißglühhitze erhalten, in dem Platinlöffel wurde 1 Gramm krystallisirter salzsaurer Baryt eben so lange in der Weißglühhitze und im ruhig schmelzenden Zustande erhalten und nun letzterer in die erstere gebracht. Es entstanden *gar keine Dämpfe* und von einem Auf-

\*) *Elemente der Chemie der unorganischen Natur* übersetzt v. *Blumhof* 1816, 1 Thl. S. 494.

brausen war gar nichts zu bemerken; die zusammengebrachten Stoffe wurden gleich wieder in den Ofen gebracht und zur Begünstigung wechselseitiger Einwirkung, als alles ruhig floss, mit dem Platinlöffel gut gemengt, und noch durch eine Stunde in der Glühhitze erhalten.

Da nach den frühern Versuchen 100 Theile krystallisirter salzsaurer Baryt 15,7 Krystallwasser verlieren, so ist die eigentliche Menge des geschmolzenen Baryochlorides \*) nur mit 0,845 zu berechnen. *Berzelius* \*\*) giebt folgendes Verhältniß des geglühten salzsauren Baryts an: in 100 Theilen sind enthalten 26,57 Säure und 73,63 Baryt. Dieses zum Grunde gelegt, enthalten die 0,845 des geglühten salzsauren Barytes (Chlorides) nur 0,6207 reinen Baryt. Da aber nach *Thenard* \*\*\*) 100 Theile Borasäure 156,97 Theile Baryt sättigen, so werden 2,16 Grammen Borasäure im Stande seyn, 2,958 reinen Baryt zu sättigen; in dessen sind in den 0,845 Grammen nur 0,6207 reiner Baryt enthalten, welche Menge 4mal genommen erst 2,4828 beträgt, daher sind in dem gegenwärtigen Versuche etwas mehr als 4 Antheile Borasäure auf 1 Antheil Baryt vorhanden, um auch durch das chemische Moment die Zersetzung des salzsauren Barytes zu begünstigen.

Aus dem Feuer genommen zeigten sich folgende Erscheinungen: das vorher ganz farblose wasser-

\*) *Gay-Lussac* sieht den krystallisirten salzsauren Baryt schon als ein Chlorid an.

\*\*) *Schweigger's Journ. f. Chem. B. XXIII. p. 117.*

\*\*\*) *Traité élément. T. II. p. 352.*

*Journ. f. Chem. u. Phys. 25. Bd. 4. Heft.*

klare Borasäureglas war jetzt milchweiß und durchscheinend, beim näheren Untersuchen zeigte sich eine doppelte Schichtung der geflossenen Stoffe, die oberste Schichte bildete das eben erwähnte milchweiße Glas, die unterste Schichte war etwas dunkler gefärbt und liefs sich auch von dem ersteren durch leichtere Zerbrechlichkeit unterscheiden, sie wurden also von einander getrennt, und jedes für sich untersucht.

a) Das milchweiße Glas wurde im Wasser von 17° C. gelöst, diese Lösung röthete blaues Lackmuspapier, aber im obigen Sinne nicht bleibend, mit schwefelsaurem Kali erfolgte nur eine sehr schwache Trübung, welche durch Hydrochlorinsäure nicht wieder verschwand. Mit salpetersaurem Merkurprotoxyd erfolgte ein doppelter Niederschlag, ein weißer und ein gelblich grüner, letzterer verschwand auf einige zugesetzte Tropfen Salpetersäure, ersterer nicht. Als Gegenprobe wurde gelöster salzsaurer Baryt mit gelöster Borasäure zusammengebracht, und gab mit salpetersaurem Merkurprotoxyd ebenfalls einen ähnlichen doppelten Niederschlag \*).

Beide diese Erscheinungen sprechen dafür, als

---

\*) Nicht zusehr verdünnte Borasäure giebt mit salpetersaurem Merkurprotoxyd zusammengebracht einen gelblich grünen Niederschlag; borasaures Natron einen gelblichen, bald gelblich grau, später beinahe schwarz werdenden Niederschlag. — Ich wählte salpetersaures Merkur statt salpetersauren Silber, weil letzteres mit Borasäure einen weissen, flockigen, käsigen, am Lichte bald violett werdenden Niederschlag, wie mit Hydrochlorinsäure giebt, und daher in diesem Falle als Reagens auf Hydrochlorinsäure nicht dienen kann.

durch das Umrühren der flüssigen Materien wohl eine innige Mengung, keineswegs eine chemische Verbindung geschehen sey.

In Alkohol löste es sich unter Zurücklassung weniger Flocken auf, welche sich wie salzsaurer Baryt gegen Reagentien verhielten. Die alkoholische Lösung mittelst eines Doctes angezündet, brannte mit einer sehr schönen grün gefärbten Flamme. Der Rückstand mit Wasser übergossen, löste sich darin auf, blaues Lackmuspapier wurde durch die Lösung geröthet, schwefelsaures Kali nur sehr schwach getrübt, salpetersaures Silber wurde roth und weiß gefällt \*). Das milchweisse Glas ist daher als geschmolzene Borasäure anzusehen, welcher eine geringe Menge Barynchlorid beigemischt ist.

b) Die dunkler gefärbte untere Schicht löste sich im Wasser von 17° C. sehr leicht, röthete blaues Lackmuspapier nicht, mit salpetersaurem Merkurprotoxyd entstand sogleich ein häufiger weißer Niederschlag (Calomel, Merkurprotochlorid), welcher durch Salpetersäure nicht wieder verschwand; mit schwefelsaurem Kali ebenfalls ein starker weißer Niederschlag, welcher auf Zusatz von Hydrochlorinsäure nicht verschwand.

---

\*) Dieser Niederschlag ist was fremdes, durch ein neues Product der Verbrennung des Alkohols erzeugt, wird weiter untersucht. Wird Alkohol mittelst eines Doctes verbrannt, so bleibt eine gelbliche Substanz zurück, welche im Wasser gelöst, blaues Lackmuspapier nicht röthet, salpetersaures Silber sehr schnell schwarz fällt, hydrochlorinsaures Gold und Platin werden dadurch nicht gefällt. —

Mit einigen Tropfen Wasser angefeuchtet und nur einige Tropfen concentrirter Schwefelsäure dazu gebracht, entwickelten sich weiße Dämpfe, welche darüber gehaltenes trockenes, blaues Lackmuspapier bleibend rötheten, ein Glasstab mit Aetzammoniak befeuchtet und darüber gehalten verbreitete dicke weiße Dämpfe (Salmiak) auch der bloße Geruch ließ Salzsäure erkennen \*).

In Alkohol löste es sich nicht auf, schwefelsaures Kali zu dem Alkohol gebracht, gab zwar einen häufigen weißen Niederschlag, der aber auf Zusatz von wenig Wasser gleich wieder verschwand und daher bloßes schwefelsaures Kali war; salpetersaures Silber bewirkte nur eine Spur von Trübung \*\*). Der Alkohol über den unlöslichen Rückstand mittelst eines Doctes angezündet, brannte mit seiner gewöhnlichen Flamme. Der Rückstand nach dem Verbrennen mit Wasser gelöst, verhielt sich gegen Reagentien wie hydrochlorinsaurer Baryt, nur das salpetersaure Silbersalz wurde roth und weiß gefällt. (Also auch hier hat sich ein neues Produkt gebildet).

Beim ferneren Untersuchen der glasigen Substanz fand sich ein Stückchen wie eine Insel mitten in der geschmolzenen Borasäure, dessen Farbe von jener unterschieden war; herausgenommen und untersucht zeigte es sich ganz als salzsaurer Baryt, mit concen-

---

\*) Bei dieser Gelegenheit bestätigte sich die Erfahrung, daß schwefelsaurer Baryt in concentrirter Schwefelsäure zum Theil aufgelöst, und durch Wasser daraus gefällt werde.

\*\* ) Nach *Kirwan* nehmen 100 Theile Alkohol von 0,834 nur 0,185 salzsauren Baryt auf. —

trirter Schwefelsäure übergossen, entwickelten sich weißse Dämpfe, welche sich als Hydrochlorinsäure erkennen ließen.

Diese Versuche wurden dreimal mit verschiedenen Abänderungen wiederholt, und immer dieselben Resultate erhalten. Einen Versuch glaube ich noch anführen zu sollen. Borasäure und Hydrochlorinsaurer Baryt wurden in demselben Verhältniß ganz so wie vorher behandelt; aus dem Feuer genommen zeigte sich der salzsaure Baryt und die Borasäure ganz unvermengt; um die Stoffe besser mit einander zu mengen und die Berührungspuncte zu vermehren, wurden sie noch heiß aus dem Platintiegel genommen, in einem Stahlmörser schnell gepulvert, auf einer stählernen Reibschale so schnell als möglich abgerieben, wieder in das Feuer gebracht, und durch 2 Stunden im starken Feuer erhalten.

Es war Alles zu Glase geschmolzen, welches, noch heiß, wasserklar war, aber beim weiteren Erkalten milchweiß wurde. Beim genaueren Untersuchen zeigten sich mehrere gelbliche Puncte, von allen Seiten mit Borasäure umgeben und geschmolzen, welche herausgenommen mit Wasser angefeuchtet und mit Schwefelsäure übergossen, hydrochlorinsaurer Dämpfe entwickelten, zum offenbaren Beweis, daß die Barytverbindung durch die vierfache Menge Borasäure auch bei dieser innigen Vermengung und bei dieser anhaltenden Schmelzung nicht gänzlich zersetzt werden konnte: ich sage nicht gänzlich; denn ein Theil ist allerdings zersetzt worden, es bildete sich borasaurer Baryt mit vieler freyer Borasäure zusammengeschmolzen; denn fein gepulvert mit Alkohol zusammenge-

bracht und mittelst eines Döchtchens angezündet, zeigte sich eine schön grün gefärbte Flamme.

Von dieser Masse nahm ich 0,515 Grammen, welche zur vollständigen Lösung 84,205 Grammen kochendes Wasser erforderten, daher ein Theil 265,7 Gewichtstheile erfordert, diese Lösung gab mit schwefelsaurem Natron einen weißen in der Salzsäure unlöslichen Niederschlag.

Die wässrige Lösung wurde verdampft (jedoch nicht bis zur gänzlichen Trockene), es bildete sich ein weißer unkrystallinischer Bodensatz, von welchem die überstehende Flüssigkeit abgossen und filtrirt wurde.

a) Die Flüssigkeit röthet blaues Lackmuspapier, schwefelsaures Kali bewirkt darin eine kaum merkbare Trübung, salpetersaures Merkurprotoxyd einen geringen weißen Niederschlag.

b) Der weiße Bodensatz löste sich in verdünnter Salzsäure und Salpetersäure gänzlich und leicht auf, schwefelsaures Kali bewirkt in diesen Auflösungen einen häufigen weißen Niederschlag, eben so salpetersaures Merkurprotoxyd, welcher letztere weder in Salzsäure noch Salpetersäure auflöslich war.

Die in diesem Falle Statt gehabte Zersetzung ist durch die angezogene Feuchtigkeit während des schnellsten Pulverns und Reibens bedingt worden.

Nach *Berzelius* \*) ist die Verwandtschaftsordnung der Borasäure (freilich auf nassem Wege) folgende: Baryt, Strontian, Kalk u. s. w. Daher besitzt Borasäure zu dem Baryt die stärkste Anziehung und

---

\*) *Elemente u. s. w. S. 495.*



il sie sich mit ihm in der Weisglühhitze (folglich wasserlos), wenn er ihr als geschmolzenes wasserloses Barynchlorid dargeboten wird, nicht verbindet, so glaube ich, wird die Borasäure unter gleichen Umständen die übrigen Chloride ebenfalls nicht zersetzen können, und deswegen betrachte ich den geschmolzenen salzsauren Baryt und mehrere andere als ihre Chloride, obwohl ich auch wahre hydrochlorisaurer Salze annehme z. B. hydrochlorisaurer Thonerde.

---

Carradori

Versuche und Beobachtungen  
über die  
Reizbarkeit der Pflanzen,  
insbesondere des  
Lattichs,  
von  
*Chivachino Carradori.*

Im Auszuge aus dem Italienischen \*)

v o n

*Professor Meinecke.*

Der gemeine Gartensalat, Lattich, *Lactuca sativa*, äussert in bestimmten Epochen seines Pflanzenlebens eine ausgezeichnete Reizbarkeit. Dies ist, so viel ich weiss, noch nicht bekannt: ich glaube daher den Physikern willkommen zu seyn, wenn ich über diese Pflanze und überhaupt über die Reizbarkeit der

---

\*) *Memorie della società italiana*, XII, II, 30.

Pflanzen eine Reihe von Beobachtungen mittheile, die mich überrascht und erfreut haben.

Wird eine Lattichpflanze, wenn sie aufgeschossen ist, besonders aber wenn sie in der Blüthe steht, mit dem Finger leise berührt, so sieht man plötzlich an dem Punkte, wo sie berührt worden, einen milchigten Saft hervortreten, der dieser Pflanze eigenthümlich und in Gestalt kleiner Tropfen in ihr befindlich ist. Doch zeigen diese Erscheinungen bloß die kleinen umfassenden Blätter (*folia amplexicaulia*), die an dem Stengel zerstreut herablaufen und die Kelche der Blumen, nicht aber der Stengel und dessen Verästelungen.

Die Berührung eines jeden festen Körpers, er mag noch so glatt seyn, lockt diesen Saft hervor, noch mehr aber ein leichter Reiz oder ein leiser Stofs. Schon die leiseste Berührung mit dem feinsten reizenden Mittel, z. B. mit einer Pflanzenfaser, ist oft schon hinreichend, die Pflanze so sehr zu erregen, daß sie den Milchsaft in kleinen Dunstströmen ausspritzt, die ein aufmerksames Auge in der Luft wohl bemerkt.

Ein kleiner Tropfen Wasser behutsam ohne Bewegung oder mechanischen Druck oder Stofs an die reizbarsten Theile des Lattichs angebracht, bewirkt keine Saltergießung, eben so wenig ein Tropfen von Salpetersäure, Schwefelsäure oder Salzsäure, sobald man aber einen Tropfen oder mehrere von irgend einer Flüssigkeit auf die Pflanze fallen läßt, so schießt der Saft hervor.

Auch reizende Dünste, z. B. Dampf von Taback, Salpetersäure, Schwefel u. s. w. bewirken keine Saftergießung. Die Einwirkung des Luftstroms prüfte ich,

indem ich durch einen Strohalm auf die empfindlichsten Theile der Pflanze stark blies, allein ich sah nur dann zuweilen eine Wirkung, wenn ich den Halm sehr näherte.

Die Wärme war unwirksam: wenn ich eine glühende Kohle oder rothglühendes Eisen der Pflanze näherte, so schienen die getroffenen Theile derselben getödtet zu werden. Kälte, vermittelt Eis angebracht, wirkte eben so wenig.

Aber die kleinen Insecten, welche sich auf der Pflanze bewegten, vermochten durch leichte Berührung ihre Reizbarkeit zu wecken und die Milch zur Erregung zu bringen. Ein angenehmes Schauspiel gewährten mir die Ameisen, welche auf dieser Pflanze zuweilen Nahrung sammeln aus dem Saft, der durch ihre Berührung unter ihren Füßen aufquillt: sie erinnerten mich an die Gärten der Dichter, wo Milch und Nectar strömt.

Die Pflanze hört nicht auf Milch zu ergießen, wenn sie aus dem Boden genommen; auch nicht ein abgeschnittener Zweig, sofern man ihn nur so aufbewahrt, daß er seine Lebenskraft nicht ganz verliert. Als ich eine blühende Lattichpflanze, welche lebhaft Reizbarkeit zeigte, über der Wurzel abschnitt und nach und nach senkrecht ins Wasser tauchte, so bemerkte ich, daß so wie das Wasser allmählig die Oberfläche berührte, ihre Blätter und Kelche den gewöhnlichen Saft ausspritzten. Nachdem sie ganz untergetaucht war, so reizte ich sie im Wasser wie vorher an der Luft, und erhielt ebenfalls den Saft, und in besonders heftigen Strömen, wenn ich den Reiz verstärkte.

Dies ist ohnstreitig nur die Wirkung einer der

Pflanze inwohnenden Kraft, da sie hier nicht verletzt ist, und aus ihren organischen Zellen und Gefäßen ohne eine Zusammenziehung oder eine Art von Systeln der Saft nicht hervordringen kann.

Die Reizbarkeit kann an der Pflanze wiederholt erregt werden, aber eine Verlängerung des angebrachten Reizes bleibt unwirksam, ganz wie im thierischen Leben. Jedesmal, wenn ich in bestimmten Zwischenräumen ein und dieselbe Pflanze und an gleichen Stellen mit einem festen Körper berührte, erfolgte dieselbe Erscheinung, eben so wie die Zusammenziehung der thierischen Muskel bei erneuertem Reize sich wiederholt. Doch konnte ich sie nicht verlängern durch anhaltende Reizung; es schien vielmehr die Thätigkeit der Pflanze zu erschaffen, da sie nur nach einiger Zeit für den Reiz empfindlich war. Auch dieses Gesetz findet man in der thierischen Organisation wieder.

Auf eine mechanische Ursache kann diese Wirkung nicht zurückgeführt werden: denn die Saftergiesung steht nicht in Verhältniß mit der Heftigkeit des Stosses und wird durch Stechen nicht befördert: wenn aber der Reiz der Berührung durch eine leise Reibung oder durch Prickeln vermehrt wurde, so nahm auch die Ergießung an Lebhaftigkeit zu.

Wärme, Kälte, starke Dünste oder Flüssigkeiten und chemische Reagentien überhaupt sind bekanntlich für mehrere Pflanzen starke Reize, allein nicht für den Lattich. Diese Pflanze hat also eine eigenthümliche Reizbarkeit, oder vielmehr eine Reizbarkeit besondern Grades: Und es ist begreiflich, daß die Pflanzen eben so wenig wie Thiere in gleichem Maafse

mit den Kräften, welche ihre Lebensthätigkeit begründen, ausgestattet seyn können.

Die aufgeregte Reizbarkeit dieser Pflanze wirkt besonders auf die Beschleunigung der Bewegung ihres Saftes.

Dass die Pflanzen eine wahre Circulation des Safts haben, davon kann man sich leicht überzeugen. Man nehme eine zarte Pflanze der Wolfsmilch, *Euphorbia Cyparissias*, welche noch keine Zweige hat, und schneide an ihren Seiten Blätter ab; es wird sogleich aus diesen Wunden ein Milchsaft herausströmen; wenn man nun auch die Spitze derselben abschneidet, so wird man eine starke Milchergießung aus der obern größern Verletzung bemerken, und nicht mehr aus den untern kleinern Wunden. Kehrt man den Versuch um, schneidet man zuerst die Spitze ab, und dann die Seitenblätter, so wird man bloß aus jener, nicht aus diesen, den Saft hervordringen sehen. Wäre die Saftbewegung hier bloß mechanisch, so würde der Saft sich aus allen Oeffnungen ergießen, und könnte nicht so schnell wie hier an einzelnen Stellen gehemmt werden. Es zeigt sich hier offenbar eine lebendige Kraft, welche die Säfte mit besonderer Schnelligkeit nach den verschiedenen Punkten des Pflanzenkörpers hinführt.

U n t e r s u c h u n g e n  
 über das Verfahren,  
 die Gallerte und  
 andere stickstoffhaltige organische  
 E l e m e n t e  
 in ihre letzten Bestandtheile  
 zu zerlegen,

von

*Michelotti.*

Ans den Mémoires de l'Académie de Turin 1811, II, 3, im

Auszuge übersetzt vom

*Professor Meinecke.*

W enn man eine bestimmte Menge eines überoxydirt salzsauren Salzes mit einer ebenfalls bestimmten Menge angemessen trockner Gallerte durch Hitze zersetzt, so wird man erhalten :

1. Die oxydationsfähigen Bestandtheile der Gallerte plus dem Oxygen des Salzes, und
2. Ein salzsaures Salz nebst den feuerbeständigen Bestandtheilen jener Substanz.

angehörnden Stickstoffs zu bestimmen und die Menge Wasser, welche die zersetzte Substanz liefert, zu unterscheiden von dem durch die Verbindung des Hydrogens mit dem Oxygen des Oxydes entstandenen u. s. w.

Das rothe Bleioxyd ist leichter als das Bleioxyd in ziemlicher Reinheit zu haben; allein dieses Oxyd giebt schwieriger sein Oxygen ab und verbrennt die animalische Substanz nicht vollständig.

Hundert Theile rothes Bleioxyd, mit 25 Theilen Hausenblase wie in obigen Versuchen behandelt, entwickelten nach und nach Folgendes:

1. Wasser und Gas, wodurch Kalkwasser nicht getrübt wurde.
2. Kohlensäure und kohlensaures Ammoniak.
3. Kohlensäure und ammoniakhaltiges Oel nebst Wasser.

Hiermit endigte der Proceß. Das Oxyd befand sich in vollkommen metallischem Zustande mit Ausnahme eines sehr geringen Rückstandes von grauem Oxyd vermengt mit kleinen Kügelchen einer ungemein glänzenden thierischen Kohle, die an der Luft erhitzt lebhaft verbrannte.

Unter den drei angezeigten Zerlegungsmethoden erscheint die letzte als die einfachste. Das kohlenhaltige Oel, welches am Ende der Zersetzung übergeht, so wie auch das basische kohlensaure Ammoniak, könnte man von neuem über Oxyd zersetzen; doch wird bei diesem Verfahren immer einige Unsicherheit bleiben über die bestimmte Menge des Ammoniaks, das durch seine Flüchtigkeit sich leicht der Einwirkung des Oxyds entzieht. Man wird es am genauesten durch tropfbarflüssige oxydirte Salzsäure zersetzen.

Nur die ausgezeichneten Thatfachen, die ich in



Verlauf der Versuche beobachtete, hier anzugeben, ist meine Absicht. Doch sey es mir erlaubt, durch einige Bemerkungen zurückzuweisen auf den Vorgang der Zersetzung jener Substanz.

Solange ein Körper in seinem Zustande beharrt, so muß ein Gleichgewicht da seyn zwischen der Anziehung seiner Bestandtheile und der Einwirkung der umgebenden Körper: aber dieses Gleichgewicht kann ebensowohl als die Anziehungen der schon verbundenen Bestandtheile ein Erfolg einer gegenseitigen gleichen Wirkung seyn. In diesem Falle befinden sich im Allgemeinen die organischen Körper, deren Beharren in ihrem Zustande wenig fest ist.

Wenn die Gallerte, welche eins der Hauptelemente der animalischen Oeconomie zu seyn scheint, und sich ziemlich beharrlich verhält, in einem Zustande gedacht wird, worin ihre Bestandtheile im Gleichgewicht stehend gegenseitig auf einander wirken, so könnte man daraus folgenden Gang der Zersetzung oder der Aufhebung des Gleichgewichts unter den Bestandtheilen dieser Substanz herleiten.

Verbrennung des wenigst feuerbeständigen und brennlichsten Bestandtheils (Hydrogens), bis der Stickstoff in Masse das Hydrogen mit dem Oxygen theilt; und dieser Punkt tritt dann ein, wenn die Kohle sich desazotisirt und dadurch verbrennlicher wird. Bis zu welchem Grade die Verbrennlichkeit der Kohle durch einen Stickstoffgehalt vermindert werden kann, ist noch unbekannt.

Ein kohlenhaltiges Oel wird also so lange nicht gebildet, als noch freies Oxygen zur vollständigen Verbrennung des Hydrogens vorhanden ist. Nur beim letzten Versuch wurden durch eine sehr erhöhte Tem-

peratur die Bestandtheile in einem verbundenen Zustande zu rasch abgeschieden, als daß der entwickelte Sauerstoff zu ihrer Verbrennung ausreichte.

Die bisher angeführten Versuche leiteten mich zu einem Verfahren, welches mir weniger verwickelte Erfolge geben mußte: nämlich zur unmittelbaren Verbrennung der animalischen Substanz in Sauerstoffgas.

Dieses Verfahren erfordert einen etwas zusammengesetzten Apparat und Bestimmungen verschiedener Art.

Der Apparat besteht aus einem Gasometer gefüllt mit Sauerstoffgas, das aus dem Behälter über Stangen Aetzkali geleitet wird, ehe es zu einer kristallinen Röhre gelangt, welche sich über einem Ofen befindet und die zur Zersetzung bestimmte Substanz enthält. Die Röhre verlängert sich mit einer Röhre bis zu einem zweiten tiefern Ofen, und endigt mit einem schlangenförmigen glasernen Vorstofs, der in zerstoßenem Eis liegt und sich in einer sehr kleinen Glaskugel öffnet, welche wieder mit einer Woulfischen Flasche voll Kalkwasser, und diese endlich mit einer pneumatischen Wanne in Verbindung steht.

Diese Vorrichtung ist also aus sehr verschiedenen Gefäßen zusammengesetzt: ihren Inhalt zu bestimmen würde weitläufig seyn, auch mußte ich dabei auf die darin befindliche atmosphärische Luft Rücksicht nehmen. Es ist hinreichend den Inhalt des Gasometers zu wissen.

Ich ließ das Sauerstoffgas des Gasometers durch den ganzen Apparat strömen, sammelte es wieder in der Wanne, und brachte es wieder in den Gasometer zurück. Dies hat keine Schwierigkeit: in kurzer Zeit wird dadurch die Luft des ganzen Apparats mit der

in dem Gasometer befindlichen gleichartig. Dann läßt man mittelst der Wanne eine Probe der Luft ab und unterwirft sie einem eudiometrischen Versuche.

Das Sauerstoffgas, welches zu diesem Versuche diente, war aus Quecksilberoxyd gewonnen: aber durch das angezeigte Verfahren war es mit der atmosphärischen Luft des Apparats vermischt und gleichartig geworden: diese Mischung bestand aus

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kohlensäure . . . . .   | 00,00 |
| Stickgas . . . . .      | 16,66 |
| Sauerstoffgas . . . . . | 83,34 |

Die Menge des in dem Gasometer befindlichen Gasgemisches betrug bei + 10° Temperatur und 28'' Luftdruck 407,658 Kubikzoll.

Den Leim bereitete ich zu dem Versuche dadurch vor, daß ich ihn durch Alkohol niederschlug aus einer geseihten wässrigen Lösung, und im Wasserbade trocknete: dadurch erhält man einen ziemlich reinen Leim, der auch leicht zu einem bestimmten Grade der Concentration gebracht werden kann. Bei nachherigen Arbeiten habe ich indess das Verfahren der Zubereitung geändert, da der Leim hierdurch nicht zu seinem Maximum der Trockenheit gebracht und von einem Alkoholgeruch nicht ganz befreit werden kann.

25 Gran dieses Leims füllte ich in den ersten Theil der Röhre, und nachdem die Verkittung trocken war, fing ich an die Krystallröhre, worin der Leim sich befand, allmählig zu erwärmen. Zu gleicher Zeit öffnete ich etwas den Hahn des Gasometers, um durch den ganzen Apparat eine ununterbrochene Strömung von Gas zu erhalten.

In dem Augenblicke, als der Leim in feurigen

Fluß kam, bemerkte ich ein häufiges Aufsprühen einer blauen Flamme, doch ging nur wenig Gas in die Glocke über. Sobald der Leim braun geworden war, zeigte sich das Flammensprühen nicht mehr so häufig, sondern es fielen dämpfe Verpuffungen an, wodurch etwas verkohlter Leim in die Verlängerung der Röhre über den zweiten, bei diesem Versuche nicht geheizten Ofen hingestolzen wurde.

In dieser zweiten Periode der Zersetzung bildete sich Wasserdunst, der sich in dem Schlangenrohr verdichtete. In die kleine Glaskugel ging nichts Merkliches über.

Sobald der Leim verkohlt war, trat eine andere, ganz verschiedene Periode der Zersetzung ein. Es fanden weder Flammen noch Verpuffungen Statt, aber die Kohle des Leims, welche beinahe rothglühend geworden war, entzündete sich plötzlich mit so rascher und lebhafter Flamme, als wenn gemeine Kohle sich entzündete: es schien in diesem Augenblicke die Kohle von Stickstoff befreit zu seyn.

Während dieser Verbrennung wurde also eine große Menge Oxygen verzehrt: ich mußte also den Hahn des Gasometers noch mehr öffnen. Doch trat kein Gas in die Glocke der pneumatischen Wanne über. Der Dunst des Schlangenrohrs war dicht und das Kalkwasser getrübt, und in kurzer Zeit hatte sich ein sehr reichlicher Niederschlag gebildet.

Der Dunst, welcher in den zweiten Theil der Röhre strömte, setzte hier einen Antheil bräunlich gefärbtes Wasser ab, und ausserdem befand sich darin die durch Verpuffungen herübergeworfene kohlige Substanz. Der ganze Inhalt der ersten Röhre war vollständig verbrannt und es blieb nur Asche übrig.

Nun fing ich an unter der zweiten Röhre Feuer anzuzünden.

So wie diese Röhre sich erhitze, verdunstete das gefärbte Wasser, und es zeigten sich einige kleine Flammen begleitet von leichten Verpuffungen. Sobald die Kohle sich erhitze, wurde die Verbrennung lebhafter; aber dieser Theil der Röhre hielt nicht aus gegen die vereinte Wirkung des innern und äußern Feuers: sie öffnete sich. Sogleich verschloß ich das Gasometer und die entstandene kleine Oeffnung und zog den Ofen zurück. Obgleich die Oeffnung unbedeutend war, so ging doch etwas Gas und dampfförmige Substanz verloren. Diesen Verlust, besonders an Gas, suchte ich genau zu schätzen: doch aber kann ich das Ergebnis dieser zum Theil unvollständigen Zerlegung nur sehr annähernd angeben.

Während dieser Operation wurde das Gas, welches anfangs aus dem Gasometer kommend keine Verbindung eingegangen und durch eine bestimmte Menge Kalkwasser geströmt war, in der pneumatischen Wanne gesammelt. Sorgfältig sonderte ich das Gas nach den Epochen der Zersetzung.

Nachdem der Apparat erkaltet war, führte ich den ganzen Inhalt wieder auf die Temperatur und den Druck am Anfange des Versuchs zurück, nämlich auf + 10° und 28".

Der Rückstand des Leims betrug auf der Waage an

|                                      |              |      |
|--------------------------------------|--------------|------|
| Phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk | 1,00         | Gran |
| Unverbrannter Kohle                  | 1,50         | —    |
|                                      | <u>2,50</u>  | —    |
| Verbrannt waren also                 | 22,50        |      |
| Demnach das Gewicht des Leims war    | <u>25,00</u> |      |

In dem zweiten Theil des Apparats befanden sich an festen und tropfbarflüssigen Substanzen:

|                                  |                |      |
|----------------------------------|----------------|------|
| Kohlensäuerliches Ammoniak . . . | 1,00           | Gran |
| Kohlensaurer Kalk . . . . .      | 113,291        | —    |
| Wasser . . . . .                 | 46,00          | —    |
|                                  | <u>150,291</u> | —    |

Dazu obige Substanzen in der ersten Röhre . . . . . 2,50 —

Sämmtliche feste und tropfbare Producte . . . . . 152,791 —

Das Gas betrug bei + 10° Th. und 28'' Bar.

Erster Antheil . . . . . 40,805 Kub. Zoll.

Zweiter — . . . . . 10,710 — —

51,575 — —

Die Menge des in dem Gasometer übrig gebliebenen Gas bei 10° Th. und 28'' B. war 190,805 Kubikzoll; es geben also die anfänglichen zum Versuche bestimmten 407,658 minus 190,805 Kubikzoll eine Menge von 216,855 K. Z., und nach Abzug von etwa 12 K. Z. Verlust, 204,855 K. Z. verbrauchtes.

Das erste Gas des pneumatischen Apparats bestand aus

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kohlensäure . . . . . | 00,000          |
| Hydrogen . . . . .    | 00,000          |
| Oxygen . . . . .      | 35,334          |
| Stickgas . . . . .    | 66,666          |
|                       | <u>100,000.</u> |

Das zweite Gas aus

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Oxygen . . . . .   | 35,715          |
| Stickgas . . . . . | 64,258          |
|                    | <u>100,000.</u> |

Das letztere während dem Verglühen der Kohle übergegangen Gas enthält also weniger Stickgas als

die Gallerte etc. zu zerlegen. 471

Die erste. Wenn man sich nun erinnert, daß das Gas des Behälters 83,34 Proc. Oxygen enthält, so wird man überzeugt, daß die eigentliche Verbrennung der thierischen Kohle erst dann anfing, als diese von Stickstoff frei war.

Obige Mengen von 40,805 + 10,710 = 51,515 Kubikzoll enthalten also in der ersten Abtheilung:

|                    |               |           |
|--------------------|---------------|-----------|
| Oxygen . . . . .   | 13,601        | Kubikzoll |
| Stickgas . . . . . | 27,204        | —         |
|                    | <u>40,805</u> | —         |

und in der zweiten

|                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| Oxygen . . . . .   | 3,826         | — |
| Stickgas . . . . . | 6,885         | — |
|                    | <u>10,711</u> | — |

Um nun die wahre Menge des verzehrten Gases zu erhalten, muß man von der anfänglichen Menge den Betrag des Oxygens und Stickgases, der in dem pneumatischen Apparat übergegangen ist, abziehen und voraussetzen, daß die Menge des Stickgases in der Kammer nichts als das aus dem Gasometer übergegangene Stickgas ist. Wir werden nachher sehen, ob diese Voraussetzung zulassen dürfen.

In dem Behälter befanden sich 83,34 Pc. Oxygen, mithin waren 204,855 Kubikzoll zusammengesetzt

|                    |                |           |
|--------------------|----------------|-----------|
| Oxygen . . . . .   | 170,766        | Kubikzoll |
| Stickgas . . . . . | 34,089         | —         |
|                    | <u>204,855</u> | —         |

von . . . . . 170,766 Kub. Zoll Oxygen  
 abziehen 17,426 H. Z. freigebliches Oxygen  
 übrig . . . . . 153,340 H. Z. verzehrtes Oxygen.

Die Mengen des erhaltenen und übriggebliebenen Stickgases sind gleich: wenn hier ein Unterschied

472 Michelotti über das Verfahren,

sich findet, so ist er dem Verluste des Gases zu rechnen und sicher nicht groß.

Das Wasser des Apparats wog 46 Gran, welche bestehen aus

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Oxygen . . . . .   | 39,404 Gr. |
| Hydrogen . . . . . | 6,596 —    |
|                    | 46,000 —   |

Das erhaltene kohlen-sauerliche Ammoniak wurde zu 1 Gran geschätzt: ich sage geschätzt; denn mein Prüfungsmittel war nicht genau; es war schwefelsaure Bittererde.

Nach *Berthollet* muß das kohlen-sauerliche Ammoniak, das bei dieser Art Untersuchung sich bildet, aus nahe gleichen Theilen Säure und Ammoniak bestehen: es enthält also ein Gran dieses Salzes 0,5 Kohlen-säure und 0,5 Ammoniak. Diese Menge Ammoniak aber besteht wieder aus 0,1 Hydrogen und 0,4 Stickstoff.

Nach *Theodor de Saussüre* werden 36,14 Kohle durch 73,86 Oxygen in Kohlen-säure verwandelt: es enthalten also 0,5 Gran Kohlen-säure des Ammoniak-salzes

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kohle . . . . .  | 0,131 |
| Oxygen . . . . . | 0,369 |
|                  | 0,500 |

Ob dieses Oxygen von dem Gasgemenge oder aus der zersetzten Substanz herrührt, ist hier für die Berechnung gleichgültig, denn das Oxygen des Leims findet man, wenn man von der Menge sämtlicher Producte der Zerlegung das, was nicht Oxygen ist, plus dem verzehrten Oxygen abzieht.

Das angewandte Gas stand im Behälter über Wasser und befand sich also im Maximum der Feuch-



tigkeit. Nach *Staussüre* wiegen 100 Kubikzoll des feuchten Oxygengases 51,237 \*) Gran. Wegen seines Gehalts an 16,66 Pct. Stickgas wäre hier eine Berichtigung anzubringen, doch kann man bei dieser Art Versuche eine kleine Differenz übersehen.

Die Menge des erhaltenen kohlen-sauren Kalks war 115,291 Gr. Diese enthalten 52,5 Kohlen-säure, welche aus 15,729 Gr. Kohle und 58,795 Oxygen bestehen.

Nach Berechnung der Ergebnisse der Zerlegung hat der Leim gegeben:

|                                               |        |      |
|-----------------------------------------------|--------|------|
| Unverbrannte Kohle . . . . .                  | 1,500  | Gran |
| Asche . . . . .                               | 1,000  | —    |
| Hydrogen des Wassers . . . . .                | 6,569  | —    |
| Hydrogen des Ammoniaks . . . . .              | 0,100  | —    |
| Stickstoff des Ammoniaks . . . . .            | 0,400  | —    |
| Kohle des Ammoniaksalzes . . . . .            | 0,131  | —    |
| Kohle des Kalks . . . . .                     | 15,729 | —    |
|                                               | <hr/>  |      |
|                                               | 23,456 | —    |
| Bleibt für den Sauerstoff des Leims . . . . . | 1,544  | —    |
|                                               | <hr/>  |      |
|                                               | 25,000 | —    |

*Bemerkungen des Uebersetzers.*

Diese Berechnung scheint einiger Erläuterung und Berichtigung zu bedürfen, nicht allein wegen einiger unbestimmten Ausdrücke und dunkeln Stellen, sondern auch wegen der Incorrectheit einiger Annahmen und Voraussetzungen. Die Methode, welche *Michelotti* gewählt hat, ist sinnreich, denn hier werden die Gewichtsverhältnisse gasförmiger und fester Producte, ohne Reduction der Volume im Gewichte

\*) Im Originale steht 512,37.

und umgekehrt, gefunden und mehrere Messungen der Temperatur, des Luftdrucks, des Gefäßinhalts u. s. w. vermieden, aber die Resultate sind dagegen wegen mangelnder Controlls weniger sicher.

Gleich anfangs ist es überflüssig, den Gasinhalt des Apparats in Verbindung mit dem des Gasometers zu wissen: denn man findet die beim Versuche verbrauchte Gasmenge aus dem Minus des Gasometers allein. Dieses betrug 216,855 Kubikzoll und nach Abrechnung eines zufälligen Verlusts von etwa 12 K. Z. nur 204,855 K. Z. Darin gab die Prüfung 16,66 Proc. Stickgas an. Jene Gasmenge enthielt mithin 34,128 Kubikzoll Stickgas. Das davon übriggebliebene unverbunden übergegangene Gas aber betrug 51,515 Kubikzoll, worin 64,285 Procent oder 33,116 Kubikz. Stickgas: es fand sich also an absoluter Menge sämtliches Stickgas, bis auf eine geringe Differenz, die einer unrichtigen Schätzung des Verlusts zugeschrieben werden konnte, in dem Recipienten wieder; es war also weder Stickstoff verdichtet, noch aus dem zerstörten Leime frei geworden.

Der Stickstoff des Leims fand sich in dem kohlen-sauren Ammoniak, an Gewicht 1 Gran, worin nahe  $\frac{1}{2}$  Gr. Ammoniak, und das Verhältniß der Bestandtheile des Ammoniaks zu 4 Hydrogen und 17 Stickstoff gerechnet, 0,412 Gr. Stickstoff enthalten sind. Es fanden sich also in 25 Gran Leim 0,412 Gran, oder in 100 Theilen 1,648 Th. Stickstoff.

An Kohle blieben 1,5 unverbrannt: der übrige Kohlenstoff ist in den entstandenen kohlen-sauren Salzen des Ammoniaks und Kalks enthalten. Das kohlen-saure Ammoniak, an Gewicht 1 Gran, enthält etwa  $\frac{1}{2}$  Gran Kohlensäure, und diese, in dem Verhältniß von

$\frac{1}{11}$  Kohlen und  $\frac{1}{11}$  Oxygen berechnet, giebt wieder 0,136 Gr. Kohlenstoff. Die größte Menge Kohlenstoff ist in dem gefällten kohlensauern Kalk zu suchen. Wenn dieser aus  $\frac{11}{11}$  Kohlensäure und  $\frac{1}{11}$  Kalk, und die Kohlensäure aus  $\frac{1}{11}$  Kohle und  $\frac{1}{11}$  Oxygen besteht, so enthalten die entstandenen 115,291 Gran kohlensauern Kalk 49,848 Gr. Kohlensäure, und diese 15,594 Gr. Kohle. Fügen wir dazu den Kohlenstoff des Ammoniaksalzes und den Kohlenrückstand, so erhalten wir  $15,594 + 0,136 + 1,5 = 15,25$  Gran Kohlenstoff in 25 Gr. Leim, oder 60,92 Theile in 100.

Der Wasserstoff des Leims findet sich in dem Ammoniak und in dem Wasser. Das kohlensaure Ammoniak enthält nach der vorhin angestellten Berechnung  $\frac{1}{2}$  Gran Ammoniak und darin 0,188 Gr. Hydrogen. Die Menge des Wassers betrug 46 Gr., worin sich nach dem Verhältnisse von  $\frac{1}{2}$  Hydrogen und  $\frac{8}{9}$  Oxygen, 5,111 Gr. Hydrogen befinden. Diese Menge zusammengerechnet mit dem Hydrogeengehalt des Ammoniaks geben 5,229 Gr. Hydrogen in 25 Leim, oder 20,916 in 100.

Der unverbrannte Salzrückstand betrug 1 Gran oder 4 Procent.

An Stickstoff, Kohle, Hydrogen und Asche enthalten also 25 Gran Leim  $0,412 + 15,25 + 5,229 + 1 = 21,871$  Gr. Da nun ausser diesen Substanzen nichts weiter als Oxygen im Apparate gefunden wurde, so muß das, was noch an dem Gewichte des Leims fehlt, nämlich  $25 - 21,871 = 3,129$  oder 12,516 Procent, der Sauerstoffgehalt des Leims seyn.

Hiernach besteht der Leim im Hundert aus

476 Michelotti über das Verfahren,

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Stickstoff                              | 1,648  |
| Kohlenstoff                             | 60,920 |
| Wasserstoff                             | 20,916 |
| Sauerstoff                              | 12,516 |
| Kohlensäuren und<br>Phosphorsäuren Kalk | 4,000  |

100,000

Und nach Abrechnung des kohlensäuren und phosphorsäuren Kalks oder der Asche:

|             |        |
|-------------|--------|
| Stickstoff  | 1,716  |
| Kohlenstoff | 63,459 |
| Wasserstoff | 21,787 |
| Sauerstoff  | 13,038 |

100,000.

Dies weicht beträchtlich ab von Gay-Lussacs und Thenards Analyse des Leims \*).

|             |        |
|-------------|--------|
| Stickstoff  | 16,998 |
| Kohlenstoff | 47,881 |
| Wasserstoff | 17,914 |
| Sauerstoff  | 27,209 |

100,000.

Die Resultate des Versuchs, die zum Theil erschlossen und gefolgert, und nicht unmittelbar gefunden sind, leiden an Unrichtigkeiten, deren Größe sich nicht leicht bestimmen läßt, die aber sichtbar werden aus mehreren Widersprüchen. Die Menge des verbrauchten Oxygengases, in Gewicht übertragen, und die des Leims entsprechen nicht dem Oxygen der Producte. Auch der Vorgang des Processes scheint nicht genau angegeben zu seyn; ist es z. B. möglich, daß der Leim bei langsamer Erhitzung keine Verflücht-

\*) Recherches Physico - chimiques II. 334

gung eines Theils seiner Bestandtheile erleidet, ehe die Hitze stark genug wird, eine Entzündung mit dem stickstoffhaltigen Oxygen zu bewirken? Sollte vor der Entzündung keine der Erscheinungen, die den Anfang einer zerstörenden Destillation bezeichnen, eingetreten und keine elastischen Flüssigkeiten übergegangen seyn, die sich der Verbrennung entzogen?

Zur Zersetzung organischer Substanzen wird man also *Michelottis* Methode und den beschriebenen zusammengesetzten Apparat wohl nicht zweckmäßig finden. Zieht man der Zersetzung, vermittelt Kupferoxyd die Verbrennung in freiem Oxygen vor, so wird man so, wie *Gayton-Morveau* und *Davy* bei der Verbrennung der Kohle und des Diamant verfahren: man wird einen kleinen Antheil der organischen Substanz auf ein Platinschüsselchen gelegt in eine mit Oxygengas gefüllte Glaskugel einschließen und durch ein starkes Brennglas entzünden. Die Producte der Verbrennung, welche aufs genaueste geleitet werden kann, und wobei weder Verlust noch ein fremder Zutritt möglich ist, verstatten dann die schärfste Prüfung.

Ueber den  
**S t e i n h e i l i t**,  
 und eine neue darin entdeckte  
**S u b s t a n z**,

von

*I. G a d o l i n*.

Aus dem Lateinischen \*) vom Prof. *Meincke*.

**D**em um die Mineralogie hochverdienten Grafen *Steinheil*, Gouverneur von Finnland, zu Ehren nenne ich Steinheilit ein in Finnland entdecktes Fossil, das, bisher unter der Benennung blauer Quarz bekannt, zuerst durch ihn von Quarz getrennt und genauer bestimmt worden ist.

Nach seiner Untersuchung sind die Kennzeichen dieses Fossils folgende:

Die Farbe des reinsten Fossils ist dunkel veilchenblau, himmelblau und berlinerblau, geht aber

\*) Mémoires de l'Académie imp. des Sciences de St. Petersburg. 1818. VI. 565.

in größern Krystallen, worin sich wolkige oder büschelförmige Zeichnungen befinden, in ein helleres Blau, in blaulichgrau, in grünlichgrau und schwärzlichgrün über, je nachdem dem Steine mehr oder weniger Theilchen einer quarzigen oder glimmerartigen, schuppigen und netzförmigen, mit bloßem Auge kaum zu unterscheidenden Substanz beigemengt sind. Selten finden sich röthliche, nelken- oder haarbraune Flecken. Dunkelblaue Stücke sind von zahlreichen kleinen Spalten und Rissen durchzogen, welche oft ein lebhaftes Farbenspiel hervorbringen. Zuweilen ist die dunkelblaue Farbe so tief, daß der Stein beinahe schwarz und gegen das Licht gehalten, grün erscheint.

Das Fossil findet sich entweder derb, in unbestimmt eckigen Stücken, oder in folgenden regelmäßigen Gestalten:

- A. In vierseitigen; diese sind entweder
- a. gleichseitig und rechtwinklicht, oder
  - b. zwei entgegengesetzte Seitenflächen sind größer als die beiden andern.
  - c. Selten sind die Endkanten abgestumpft.
  - d. Oft sind die Endkanten durch eine Fläche abgestumpft oder durch zwei Flächen zugespitzt. Nimmt die Breite der Abstumpfungsf lächen so weit zu, daß sie in den Seitenflächen der Säule zusammenstoßen, so erscheint die Grundgestalt völlig abgeändert.
- B. In sechsseitigen Säulen
- a. mit vier breiten und zwei schmalen entgegengesetzten Seitenflächen, oder
  - b. mit zwei breiten und vier schmalen entgegengesetzten Seitenflächen.
- C. In zusammengedrückten achtseitigen Säulen mit

vier breitem und vier schmalern Seitenflächen, von welchen jedesmal zwei breitere mit zwei schmalern wechselt. Von den zusammenstossenden zwei breitem oder schmalern Flächen ist gewöhnlich die eine breiter als die andere. Jede Fläche ist gleich und parallel der gegenüberstehenden. Die Kante zwischen der breitem und schmalern Fläche ist gewöhnlich stark abgestumpft, selten die zwischen den beiden breiten Flächen, noch seltener die der beiden schmalen Flächen. Die breitem Flächen bilden zuweilen unter sich und mit den Abstumpfungsfächen so stumpfe Winkel, daß sie Theile einer convexen Fläche darzustellen scheinen. Auch täuschen die längst der Säule befindlichen Streifen und Unebenheiten leicht über die wahre Lage der Flächen.

Von allen Graden der Gröfse zwischen ungewöhnlich groß und zwischen klein finden sich die Krystalle. Ungewöhnlich groß sind die sechs- und achtseitigen Säulen, welche selten vollständig, sondern meist durch Verwachsung mit Quarz und Schwefelkies gedrückt und entstellt vorkommen. Die Krystalle in mittlerer Gröfse und die kleinen finden sich selten einzeln, sondern meist an ihren schmalern oder breitem Flächen verwachsen oder stangenförmig verbunden. Durch die büschelförmige Verwachsung der kleinen Krystalle mit den größern entstehen scheinbar neue und unregelmäßige Gestalten mit rauher und gestreifter Oberfläche und mit höckerigen Endflächen.

Die Oberfläche ist meist gestreift, an derben Stücken uneben, an Krystallen glatt. Sie ist fast immer mit einem schwarzen, grauen oder dunkelgrünen, kalkartigen Ueberzuge, und dieser wieder mit einem



feinen wachsglänzenden oder matten Häutchen bedeckt.

Das Bruchansehen der dunkelblauen Stücke ist starkglänzend und zwar von Glasglanze. Die lichtern Stücke sind wenigglänzend von Wachsglanz, oder matt.

Der Bruch dunkelblauer Stücke ist groß- und kleinsplittig ins unvollkommen Muschelige übergehend, zuweilen auch eben und beinahe schuppigblättrig. Dieser Uebergang findet sich vorzüglich am Queerbruche lichter Stücke. Der Hauptbruch derselben ist verstecktblättrig.

Die Bruchstücke sind meist unregelmäßig und scharfkantig. Zuweilen fallen sie rhomboidal aus, vorzüglich von hellblauen Stücken. Zwischen den abgesonderten Stücken scheint eine dunklere Substanz eingewebt zu seyn, welche durchsichtig ist und durchscheinende, lichtere, gerade Streifen oder schuppige Bündel enthält. Diese durchziehen die Bruchstücke in Gestalt aschgrauer glimmerartiger Häutchen, kaum dem bloßen Auge unterscheidbar, ehe der Stein ge- glüht worden; dann aber zeigen sie sich deutlich in Gestalt undurchsichtiger Schuppen und von gelber Farbe in den Spalten des Steins, und bringen grünliche, wolkige und gefleckte Zeichnungen hervor, wodurch die schöne himmelblaue Farbe desselben größtentheils zerstört wird.

Dunkelblaue und bräunliche Bruchstücke von zwei Linien Durchmesser sind durchsichtig. Grünliche Exemplare sind bloß durchscheinend und zuweilen nur an den Kanten durchscheinend.

An Härte gleich dem Quarz.

Spröde, leicht zersprengbar.

Nicht sonderlich schwer, fast wie Quarz.

Von Thongeruch, der besonders an grünen Exemplaren merkbar ist.

Geht in ein talkartiges Gestein über, auf zwiefache Weise: es sind entweder die Enden der mit einem schwarzen Ueberzuge bedeckten kleinen Krystalle von einer serpentinsteinartigen rabenschwarzen Substanz, die sich ins Innere des blauen Steins allmählig verläuft, durchdrungen, oder der ganze Krystall ist auf einer Seite schwarz, nach und nach ins Grünlichgrau sich ziehend, und auf der andern Seite blau, allmählig ins lichter Grüne, dann ins Gelbe und Schwarze sich neigend, und hört endlich auf in einem schwarzen Ueberzuge, oder in einer Art von Actinot.

Kommt vor in den Kupferbergwerken bei Origervi in der Nylandischen Pfarrey Kisko, Provinz Tavastehus. In einem alten, jetzt verlassenen Schachte wurde dies bis jetzt unter dem Namen blauer Quarz bekannte Fossil häufiger und schöner gefunden als in den neuern Werken; wo es meistentheils mit gemeinem Quarz, mit Kupferkies und verschiedenen talkartigen Substanzen vermengt ist. Die größern knollen- und mierenförmigen Stücke sind überzogen und durchwachsen mit Asbest, Actinot, Chlorit, Glimmer oder Serpentinsteine. Häufig ist Kupferkies eingemengt, seltner Blende und Bleiglanz, zuweilen Molybdän. Regelmäßig krystallisirte und rein gefärbte Stücke finden sich nur in dem alten Werke; aus den neuern Schachten erhält man dagegen größere.

Zur chemischen Untersuchung wählte ich vollkommen durchsichtige, lebhaft blau gefärbte Stücke,

deren specifisches Gewicht bei 16° C gleich 2,6026 gefunden wurde.

Vor dem Löthrohre verhielt sich das Fossil ganz verschieden vom Quarz, denn es schwoll nicht auf mit Natron und zerfloß auch nicht damit zu Glas. Vom Bórax wurde es zwar aufgenommen, aber nur in sehr geringer Menge. Die dadurch erhaltene Glasperle war farblos.

Im offenen Tiegel geglüht erhielt das Fossil viele Risse, welche undurchsichtig, milchweifs, aschgrau oder röthlich den Stein durchzogen, und in fast rhomboidale Stücke zertheilten. Die den Spalten eingewebte Substanz behielt ihren Glasglanz, aber wurde minder durchsichtig, lichter blau und zum Theil gelb und opalisirend. An der Oberfläche der Risse des zerbrochenen geglühten Steins zeigten sich glimmerartige Theilchen. Dadurch wurde ich zu der Meinung geleitet, dafs dies Fossil nicht aus gleichartigen Theilen, sondern vielmehr aus Quarz und Glimmer zusammengesetzt sey, bis ich das verschiedene Verhalten desselben beim Glühen im verschlossenen Gefäfse beobachtete. Denn nun behielten die Stücke im Weifsglühen einen gleichartigen Zusammenhang. Die Farbe war dunkel blaulichgrau geworden, die Durchsichtigkeit vermindert und der Glasglanz in Wachsglanz umgeändert. Daraus schloß ich, dafs die Farbenveränderung und die Zerreißung des im offenen Gefäfse geglühten Fossils von dem Zutritte der Luft abgeleitet werden könne.

Die Spalten des Fossils scheinen bei dem Glühen theils durch die ungleiche Ausdehnung der Hitze, theils durch die Entweichung des Wassergehalts entstanden zu seyn. Auch bemerkte ich einen beträcht-

lichen Gewichtsverlust, der mit der erhöhten Hitze und der Dauer des Glühens zunahm. Ein Probiercentner dieses Steins, der durchs Rothglühen nur ein halbes Pfund verlor, erlitt in starker Weißglühhitze einen Gewichtsverlust von drei und ein Viertel Pfund. Auch war der Gewichtsverlust größer, wenn der Stein mehrmal geglüht und wieder abgekühlt wurde, als wenn man ihn nur einmal und länger glühte; endlich auch größer in offenen als in verschlossenen Gefäßen. Die Menge seines Wassergehalts schätzte ich auf mehr als drei Procent.

Zu den fernern Versuchen wurde das Fossil mit Wasser in einem Achatmörser zum feinsten Pulver zerrieben. Bei dem Reiben bemerkte ich einen Geruch, wie ihn feuchte Thonkörper, welche Eisenoxydul enthalten, ausstossen. Das Pulver erschien, noch feucht, aschgrau und nach dem Trocknen weiß. Zu jedem Versuche wende ich einen Probiercentner an, oder den achten Theil einer Unze, der also hier die Einheit darstellt.

### *Erster Versuch.*

a) Das Pulver wurde mit 17 $\frac{1}{2}$  Theilen Salzsäure übergossen. Diese färbte sich gelb, bewürkte mit Hülfe der Hitze einiges Aufbrausen, und verbreitete einen stinkenden Geruch gleich dem einer Mischung von Wasserstoffgas mit salzsaurem Gas. Nachdem die Flüssigkeit unter häufigem Umschütteln anhaltend digerirt und der größte Theil der Säure abgedunstet werden, so blieb eine honigdicke Masse von gelblich-grüner Farbe zurück. Mit vielem Wasser wurde das unaufgelöste gelbliche weiße Pulver ausgekühlt, wal-

hes nach dem Trocknen an Gewicht die Hälfte des Steins betrug. Es schmolz vor dem Löthrohre mit kohlen-saurem Natron zu einer durchsichtigen, und mit Phosphorsäure zu einer undurchsichtigen Glas-erle, und zeigte dadurch an, daß alle durch Salz-ture auflöselichen Theile aus der Kieselerde abge-schieden worden.

b) Die Auflösung erregte einen sauern, anfangs ungenchmen darauf herben Geschmack. Nachdem die überschüssige Säure durch kohlen-saures Kali neutrali-rt worden, so zeigte sich die Farbe rein gelb. Fer-er zugesetztes Kali bewirkte einen gelblichen Nieder-schlag, der auf dem Filter gesammelt und ausgesüßt wurde.

c) Die wässrige Auflösung bedeckte sich an der Luft mit einem Häutchen. Der Wärme ausgesetzt, schied sie ein weißes Pulver aus, das sich in Schwefel-säure unter Aufbrausen leicht auflöste, und in die-er Verbindung an seinem Geschmacke als schwefel-saure Bittererde erkannt wurde.

d) Der getrocknete Niederschlag *b* wurde von concentrirter Schwefelsäure nicht merklich angegriffen, aber löste sich fast augenblicklich auf, sobald Wasser zugesetzt wurde, und bildete eine farblose Flüssigkeit, welche nach Abdunstung eines Theils der Feuchtig-keit ein weißes anfangs feines darauf körniges Pulver bilden liefs. Neu zugesetztes Wasser stellte die Auf-lösung wieder her, die nun einen süßlich-herben Ge-schmack angenommen hatte. Reines wässriges Ammo-riak fällte daraus ein gelbliches Pulver. Die überste-ende Flüssigkeit wurde weder durch reines noch durch kohlen-saures Kali verändert.

e) Das durch Ammoniak gefällte Pulver, ausga-

süßt und dann mit zehn Theilen in Wasser gelösten kohlensauren Ammoniak digerirt, blieb unverändert. Die abgeseigte klare Flüssigkeit hinterließ beim Abdunsten keinen Rückstand.

f) Dasselbe von neuem ausgesüßte Pulver würde noch feucht mit destillirtem Essig übergossen. Dieser trübte sich, und gab mit Hülfe der Wärme eine weingelbe Auflösung, welche durch Verdunstung eingeeengt, mit einem schaumigen Ueberzuge bedeckt und zuletzt in eine gallertähnliche Masse verwandelt wurde. Zugeseztes Wasser stellte die Auflösung wieder her, doch blieb darüber eine gelbliche gallertartige Substanz schwimmen.

g) Diese Mischung gerann durch zugeseztes Ammoniak gänzlich zu einer Gallerte. Nach und nach aber schied sich eine klare Flüssigkeit aus der gelben Gallerte, die nun mit vielem Wasser ausgesüßt wurde. Aus diesem Wasser fielen beim Abdunsten ockergelbe Theilchen nieder, welche gesammelt und getrocknet die Gestalt glänzender gelblichrother Schuppen annahmen und sich wie Eisenoxyd verhielten.

h) Die geronnene Masse g wurde mit einem gleichen Gewichte concentrirter Kalilösung vermischt und dadurch mit Hülfe der Wärme fast gänzlich in eine klare Auflösung verwandelt. Nur einige dunkelrothe Flocken blieben unaufgelöst. Nach dem Erkalten aber wurde die Flüssigkeit wolkig, und setzte eine beträchtliche Menge eines ockergelben Pulvers ab, das sich eben als Eisenoxyd verhielt.

i) Die kalische Auflösung trübte sich nach dem Zusatze von schwefelsaurem Ammoniak und setzte, nach Abdunstung des Ammoniaks, ein weißes Pulver ab, das der Alaunerde gleich: denn es wurde von ver-

dünnter Schwefelsäure in der Wärme leicht aufgelöst und schmeckte dann wie Alaun. Auch bildeten sich nach dem Zusatz von etwas Kali wahre octaëtrische Alaunkrystalle.

Aus den Erfolgen dieses Versuchs schloß ich, daß der Steinheilith vorzüglich aus Kieselerde und Alaunerde, verbunden mit etwas Bittererde und Eisenoxyd zusammengesetzt sey. Die Spuren von Wasserstoffgas, welche bei der Auflösung durch Salzsäure bemerkt wurden, leitete ich von der Einwirkung des Wassers auf wenig oxydirte Theile des Steins ab.

#### Zweiter Versuch.

Mit dem vierfachen Gewichte Salpetersäure digerirt und gekocht veränderte sich das Steinpulver nicht weiter, als daß es ins Bläuliche spielte, während die Flüssigkeit sich leicht gelblich färbte. Sobald aber noch vier Theile Salzsäure zugesetzt wurden, so fing eine Auflösung des Pulvers an. Nach anhaltender Digestion und Abdunstung der überflüssigen Säure stellte die Auflösung eine zähe gelblichbraune Masse dar, welche in der Kälte zu einer festen mit kleinen Krystallen durchwebten Substanz gerann, und mit heißem Wasser ausgezogen, ein unaufgelöstes weißes Pulver zurückließ. Dies wurde von Salpetersäure nicht weiter angegriffen. Gewaschen und bei 60° C getrocknet wog es 0,567. Es fühlte sich zart an, und schmolz mit gleichen Theilen kohlensaurem Natron vor dem Löthrohre zum durchsichtigen Glase.

Die Flüssigkeit wurde bis zum achtfachen Gewichte des Wassers eingeengt und mit einer Auflösung von schwefelsaurem Ammoniak versetzt. Hier-

auf schieden sich in der Kälte octaëtrische Krystalle aus, an Gewicht 3,2, von süßlichsaurem, etwas herbem Geschmack, die in der Wärme theils zerflossen, theils ihre Gestalt behielten. Ich erkannte sie als eine Verbindung von Alaun mit schwefelsaurer Bittererde und Ammoniak\*) mit einem Eisensalz versetzt.

Der von den Krystallen abgeordneten Flüssigkeit setzte ich Ammoniak zu, fast bis zur Sättigung der Säure, und darauf benzoesaures Ammoniak, welches ein gelbes Pulver fällete. Dies nahm nach dem Waschen und Trocknen eine schwarze Farbe an und wog 0,15; nach dem Glühen 0,04. Es folgte dem Magnete.

Das abgedunstete Aussüßungswasser gab Krystalle von schwefelsaurem Ammoniak, vermischt mit andern feinen, federförmigen, in der Wärme zerfließenden Krystallen, welche durch ihren bitteren Geschmack ein Bittererdesalz und durch ihren Geruch in starker Hitze Benzoessäure anzeigten. Diese wogen 0,162.

### *Dritter Versuch.*

A. Frische Stücke des blauen Fossils werden weder von concentrirter noch von verdünnter Schwefelsäure angegriffen. Der geglühete Stein wird in seinen Spalten, die sich durch eine gelblichrothe Färbung auszeichnen, in siedender Schwefelsäure weiß, ohne jedoch sein Gewicht zu verändern.

B. Auch der gepulverte Stein, mit dem zehnfachen Gewichte concentrirter Schwefelsäure digerirt, wird anfangs wenig verändert. Wenn aber die Erhi-

---

\*) Im Originale steht Sulphas potassae.



zung bis zum Sieden gesteigert wird, so färbt sich die Flüssigkeit schwarz und verbreitet einen stechenden sauren Geruch. Zugesehtes Wasser verwandelt die Farbe der Auflösung in Gelb und erzeugt nach dem Erkalten kleine Salznadeln, welche bei dem Abdunsten zunehmen und eine krystallinische im heißen Wasser lösliche Masse bilden. Doch kann auf diesem Wege kaum mehr als der siebenté Theil des Pulvers aufgelöst werden. Aus dem Rückstande, der an Farbe und Geruch dem grauen Thone gleicht, nimmt Salzsäure schwieriger, als aus dem frischen Steinpulver, auflösliche Theile auf.

C. Mit heißem Wasser angefeuchtetes Steinpulver wurde in acht Theilen durch ein gleiches Gewicht Wasser verdünnte Schwefelsäure digerirt. Nach Abdunstung des Wassers und Steigerung der Hitze fast bis zum Sieden der Säure, färbte sich die Flüssigkeit schwarz und verdickte sich. Sie blieb so in der Kälte. Etwas zugesehtes warmes Wasser brachte Krystalle hervor und beim Erkalten gerann das Ganze zu einer festen Salzmasse. Doch auch jetzt fand ich noch den größten Theil des Steins unaufgelöst.

D. *a.* Feinstes Steinpulver, durch Schlemmen aus dem gröbern Pulver abgesondert, wurde mit 30 Theilen heißes Wasser und 3 Theilen Schwefelsäure in der Siedhitze so lange behandelt, bis das Wasser wieder abgetrieben war. Die saure, schwarze und zähe Masse wurde bis zur Trockne geglüht. Zugesehtes Wasser erhitze sich und löste einen Theil der Masse auf. Der unaufgelöste Antheil war pulvrig und von aschgrauer Farbe. Von neuem mit Schwefelsäure behandelt, ausgesüßt und getrocknet bei 60° C. wog der

Rückstand 0,571, und geglühet 0,518. Er verhielt sich fast wie reine Kieselerde.

b. Die schwefelsauren Auflösungen wurden abgedunstet, bis sie, erkaltet, zu einer festen krystallinischen Masse anschossen. Darauf wurden sie wieder durch Wärme geschmolzen und mit Alkohol übergossen, worauf sich weißes Salzpulver niederschlug, das mit Alkohol gewaschen, auf dem Filter gesammelt, und an der Luft einige Wochen lang getrocknet 3,65 wog, und in drei Theilen Wasser sich vollkommen auflöslich zeigte. Aus der wässrigen Auflösung desselben schieden sich bei langsamer Ausdunstung zuerst vierseitige Krystallkörner aus, an Gewicht 0,66, welche in heißem Wasser aufgelöst und mit kohlensaurem Kali versetzt einen Niederschlag von 0,22 beinahe reiner kohlensaurer Bittererde gaben. Hierin fand sich nahe 0,05 reine Bittererde.

c. Die von diesen Krystallen abgesonderte und weiter abgedunstete Flüssigkeit schloß zu einer weichen schuppigen, merklich sauren Masse an, deren wässrige Auflösung von kohlensaurem Kali nicht verändert wurde, aber mit kohlensaurem Kali einen gelblichweißen Niederschlag gab, der nach dem Trocknen der Siegelerde ähnlich war, und geglüht 0,32 wog. Hierin fand ich als Hauptbestandtheil Alaunerde, ausserdem etwas Bittererde und ein wenig Eisenoxyd.

d. Die alkoholische Flüssigkeit war stark sauer. Nach Abdunstung des Alkohols fand sich eine von Kohlentheilen geschwärzte Masse. In der Auflösung derselben bewirkte kohlensaures Kali einen gelben schwammigen Niederschlag, welcher mit den Kohlentheilen auf dem Filter gesammelt, gewaschen, getrock-

net und geglüht sich wie dunkelgelbes dem Magnete folgendes Eisenoxyd verhielt. An Gewicht 0,05.

#### *Vierter Versuch.*

a. Das Steinpulver wurde mit zwei Theilen krystallisirtem kohlensaurem Kali in einem silbernen Tiegel geglüht, bis das Silber zu schmelzen anfieng. Es fand sich in dem Tiegel eine dunkelgraue beinahe schwarze, wenig zusammenhangende Masse, welche durch den Gerichtsverlust anzeigte, dafs daraus das Krystallisationswasser nebst der Kohlensäure beinahe gänzlich ausgetrieben war. Mit heifsem Wasser entstand eine kalische Auflösung, die mit Salpetersäure nur wenig aufbrausete. Als zu der gesättigten Flüssigkeit salpetersaure Bleiauflösung getropfelt wurde, so entstand keine Trübung. Einer andern Abtheilung der Flüssigkeit wurde schwefelsaures Ammoniak zugesetzt: hiedurch trübte sie sich und liefs darauf einen weifsen Niederschlag fallen, der nur zum Theil von Schwefelsäure aufgelöst wurde und damit Alaun darstellte. Hieraus ersah ich, dafs die kalische Auflösung keine Substanz enthielt, die mit Bleioxyd ein unauflösliches Salz giebt. Ich fand blofs Alaunerde und Kieselerde, an Gewicht zusammen 0,018.

b. Das vom Wasser nicht aufgenommene, noch fast schwarze Pulver färbte die Salzsäure beträchtlich, und verbreitete damit einen Geruch nach Hydrothiongas. Nachdem durch Sieden mit Wasser die auflöslichen Theile daraus ausgezogen worden, blieb ein schwärzliches Pulver zurück, das ausgestüft und getrocknet an Gewicht den fünften Theil des Steins betrug. Dies hielt ich für unzersetztes Steinpulver: doch

bemerkte ich, daß es vor dem Löthrohre seine schwarze Farbe behielt, mit wenigem Borax ein dunkel gefärbtes und mit vielem Borax ein farbloses und durchsichtiges Glas gab, und sich an die Kohle nicht setzte. Nach anhaltendem Kochen mit Salzsäurelor es, wie das frische Pulver, die Hälfte seines Gewichtes, und gab, nach Absetzung eines weißen Restes, eine grünliche Auflösung, woraus durch ein gelber ins rosenrothe sich ziehender Niederschlag gefällt wurde. Ich stellte es für eine besondere Untersuchung zurück.

c. Die Auflösung, welche ich durch Salzsäure dem mit Kali geglüheten und im Wasser aufgewaschenen Steinpulver erhielt, gerann beim Abdunsten einer gallertartigen Masse, die getrocknet und mit Wasser und Salzsäure ausgezogen einen Rückstand von 0,448 gab. Dieser verminderte sich durch Glühung zu 0,376.

d. Nach Absonderung der Kieselerde fällte das Eisen durch blausaures Eisenkali, und erhielt blausaures Eisen, woraus ich 0,045 metallisches Eisen darstellte. Hiernach schätzte ich den sämmtlichen Eisengehalt des Fossils zu 0,057.

In der übrigen salzsauren Auflösung erkannt aus den vorhin erwähnten Anzeichen wieder die Anwesenheit der Alaunerde und Bittererde.

#### *Fünfter Versuch.*

a. Das Steinpulver wurde mit vier Theilen kohlensaures Kali vermischt in einem Platintiegel geglühet, und dadurch in eine trübe, gelblichweiße Masse verwandelt, welche in verdünnter

re aufgelöst und abgedunstet zu einer Gallerte ge-  
n. Diese Masse wurde getrocknet und in mit Salz-  
re geschärftem Wasser digerirt. Sie hinterließ ein  
isses Kieselpulver, das an der Luft getrocknet 0,6776  
d nach dem Glühen nur 0,45 wog.

b. Die salzsaure Auflösung, mit gesättigtem hy-  
thionsaurem Kali versetzt, wurde schwarz und ganz  
durchsichtig. In einem verschlossenen Gefäße auf-  
wahrt setzte sie nach und nach ein schwarzes zartes  
uminöses Pulver ab. Dies Pulver wurde auf dem  
ter an der Luft allmählig heller und nach dem Trock-  
n ochergeb. Mit heißem Wasser gewaschen und  
der Luft getrocknet, wog es 0,735 und stark ge-  
thet 0,336. Es war jetzt dunkelbraun, vermengt  
t weißen Körnern.

c. Das Aussüßungswasser war anfangs schwärz-  
h, wurde aber an der Luft immer lichter und zu-  
zt farbenlos. Kleesaures Kali fällte daraus ein  
isses Pulver, das an der Luft getrocknet 0,18 und  
glüht 0,09 wog. Von der Salzsäure wurde es lang-  
m und nur zum Theil aufgelöst. Wärme und ein  
satz von verdünnter Schwefelsäure vermehrte die  
flösung, doch blieb noch ein Rückstand von Kiesel  
t kleinen Gypskrystallen übrig, an Gewicht 0,005.

d. Endlich erhielt ich aus dem Aussüßungswas-  
r des kleesauren Niederschlags durch kohlen-saures  
li noch ein lichtgelbes Pulver, an Gewicht 0,076,  
d nach dem Glühen 0,03.

e. Hieraus und aus dem Niederschlage b erhielt  
n durch Schwefelsäure und Salzsäure, mit Hülfe der  
ärme als Hauptbestandtheile Alaunerde und Eisen-  
yd. Als Rückstand blieb noch ein rosenrothes Pul-  
r an Gewicht 0,018, das ich für Kieselende hielt,

1. Sie behielt nach dem Rothglühen ihre rosenrothe Farbe. Stärker geglühet, vorzüglich auf der Kohle und in der desoxydirenden Flamme vor dem Löthrohre wurde sie dunkelgrau und endlich schwärzlich.

2. Mit kohlensaurem Natron schmolz sie in der reducirenden Flamme zu einem schwarzen Glase, aber in der oxydirenden Flamme gab sie eine beinahe farblose und durchsichtige Glasperle. Durch zugesetzte Eisenfeile wurde diese Glasperle grünlich, blieb aber durchsichtig: doch schien die Eisenfeile ihre metallischglänzende Oberfläche nicht verloren zu haben.

3. Mit Borax floss die Substanz langsamer, gab aber ebenfalls ein farbloses Glas.

4. Mit phosphorsaurem Ammoniak entstand eine milchweise Perle, die sich nach einem Zusatz von mehrerem Salz entfärbte und durchsichtig wurde. Eisen schied aus diesem Glase ein metallischglänzendes Phosphoreisen, ohne das Ansehen des Glases beträchtlich zu verändern.

5. Durch kalte Salpetersäure wurde die Substanz nicht verändert: aber in der Wärme entwickelten sich einige Gasbläschen und die Säure färbte sich weingelb. Doch verlor die Substanz weder an Farbe noch an Gewicht.

6. Salzsäure und Salpetersäure wirkten, besonders in der Hitze, stärker auf das Pulver und entwickelten daraus häufige Gasblasen. Die Farbe desselben wurde nicht zerstört, sondern nur blasser. Aus dem verminderten spec. Gewicht des Pulvers, das seinen Umfang behauptend in der Flüssigkeit zu schimmern anfang, schloß ich auf eine theilweise Auflösung

selben. Die gelbliche Auflösung gab abgedunstet eine gelblichweifse, im Wasser auflöbliche Salzmasse.

7. Verdünnte Schwefelsäure schien durch eingehüttetes Pulver nicht verändert zu werden: sobald er durch Wärme das Wasser größtentheils abgetrieben war, nahm die Säure eine rothe Farbe an, ohne jedoch die Menge und Farbe des Pulvers merklich zu verändern. Stärkere Erhitzung vermehrte die Röthe der Säure und brachte auch eine schwärzlichbraune Färbung an dem Pulver hervor. Dies blieb aber größtentheils unauflöst.

8. In Wasser gelöste Phosphorsäure, erhitzt mit dem Pulver, wirkte nicht eher darauf, als bis sie zur Trockne abgedunstet war. Nun entstand eine schwarze Masse. Hieraus konnte man durch Wasser einige Theile ansziehen, die eine gelbliche Auflösung gaben. Ein gelblichgraues Pulver blieb unauflöst zurück.

9. Die Auflösungen 5. 6. 7. 8. hatten einen herben mehr oder weniger sauern Geschmack. Durch Ammoniak wurden sie trüb und gaben weifse oder gelbliche, mit blausaurem Kali blaue, und mit Gallustinctur pomeranzengelbe Niederschläge.

Hieraus erhellt, dafs dies rosenrothe Pulver weder mit Eisenoxyd noch mit Kieselerde übereinkommt. Nach keiner andern bis jetzt bekannten Substanz gleicht es in seinem Verhalten: wir müssen daher annehmen, es es ein neuer eigenthümlicher Körper ist. Die beobachteten Erscheinungen des Versuchs 4. b lassen mich vermuthen, dafs durch eben diese Substanz das eigenenthümliche Verhalten der schwarzen, den Säuren widerstrebenden Masse hervorgebracht worden ist, und es ebendasselbst die neue Substanz durch Behandlung

## 498 Gadolin über den Steinheilit

im Feuer einen niedern Grad der Oxydation und schwarze Farbe, und durch Salzsäure wieder grüne Farbe erhalten hat. Nach jenem Versuche habe ich die Menge dieser Substanz in der schwarzen Masse auf die Hälfte ihres Gewichts und in dem Steinheilite zu 10 Procent schätzen zu müssen. Steinheilit würde also nach einer wahrscheinlichen Schätzung enthalten:

|               |       |
|---------------|-------|
| Kieselerde    | 45,5  |
| Alaunerde     | 23,0  |
| Neue Substanz | 10,0  |
| Bittererde    | 8,3   |
| Eisenoxydul   | 5,6   |
| Wasser        | 7,4   |
|               | <hr/> |
|               | 100,0 |



**Auszug**  
des  
**eteorologischen Tagebuches**  
vom  
**Professor Heinrich**  
in  
**Regensburg.**

---

**April 1819.**

## B a r o m e t e r.

| Mo-<br>nats-<br>Tag. | Stunde.                           | Maximum.                             | Stunde.                          | Minimum.                             | Medium.                              |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                   | 10 F.                             | 27 <sup>''</sup> 2 <sup>'''</sup> 90 | 8 A.                             | 27 <sup>''</sup> 1 <sup>'''</sup> 87 | 27 <sup>''</sup> 2 <sup>'''</sup> 41 |
| 2.                   | 2. 5 F.                           | 27 1, 84                             | 6 A.                             | 27 0, 56                             | 27 1, 20                             |
| 3.                   | 4 F.                              | 27 0, 74                             | 10 A.                            | 26 10, 22                            | 26 11, 60                            |
| 4.                   | 10 F. 8 A.                        | 27 2, 39                             | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F. | 27 0, 93                             | 27 1, 98                             |
| 5.                   | 4 F.                              | 27 1, 09                             | 6 A.                             | 26 11, 48                            | 27 0, 28                             |
| 6.                   | 8 10 F.                           | 27 0, 22                             | 5 F. 6 A.                        | 26 11, 46                            | 26 11, 86                            |
| 7.                   | 10 A.                             | 27 0, 17                             | 6 A.                             | 26 11, 44                            | 26 11, 80                            |
| 8.                   | 10 F. A.                          | 27 1, 12                             | 6 A.                             | 27 0, 41                             | 27 0, 77                             |
| 9.                   | 8 F.                              | 27 1, 10                             | 6 A.                             | 27 0, 02                             | 27 0, 63                             |
| 10.                  | 4 F.                              | 27 0, 04                             | 6 A.                             | 26 10, 54                            | 26 11, 58                            |
| 11.                  | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F.  | 26 9, 78                             | 6 A.                             | 26 7, 79                             | 26 8, 65                             |
| 12.                  | 10 F.                             | 26 8, 54                             | 6 A.                             | 26 7, 18                             | 26 7, 75                             |
| 13.                  | 10 A.                             | 26 8, 40                             | 4 A.                             | 26 7, 24                             | 26 7, 73                             |
| 14.                  | 8. 10 F.                          | 26 11, 05                            | 10 A.                            | 26 9, 08                             | 26 10, 27                            |
| 15.                  | 10 F.                             | 26 9, 70                             | 11 A.                            | 26 8, 69                             | 26 9, 26                             |
| 16.                  | 10 A.                             | 26 8, 57                             | 6 A.                             | 26 6, 55                             | 26 7, 41                             |
| 17.                  | 10 A.                             | 26 11, 05                            | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F. | 26 10, 22                            | 26 10, 69                            |
| 18.                  | 10 F.                             | 27 0, 78                             | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F. | 26 11, 69                            | 27 0, 59                             |
| 19.                  | 10 A.                             | 27 0, 61                             | 4 F. 6 A.                        | 26 11, 89                            | 27 0, 14                             |
| 20.                  | 6 10 F.                           | 27 0, 65                             | 6 A.                             | 26 11, 38                            | 27 0, 11                             |
| 21.                  | 4. 8 F.                           | 27 0, 07                             | 6 A.                             | 26 10, 29                            | 26 11, 29                            |
| 22.                  | 10 A.                             | 26 10, 76                            | 6 A.                             | 26 9, 82                             | 26 10, 24                            |
| 23.                  | 8. 10 F.                          | 26 10, 95                            | 6 A.                             | 26 10, 14                            | 26 10, 61                            |
| 24.                  | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F.  | 26 10, 01                            | 4 A.                             | 26 8, 61                             | 26 9, 50                             |
| 25.                  | 10 A.                             | 26 10, 04                            | 4 F.                             | 26 8, 58                             | 26 9, 15                             |
| 26.                  | 10 A.                             | 27 0, 77                             | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F. | 26 10, 59                            | 26 11, 55                            |
| 27.                  | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A. | 27 2, 02                             | 1. 5 F.                          | 27 0, 67                             | 27 1, 04                             |
| 28.                  | 8 F. 10 A.                        | 27 2, 15                             | 6 A.                             | 27 1, 82                             | 27 2, 02                             |
| 29.                  | 4 F.                              | 27 1, 14                             | 6 A.                             | 26 11, 85                            | 27 0, 38                             |
| 30.                  | 10 A.                             | 26 11, 91                            | 5 F.                             | 26 10, 96                            | 26 11, 18                            |
| Im<br>ganz.<br>Mon.  | den<br>1ten F.                    | 27 2, 90                             | den<br>16ten A.                  | 26 6, 53                             | 26 11, 24                            |

| Thermometer. |         | Hygrometer. |        |         | W i n d e.    |             |
|--------------|---------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| Minim.       | Medium. | Maxim.      | Minim. | Medium. | Tag.          | Nacht.      |
| 5,8          | 9,90    | 761         | 587    | 679,9   | SW. NW 1      | WNW. 1      |
| 7,6          | 9,50    | 766         | 642    | 705,0   | WNW. 2,3      | WNW. 2      |
| 6,0          | 7,21    | 750         | 640    | 698,6   | WNW. 2,3      | NW. 2,3     |
| -0,5         | 2,38    | 790         | 722    | 760,2   | NNO. 2        | NO. NW. 1   |
| -0,6         | 5,00    | 840         | 660    | 765,4   | NW. 2         | NW. 2       |
| +2,6         | 4,78    | 824         | 760    | 789,0   | NO 1,2        | NO. 1       |
| +0,1         | 4,66    | 830         | 725    | 781,6   | NO. SO. 1,2   | ONO. 1      |
| -0,5         | 4,41    | 845         | 722    | 795,0   | OSO. ONO. 1,2 | O. NW. 1    |
| -1,8         | 4,65    | 842         | 725    | 795,5   | OSO. 2        | OSO. W. 1,2 |
| -1,0         | 5,68    | 835         | 696    | 776,3   | OSO. 1        | OSO. 1      |
| +0,5         | 8,94    | 844         | 662    | 768,0   | OSO. 1,2      | SO. SW. 1   |
| 4,0          | 10,74   | 865         | 700    | 799,0   | OSO. 2        | OSO. 1      |
| 4,9          | 11,25   | 885         | 769    | 855,7   | OSO. 2        | WNW. 3,2    |
| 6,0          | 9,63    | 840         | 763    | 809,2   | OSO. 1        | NO. NW. 1   |
| 5,0          | 10,71   | 845         | 700    | 789,2   | NW. SW. 2     | SW. SO. 1   |
| 5,7          | 12,08   | 875         | 726    | 806,8   | SO. 2,3       | NW. 1       |
| 5,2          | 11,12   | 850         | 706    | 790,4   | NW. SO. 1     | WNW. 1      |
| 8,0          | 11,16   | 830         | 753    | 790,6   | SW. SO. 2     | SO. 1       |
| 5,2          | 10,67   | 800         | 684    | 749,8   | SO. SW. 1     | W. SO. 1    |
| 6,8          | 11,76   | 814         | 580    | 723,7   | SW, NW. 2     | NW. 1       |
| 6,7          | 12,46   | 828         | 541    | 760,2   | SO. 1         | NO. NW. 1   |
| 6,3          | 9,92    | 745         | 661    | 693,2   | WSW. 1,2      | WNW. 1      |
| 3,0          | 8,11    | 797         | 668    | 744,8   | NO. 2         | NO. 2       |
| 5,0          | 7,89    | 745         | 640    | 695,9   | SO. 2,3       | NNO. 1      |
| 5,9          | 7,65    | 682         | 555    | 610,3   | NW. 2         | NO. 2       |
| 2,6          | 4,61    | 768         | 635    | 715,9   | NO. 2         | NNO. 2,1    |
| 0,3          | 2,90    | 810         | 713    | 761,2   | ONO. 2,3      | NNO. 1      |
| -1,8         | 2,71    | 810         | 700    | 757,8   | ONO. 2        | NNO. 1,2    |
| +0,8         | 3,92    | 750         | 648    | 718,0   | ONO. 2,3      | ONO. 1      |
| +3,6         | 8,76    | 790         | 665    | 729,4   | INO. 2        | SO. NW. 1   |
| -1,8         | 7,30    | 885         | 555    | 753,2   | -             | -           |

Montags

Witterung.

Allgem  
Uebers  
de  
Witter

|     | Vormittags.                | Nachmittags.             | Nachts.                     |                      |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.  | Trüb.                      | Verm. Wind.              | Schön. Trüb.                | Heitere T            |
| 2.  | Verm. Stür-<br>misch.      | Trüb. Stürm.             | Wind. Schön.<br>Trüb.       | Schöne Ta            |
| 3.  | Trüb. Regen,<br>Wind.      | Trüb. Stürm.             | Stürm. Schön.               | Vermischte           |
| 4.  | Schön. Wind.               | Schön. Wind.             | Schön.                      | Trübe Tag            |
| 5.  | Heiter.                    | Schön. Wind              | Vermischt.                  | Tage mit             |
| 6.  | Verm. Wind.                | Schön.                   | Schön.                      | Tage mit             |
| 7.  | Schön.                     | Heiter. Wind.            | Heiter.                     | Tage mit             |
| 8.  | Heiter.                    | Heiter.                  | Heiter.                     | pele                 |
| 9.  | Heiter. Wind.              | Schön. Wind.             | Heiter.                     | Tage mit             |
| 10. | Nebel. Schön.              | Schön.                   | Heiter.                     |                      |
| 11. | Heiter.                    | Heiter. Wind.            | Heiter.                     | Heitere N            |
| 12. | Heiter.                    | Heiter. Wind.            | Heiter. Verm.               | Schöne N             |
| 13. | Schön. Wind.               | Schön. Wind.             | Schön. Stürm.<br>Nordlicht. | Verm. N              |
| 14. | Vermischt.                 | Schön.                   | Vermischt.                  | Trübe N              |
| 15. | Verm. Wind.                | Verm. Wind.              | Heiter.                     | Nächte m             |
| 16. | Trüb. Wind.                | Verm. Stür-<br>misch.    | Verm. Wind.                 | Nächte m             |
| 17. | Vermischt.                 | Vermischt.               | Trüb.                       | Nächte m             |
| 18. | Vermischt.                 | Vermischt.               | Heiter.                     | licht                |
| 19. | Verm. Wind.                | Trüb Regen.<br>Graupela. | Trüb. Schön.                |                      |
| 20. | Nebel. Verm.<br>Wind.      | Verm. Wind.              | Heiter.                     | Betrag de<br>g Linie |
| 21. | Schön. Wind                | Vermischt.               | Schön. Trüb.                | Betrag de            |
| 22. | Trüb. Regen.               | Trüb. Regen.             | Heiter.                     | stung 1              |
| 23. | Schön. Wind.               | Verm. Wind.              | Trüb. Wind.                 |                      |
| 24. | Trüb. Regen.               | Trüb. Wind.              | Trüb. Regen.                | Herrscher            |
| 25. | Trüb. Regen.               | Trüb. Regen.<br>Wind.    | Trüb. Wind.                 | de OS                |
| 26. | Trüb. Wind.                | Trüb. Wind.              | Heit. Nordlicht.            | WNW.                 |
| 27. | Verm. Wind                 | Verm. Wind.              | Heiter.                     | Zahl der             |
| 28. | Verm. Schnee<br>Wind.      | Verm. Wind.              | Verm. Wind.                 | tungen               |
| 29. | Verm. Regen.<br>Stürmisch. | Trüb. Wind.              | Trüb.                       |                      |
| 30. | Trüb.                      | Vermischt.               | Verm. Heiter.               |                      |

## L i t e r a t u r.

---

Heinrich, P., *die Phosphorescenz der Körper oder die im Dunkeln bemerkbaren Lichtphänomene der unorganischen Natur etc.* Fünfte und letzte Abhandlung, von der Phosphorescenz durch chemische Mischungen. gr. 4<sup>to</sup> Nürnberg bei Schrag. 1820.


### I n h a l t.

#### Erster Abschnitt.

##### Vorgenommene Mischungen.

1. Säuren mit ätzenden, milden, gesäuerten Alkalien.
2. Säuren mit ätzenden, milden, gesäuerten Erden.
3. Säuren mit regulinischen, oxydirten, gesäuerten Metallen.
4. Säuren mit Säuren, mit Wasser, mit geistigen Flüssigkeiten.
5. Säuren mit thierischen Fetten, mit milden und flüchtigen Oelen.
6. Säuren mit andern verbrennlichen Körpern gemischt.
7. Die Gasbildung mittelst Säuren.
8. Gase mit Gasen, mit verbrennlichen Körpern, mit Metallen, mit Säuren.
9. Wasser mit ätzenden Alkalien und Erden.





11



athermisch






Fig. 2





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and financial management. The text notes that without reliable records, it is difficult to track expenditures, assess performance, and ensure that resources are used efficiently and effectively.

2. The second part of the document addresses the challenges associated with data collection and analysis. It highlights that gathering accurate and timely data can be a complex task, often requiring significant resources and expertise. The text discusses various methods for data collection, including surveys, interviews, and the use of digital tools, and notes that each method has its own strengths and limitations. Additionally, it stresses the importance of ensuring the quality and integrity of the data collected, as well as the need for appropriate statistical techniques to analyze the information.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in improving data management and analysis. It discusses how modern software solutions and digital platforms can streamline data collection, storage, and processing, thereby reducing the risk of errors and increasing the efficiency of the process. The text also touches upon the importance of data security and privacy, particularly in light of increasing concerns about the misuse of personal information and the need for robust cybersecurity measures to protect sensitive data.

4. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for best practices. It reiterates the importance of a systematic approach to data management, from the initial planning and design of data collection methods to the ongoing monitoring and evaluation of the data. The text concludes by emphasizing that while the challenges of data management are significant, they can be overcome through a combination of sound management practices, technological innovation, and a commitment to transparency and accountability.

